

Exercice 4

1) w est proportionnel à v si $w = \lambda v$, $\lambda \in \mathbb{R}$ est une constante

$$\Rightarrow (-2, m) = (\lambda, 2\lambda)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -2 = \lambda \\ m = 2\lambda \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda = -2 \\ m = -4 \end{cases}$$

Donc w proportionnel à v si $m = -4$

Dans ce cas là, toute combinaison linéaire $x.v + y.w$ est sur la droite $y = 2x$.

Donc (v, w) n'est pas générateur de \mathbb{R}^2 .

2) Si $m \neq -4$

$\forall (a, b)$ on veut x et y tq $x.v + y.w = (a, b)$

$$\Rightarrow x(1, 2) + y(-2, m) = (a, b)$$

$$\Rightarrow (x, 2x) + (-2y, ym) = (a, b)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x - 2y = a \\ 2x + my = b \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad \text{avec } m \neq -4$$

On échelonne et on réduit

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & a \\ 2 & m & b \end{array} \right) \xrightarrow{L_2 - 2L_1} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & a \\ 0 & m+4 & b-2a \end{array} \right) \xrightarrow{m+4 \neq 0} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -2 & a \\ 0 & 1 & \frac{b-2a}{m+4} \end{array} \right)$$

$$\rightarrow \left(\begin{array}{cc|c} 0 & 1 & \frac{b-2a}{m+4} \\ 1 & 0 & a + 2 \frac{b-2a}{m+4} \end{array} \right) \Rightarrow \begin{aligned} x &= a + 2 \frac{b-2a}{m+4} = \frac{m}{m+4} a + \frac{2}{m+4} b \\ y &= \frac{-2}{m+4} a + \frac{1}{m+4} b \end{aligned}$$

Donc $\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2 \exists! (x, y)$ tq $x.v + y.w = (a, b)$

On (x, y) est une base de \mathbb{R}^2 .

Donc (x, y) est générateur.

Exercice 10

13.11.2020

$$v_1 = (1, 2, -1, 0)$$

$$v_2 = (0, 1, 3, 4)$$

$$F = \text{Vect}(v_1, v_2, v_3, v_4)$$

$$v_3 = (4, 8, -4, 3)$$

$$v_4 = (2, 5, 1, 4)$$

Donc $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ est génératrice dans F .

On échelonne et réduit la matrice

On veut en extraire une famille libre.

on écrit les vecteurs en COLONNE

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 2 \\ 2 & 1 & 8 & 5 \\ -1 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 4 & 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{L_2 - 2L_1 \\ L_3 + L_1 \\ L_4 - L_2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & -1 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 4 & 2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} \textcircled{1} & 0 & 0 & 2 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} 3 \text{ pivots} \rightarrow \text{Donc on sait que } (v_1, v_2, v_3) \text{ est} \\ \text{un système libre et générateur de } F. \end{array}$$

on entère v_4 .

si on avait:

$$\begin{pmatrix} \textcircled{1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \textcircled{1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

alors $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ est libre et génératrice de F .

on entère v_2 .

Exercice 13

La famille n'est pas libre car $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$ et on a 4 vecteurs.

Une relation de dépendance linéaire : $a v_1 + b v_2 + c v_3 + d v_4 = (0, 0, 0)$ avec $(a, b, c, d) \neq (0, 0, 0, 0)$

On échelonne la matrice (on écrit les vecteurs en colonne)

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 & 5 \\ 1 & 1 & -1 & -2 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3/4 \\ 0 & 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 1 & 37/12 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} a + \frac{3}{4}d = 0 \\ b + \frac{1}{3}d = 0 \\ c + \frac{37}{12}d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -\frac{3}{4}d \\ b = -\frac{1}{3}d \\ c = -\frac{37}{12}d \end{cases} \quad \text{avec } d \in \mathbb{R}$$

$$\text{On choisit } d = 12 \text{ alors } \begin{cases} a = -9 \\ b = -4 \\ c = -37 \end{cases}$$

$$\text{Donc } -9v_1 - 4v_2 - 37v_3 + 12v_4 = (0, 0, 0)$$

relation de dépendance non triviale

Exercice 14

$$\begin{aligned} a) \quad p_1(x) &= (x-1)^2 = x^2 - 2x + 1 \\ p_2(x) &= (2x+1)^2 = 4x^2 + 4x + 1 \\ p_3(x) &= ux + 3 \end{aligned}$$

$$v_1 = (1, -2, 1) \quad v_2 = (4, 4, 1) \quad v_3 = (0, u, 3) \quad \in \mathbb{R}^3$$

$$av_1 + bv_2 = v_3 \Rightarrow \text{on cherche } (a, b)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ u \\ 3 \end{pmatrix}$$

ici c'est @ simple de regarder le système d'équation

$$\begin{cases} a + 4b = 0 \\ -2a + 4b = u \\ a + b = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} 3b &= -3 \Rightarrow b = -1 \\ a &= -4b = 4 \end{aligned}$$

$$-2a + 4b = u \Rightarrow u = -8 - 4 = -12$$

Donc il faut $u = -12$

$$\text{alors } 4v_1 - v_2 = v_3 \Rightarrow 4p_1(x) - p_2(x) = p_3(x)$$

b) comme a)

c) si $u \neq -12$

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 0 \\ -2 & 4 & u \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$$

Donc $\{v_1, v_2, v_3\}$ libre et génératrice

\hookrightarrow c'est une base de \mathbb{R}^3

$\forall v \in \mathbb{R}^3$, v comb. linéaire de $\{v_1, v_2, v_3\}$

$\forall p \in \mathbb{R}_2[x]$, p ————— de p_1, p_2, p_3

Exercice 15

a) Si on pouvait trouver $\lambda \in \mathbb{R}$ tq $\cos(x) = \lambda \sin(x)$

$\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, \cos(x) = \lambda \sin(x)$ (c'est une égalité de fct)

\hookrightarrow on met $x=0$

$$\text{Alors } \underset{1}{\cos(0)} = \lambda \underset{0}{\sin(0)} \quad \text{donc FAUX}$$

Donc \cos n'est pas proportionnel à \sin .

2) Rq 1 n'est pas une combinaison linéaire de $\sin(x)$ et $\cos(x)$

$$1 = a \sin(x) + b \cos(x) \quad \text{où } a, b \in \mathbb{R} \quad \text{égalité de fct} \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} \quad 1 = a \cos(x) + b \sin(x)$$

$$\begin{aligned} \text{Pour } x=0 : \quad 1 &= 0 + 1 \cdot b = b \Rightarrow a=b=1 \text{ donc } 1 = \cos(x) + \sin(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ \text{Pour } x=\frac{\pi}{2} : \quad 1 &= a \cdot 1 + 0 = a \end{aligned}$$

ABSURDE (ex $x=\pi: 1 = -a = -1$)

c) $\cos(2x)$ combinaison linéaire de $\cos(x)$ et $\sin(x)$? NON

$\cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ _____ ? OUI

↳ vérifier sur des valeurs particulières comme pour b).

16.11.2020

Exercice 16

$$\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) = \{fct \theta : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \text{ continues}\}$$

↳ sev de \mathbb{R} :

- somme $\mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \times \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$
- multiplié par scalaire: $\mathbb{R} \times \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

On a $x^2, \cos(x), \exp(x) \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$

On qu'elles forment un système libre.

⇒ On $\nexists a, b, c \in \mathbb{R}$ non tous nuls tq $a.x^2 + b.\cos(x) + c.\exp(x) = 0$

↑ égalité de fct
↳ doit être vraie $\forall x \in \mathbb{R}$

$$\text{si } x=0 \quad a.0 + b.1 + c.1 = b+c = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{si } x = \frac{\pi}{2} \quad a\left(\frac{\pi}{2}\right)^2 + b.0 + c.\exp\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \\ \text{si } x = -\frac{\pi}{2} \quad a\left(-\frac{\pi}{2}\right)^2 + b + c.\exp\left(-\frac{\pi}{2}\right) = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow c \cdot \underbrace{\left(\exp\left(\frac{\pi}{2}\right) - \exp\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right)}_{\neq 0} = 0 \Rightarrow c=0$$
$$\Rightarrow a=0 \text{ et } b=0$$
$$\Rightarrow a=b=c=0$$

Donc $x^2, \cos(x)$ et $\exp(x)$ forment un système libre.

Exercice 17

↳ ensemble des suites numériques

$$E = \left\{ (u_n)_{n \geq 0} \mid u_{n+2} = u_{n+1} + u_n \right\} \subset \left\{ (u_n)_{n \geq 0} \right\} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$$

↳ sev de $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$

(montrer que $u_n + v_n \in E$
et que $\lambda u_n \in E$)

Montrons que $\{u, v\}$ forment une base de E .

$$u = (u_0, u_1, u_0 + u_1, \dots) = (1, 0, 1, 1, 2, \dots)$$

$$v = (v_0, v_1, v_0 + v_1, \dots) = (0, 1, 1, 2, 3, \dots)$$

↳ c-à-d que $\forall w \in E \exists ! w$ tq $w = au + bv$ avec $a, b \in \mathbb{R}$.

$$2) x, y \in \mathbb{Q} \text{ tq } x\sqrt{2} + y \cdot 1 \neq 0 \quad (\Leftrightarrow) (x, y) \neq (0, 0)$$

$$\text{On regarde } \frac{1}{x+y\sqrt{2}} \in \mathbb{R}$$

$$(\sqrt{A} + \sqrt{B}) - (\sqrt{A} - \sqrt{B}) = A - B$$

$$(x+y\sqrt{2})(x-y\sqrt{2}) = x^2 - 2y^2$$

$$\text{Donc } \frac{1}{x+y\sqrt{2}} = \frac{x-y\sqrt{2}}{x^2-2y^2} = \frac{x}{x^2-2y^2} \cdot 1 - \frac{y}{x^2-2y^2} \sqrt{2} = p \cdot 1 + q \cdot \sqrt{2} \text{ avec } p, q \in \mathbb{Q}$$

$$3) K = \{ p + \sqrt{2} q \in \mathbb{R} \mid p, q \in \mathbb{Q} \} \subset \mathbb{R}$$

On K est un corps:

- l'addition par la somme vectorielle $(p+q\sqrt{2}) + (p'+q'\sqrt{2}) = (p+p') + (q+q')\sqrt{2} \quad \text{OK}$

- l'inverse $p+q\sqrt{2} \rightsquigarrow (-p) + (-q)\sqrt{2}$

- multiplication $(p+q\sqrt{2})(p'+q'\sqrt{2}) = \underbrace{p \cdot p' + 2qq'}_{\in \mathbb{Q}} + \underbrace{\sqrt{2}(pq' + qp')}_{\in \mathbb{Q}} = p + q\sqrt{2} \in K$

- division $(p+q\sqrt{2}) / (p'+q'\sqrt{2})$

$$= (p+q\sqrt{2}) \cdot \frac{1}{p'+q'\sqrt{2}} = (p+q\sqrt{2}) \cdot (p''+q''\sqrt{2}) \text{ par la q° 2)}$$

$$= p + q\sqrt{2} \in K$$

Donc K est un corps de \mathbb{R} .

2) S.e.v

20.11.2020

Exercice 2

- E_1 est la droite $y=2x$

↳ c'est un sv de \mathbb{R}_2 :

- $(x_1, y_1) \text{ et } (x_2, y_2) \in E_1 \Rightarrow \begin{matrix} 2x_1 - y_1 = 0 \\ 2x_2 - y_2 = 0 \end{matrix} \Rightarrow 2(x_1+x_2) - (y_1+y_2) = 0 \Rightarrow (x_1+x_2, y_1+y_2) \in E_1$

- $\lambda \in \mathbb{R}, (x, y) \in E \Rightarrow 2x - y = 0 \Rightarrow 2\lambda x - \lambda y = 0 \Rightarrow (\lambda x, \lambda y) \in E_1$

• $E_2 = \{(x, y) \text{ tq } 2x - y = 1\} \rightarrow \text{équation non-homogène.}$

• $(0, 0) \notin E_2$ donc E_2 n'est pas un s.v. de \mathbb{R}_2 . (cette condition est suffisante pour dire $E_2 \neq \text{s.e.v.}$)

(on peut aussi vérifier que les 2 propriétés ne sont pas vérifiées).

• $E_3 = \{(x, y) \text{ tq } x^2 - y^2 = 0\}$


$0 = x^2 - y^2 = (x+y)(x-y) \Rightarrow x+y=0 \text{ ou } x-y=0$

On ce n'est pas un s.e.v.:

Soient $(x_1, y_1) = (1, 1) \in \{x=y\}$
et $(x_2, y_2) = (1, -1) \in \{x=-y\}$


$\Rightarrow (x_1 + x_2, y_1 + y_2) = (2, 0) \notin E_3$ donc E_3 n'est pas un s.e.v.

(par contre la propriété avec λ est vérifiée)



E_3 est la réunion de 2 droites.

• $E_4 = \{(x, y) \text{ tq } x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}\}$



• (x_1, y_1) et $(x_2, y_2) \in E_4$

$\Rightarrow (x_1 + x_2, y_1 + y_2) \in E_4$ car $x_1, y_1, x_2, y_2 \in \mathbb{Z}$ donc leur somme aussi.

• mais si $(x, y) = (1, 0) \in E_4$ et $\lambda = \frac{1}{2}$

Alors $(\lambda x, \lambda y) = (\frac{1}{2}, 0) \notin E_4$

Donc E_4 n'est pas un s.v.