

4. ИЗЛУЧЕНИЕ

Урок 20

Рассеяние волн. Давление света

Дифференциальное сечение рассеяния

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{\langle dI/d\Omega \rangle}{\langle S_0 \rangle},$$

где $\langle dI/d\Omega \rangle$ — угловое распределение вынужденного излучения, а $\langle S_0 \rangle$ — среднее значение вектора Пойнтинга падающего излучения.

4.1. (Задача 4.66.) Определить эффективное сечение рассеяния свободным зарядом поляризованной волны с поляризацией: а) линейной; б) круговой; в) эллиптической.

Решение а) $\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2 \sin^2 \theta$, где θ — угол между электрическим полем \mathbf{E} падающей волны и направлением рассеяния;

б) и в) $\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2 \frac{[\mathbf{A} \times \mathbf{n}]^2 + [\mathbf{B} \times \mathbf{n}]^2}{A^2 + B^2}$, где \mathbf{E} — поле падающей волны, взятое в виде $\mathbf{E} = \mathbf{A} \cos(\omega t + \alpha) + \mathbf{B} \sin(\omega t + \alpha)$, а векторы \mathbf{A} и \mathbf{B} ортогональны. Случай $|\mathbf{A}| = |\mathbf{B}|$ описывает рассеяние волны, поляризованной по кругу.

4.2. (Задача 4.67.) Линейно поляризованная волна падает на изотропный гармонический осциллятор. Скорость электрона $v \ll c$. Найти дифференциальное $d\sigma/d\Omega$ и полное σ сечение рассеяния волны с учетом силы лучистого трения.

Решение Гармонический осциллятор в поле плоской волны

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = \frac{eE_0}{m} e^{-i\omega t}.$$

Есть еще сила трения. Позже будет показано, что

$$f_T = \frac{2}{3} \frac{e^2}{c^3} \ddot{x}.$$

Тогда полное уравнение движения с учетом силы трения имеет вид

$$\ddot{x} - \frac{2}{3} \frac{r_e}{c} \ddot{x} + \omega_0^2 x = \frac{e}{m} E_0 e^{-i\omega t},$$

где $r_e = e^2/m_0 c^2$. Будем искать установившееся решение этого уравнения в виде $A e^{i\omega t}$. Тогда

$$x(t) = -\frac{\frac{e}{m} E_0 e^{-i\omega t}}{\omega^2 - \omega_0^2 + i\omega^3 \frac{2r_e}{3c}}$$

$$\ddot{\mathbf{d}} = \frac{\omega^2 \frac{e^2}{m} E_0 e^{-i\omega t}}{\omega^2 - \omega_0^2 + i\omega^3 \frac{2r_e}{3c}}.$$

Тогда сечение рассеяния согласно определению

$$\begin{aligned} \frac{d\sigma}{d\Omega} &= \frac{\langle \frac{dI}{d\Omega} \rangle}{\langle S \rangle} = \frac{|\ddot{\mathbf{d}}|^2 \sin^2 \theta \cdot 8\pi}{4\pi c^3 E_0^2 c} = \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{Re} (\ddot{\mathbf{d}} \cdot \ddot{\mathbf{d}}^*) \frac{2}{c^4 E_0^2} = \frac{\frac{e^4}{m^2} E_0^2}{c^4 E_0^2} \frac{\omega^4 \sin^2 \theta}{(\omega^2 - \omega_0^2)^2 + \frac{4}{9} \left(\frac{r_e}{c}\right)^2 \omega^6} \end{aligned}$$

$$\sigma = F(\omega, \omega_0) \cdot \frac{8}{3} \cdot \pi r_e^2 = \sigma_T F(\omega, \omega_0)$$

1.

$$\begin{aligned} \omega &\gg \omega_0 \\ F &\approx \frac{1}{1 + \frac{4}{9} \frac{r_e^2}{c^2} \omega^2} = \frac{1}{1 + \frac{4}{9} \left(\frac{r_e 2\pi}{\lambda}\right)^2} = \frac{1}{1 + \frac{4}{9} \left(\frac{r_e}{\lambda}\right)^2} \approx 1 \\ \sigma &= \sigma_T \end{aligned}$$

Но силой торможения можно воспользоваться только

$$\lambda \gg r_e$$

2.

$$\begin{aligned} \omega &\approx \omega_0 \\ F &= \frac{9 \lambda_0^2}{4 r_e^2} \\ \sigma &= \frac{9}{4} \frac{4}{3} 2\pi \lambda_0^2 = 6\pi \lambda_0^2 \gg \sigma_T \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} \omega &\ll \omega_0 \\ F &\approx \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^4 \\ \sigma &= \sigma_T \left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)^4 \ll \sigma_T \end{aligned}$$

$$\sigma = \frac{8\pi}{3} \left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2 \frac{\omega^4}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \gamma^2}, \text{ где } \gamma = \frac{2}{3} \frac{e^2 \omega_0^2}{mc^3} - \text{фактор, учитывающий силу}$$

лучистого трения, взятую в виде $\mathbf{F}_{\text{тр}} = -m\gamma\dot{\mathbf{r}}$.

4.3. (Задача 4.69.) Найти дифференциальное сечение рассеяния плоской линейно поляризованной монохроматической волны на маленьком шаре ($\lambda \gg a$). В поле электромагнитной волны у шара возникают дипольный электрический $\mathbf{d} = \alpha \mathbf{E}$ и магнитный $\mathbf{m} = \beta \mathbf{H}$ моменты.

Решение

$$\mathbf{d} = \alpha \mathbf{E}$$

$$\mathbf{m} = \beta \mathbf{H}$$

$$E_x = E_0 e^{ikz - i\omega t}$$

$$H_y = E_0 e^{ikz - i\omega t}$$

$$d_x = \alpha E_0 e^{-i\omega t}$$

$$\ddot{d}_x = -\alpha E_0 \omega^2 e^{-i\omega t}$$

$$m_y = \beta E_0 e^{-i\omega t}$$

$$\ddot{m}_y = -\beta E_0 \omega^2 e^{-i\omega t}$$

$$\mathbf{H}_d = \frac{1}{c} \dot{\mathbf{A}}_d \times \mathbf{n} = \frac{1}{c^2 r_p} \ddot{\mathbf{d}} \times \mathbf{n}$$


$$\mathbf{H}_m = \frac{1}{c^2 r_p} (\ddot{\mathbf{m}} \times \mathbf{n}) \times \mathbf{n}$$

$$(\ddot{\mathbf{m}} \times \mathbf{n}) \parallel \ddot{\mathbf{d}}.$$

$$\mathbf{H} = \mathbf{H}_d + \mathbf{H}_m = \frac{1}{c^2 r_p} \left\{ \ddot{\mathbf{d}} + \ddot{\mathbf{m}} \times \mathbf{n} \right\} \times \mathbf{n}$$

$\frac{d\sigma}{d\Omega} = (\alpha + \beta)^2 \left(\frac{\omega}{c}\right)^4 \sin^2 \theta$, где θ — угол между электрическим полем падающей волны и направлением рассеяния.

4.4. (Задача 4.70.) Плоская волна длиной λ падает на систему двух свободных зарядов



так, как показано на рисунке. Найти дифференциальное сечение рассеяния в зависимости от расстояния d между зарядами. Для каких соотношений $\frac{d}{\lambda}$ при заданном $\Delta\lambda$ в падающей волне рассеяние некогерентно?

Решение $\frac{d\sigma}{d\Omega} = 4 \left(\frac{e^2}{mc^2}\right)^2 \sin^2 \theta \cos^2 (kd \cos \theta)$, где θ — тот же угол, что и в предыдущей задаче. При $d \ll \lambda$ сечение в 4 раза больше, чем для одного заряда; при $\frac{d}{\lambda} \gg \frac{\lambda/\Delta\lambda}{\cos \theta}$ рассеяние некогерентно и сечение вдвое больше, чем для одного заряда.

4.5. (Задача 4.71.) Плоская монохроматическая волна с круговой поляризацией и длиной волны λ рассеивается на двух электронах, находящихся на расстоянии $\lambda/4$ друг от друга. Волна идет вдоль линии, соединяющей электроны. Найти поляризацию и отношение интенсивностей в продольном и поперечном направлениях.

Решение Для 1-го заряда

$$E_x = E_0 \cos \omega t$$

$$E_y = E_0 \sin \omega t$$

$$\mathbf{H}_d^{(1)} = \frac{1}{c} \dot{\mathbf{A}} \times \mathbf{n} = \frac{1}{c^2 r_p} \ddot{\mathbf{d}} \times \mathbf{n}$$

$$\ddot{d}_x = -\omega^2 \frac{e^2}{m} E_0 \cos \omega t$$

$$\ddot{d}_y = -\omega^2 \frac{e^2}{m} E_0 \sin \omega t$$

$$H_x = \ddot{d}_y$$

$$H_y = \ddot{d}_x$$

2-ой заряд

$$H_x = E_0 \cos \left(\omega t - k \frac{\lambda}{4} \right) = E_0 \cos \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) = E_0 \sin \omega t$$

$$H_y = E_0 \sin \left(\omega t - k \frac{\lambda}{4} \right) = E_0 \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) = E_0 \cos \omega t$$

Вдоль оси Z при сложении $\mathbf{H}^{(1)}$, $\mathbf{H}^{(2)}$ надо учесть еще и запаздывание возбужденной волны, как раз равно запаздыванию возбуждения.


$$H_x^{(1)}(\omega t) + H_x^{(2)} \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right)$$

поперек наблюдения (вдоль x , например) есть только запаздывание возбуждения.

$$H_z = n_x \ddot{d}_y,$$

то есть поляризация линейная. $I_{\parallel}/I_{\perp} = 4$. В продольном направлении поляризация круговая, а в поперечном — линейная.

4.6. (Задача 4.72.) Два нерелятивистских электрона (заряд $-e$, масса $-m$) находятся




в поле линейно поляризованной плоской монохроматической волны. Расстояние между ними практически постоянно: $d = \frac{\lambda}{2}$.

Электрическое поле волны направлено по нормали к плоскости рисунка. Найти сечение рассеяния $d\sigma/d\varphi$, где φ — угол рассеяния волны в плоскости рисунка,

Решение $\frac{d\sigma}{d\varphi} = 4 \left(\frac{e^2}{mc^2} \right)^2 \cos^2 \left(\frac{\pi}{2} \sin \varphi \right).$

4.7. (Задача 4.75.) Волновой пакет длиной $c\tau$ с несущей частотой ω_0 налетает на два



свободных электрона, расстояние между которыми $AB = l \lesssim c\tau$. Пакет амплитуды E_0 образован линейно поляризованными электромагнитными волнами, волновой вектор которых направлен вдоль AB , а электрическое поле перпендикулярно плоскости рассеяния волн. Найти спектр излучения, рассеянного под углом θ к первоначальному направлению.

Решение

$$E_\omega = \int_0^\tau e^{-i\omega t} e^{i\omega_0 t} E(t) dt = \int_0^\tau e^{i(\omega_0 - \omega)t} dt = \frac{e^{i(\omega_0 - \omega)\tau} - 1}{\omega_0 - \omega}$$

$$= e^{i(\omega_0 - \omega)\frac{\tau}{2}} \left[\frac{\sin[(\omega_0 - \omega)\frac{\tau}{2}]}{(\omega_0 - \omega)\frac{\tau}{2}} \right] \tau$$

$$E^{(1)} \sim e^{-i\omega t}$$

$$E^{(2)} \sim e^{-i\omega(t + \frac{l \cos \theta}{c} - \frac{l}{c})}$$

$$E \sim e^{i(\omega_0 - \omega)\frac{\tau}{2}} e^{-i\omega t} \left(1 + e^{il(1 - \cos \theta)} \right) \sin c = \cos \left[\frac{kl}{2} (1 - \cos \theta) \right]$$

$$E_\omega(\theta) \sim E_0 \operatorname{sinc} \frac{(\omega - \omega_0)\tau}{2} \cos \frac{kl(1 - \cos \theta)}{2}.$$

Задача 4.71

Решение.

Амплитуда поля падающей волны $\vec{E}_{nad} = E_0 (\vec{e}_x - i\vec{e}_y) \cdot e^{i(kz - \omega t)}$. В дальней волновой зоне $\vec{H}_{pacc} = \frac{E_0 r_e}{R} [(\vec{e}_x - i\vec{e}_y) \times \vec{n}] (1 + e^{-i\chi}) \cdot e^{i(kz - \omega t)}$, где \vec{n} - единичный вектор вдоль направления распространения волны (под углом θ к оси z), $\chi = \frac{2\pi d}{\lambda} (1 - \cos \theta)$. Выбирая оси x, y так, чтобы \vec{n} был в плоскости yz , получим $\vec{H}_{pacc} = \frac{E_0 r_e}{R} (\vec{e}_y \cos \theta - \vec{e}_z \sin \theta + i\vec{e}_x \cos \theta) (1 + e^{-i\chi}) \cdot e^{i(kz - \omega t)}$.

Дифференциальное сечение рассеяния $\frac{d\sigma}{d\Omega} = 2r_e^2 (1 + \cos^2 \theta) (1 + \cos \chi)$.

$$\text{Для } d = \lambda/4 \quad \chi = \frac{\pi}{2} (1 - \cos \theta), \quad \frac{d\sigma}{d\Omega} = 2r_e^2 (1 + \cos^2 \theta) \left[1 + \sin \left(\frac{\pi}{2} \cos \theta \right) \right].$$

При $\theta = 0$ $\vec{H}_{pacc} = \frac{E_0 r_e}{R} (\vec{e}_y + i\vec{e}_x) 2 \cdot e^{i(kz - \omega t)}$ поляризация круговая, при $\theta = \pi/2$

$\vec{H}_{pacc} = \frac{E_0 r_e}{R} (-\vec{e}_z) (1 - i) \cdot e^{i(kz - \omega t)}$ поляризация линейная.

Чтобы построить качественно диаграмму направленности излучения, достаточно рассмотреть

$$\theta = 0 \quad \frac{d\sigma}{d\Omega} = 8r_e^2, \quad \theta = \pi \quad \frac{d\sigma}{d\Omega} = 0, \quad \theta = \pi/2 \quad \frac{d\sigma}{d\Omega} = 2r_e^2.$$

