

Плоская монохроматическая волна, распространяющаяся вдоль оси z , по определению описывается выражением

$$\mathbf{E}(\mathbf{r}, t) = E_{0x} e^{i(\omega t - kz)} \cdot \mathbf{e}_x + E_{0y} e^{i(\omega t - kz + \phi)} \cdot \mathbf{e}_y.$$

Зафиксируем плоскость $z = 0$ и выясним, какую траекторию описывает конец вектора $\mathbf{E}(t)$. Запишем x - и y -составляющие поля:

$$E_x = E_{0x} \cos \omega t, \quad E_y = E_{0y} \cos(\omega t + \phi).$$

Выразим $\cos \omega t = \frac{E_x}{E_{0x}}$ и подставим в выражение для y -составляющей:

$$\frac{E_y}{E_{0y}} = \cos \omega t \cos \phi - \sin \omega t \sin \phi = \frac{E_x}{E_{0x}} \cos \phi - \sqrt{1 - \left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2} \sin \phi,$$

$$\sqrt{1 - \left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2} \sin \phi = \frac{E_x}{E_{0x}} \cos \phi - \frac{E_y}{E_{0y}},$$

$$\left(1 - \left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2\right) \sin^2 \phi = \left(\frac{E_x}{E_{0x}} \cos \phi - \frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2,$$

$$\left(1 - \left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2\right) \sin^2 \phi = \left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 \cos^2 \phi + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2 \frac{E_x}{E_{0x}} \cos \phi \frac{E_y}{E_{0y}},$$

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2 \frac{E_x}{E_{0x}} \cos \phi \frac{E_y}{E_{0y}} = \sin^2 \phi,$$

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2 \frac{E_x}{E_{0x}} \frac{E_y}{E_{0y}} \cos \phi = \sin^2 \phi.$$

Получилось уравнение эллипса.

Рассмотрим частные случаи.

1. Линейная поляризация:

$$\text{а) } \phi = 0 : \left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2 \frac{E_x}{E_{0x}} \frac{E_y}{E_{0y}} = \left(\frac{E_x}{E_{0x}} - \frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 = 0 \Rightarrow E_y = \frac{E_{0y}}{E_{0x}} \cdot E_x.$$

$$\text{б) } E_{0x} = 0 \text{ или } E_{0y} = 0.$$

2. Круговая поляризация:

$$\phi = \pm \frac{\pi}{2}, \quad E_{0y} = E_{0x} : \left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0x}}\right)^2 = 1.$$