

## 15. Ортогонализация по Шмидту. Примеры ортогональных полиномов

Андрей Бареков      Ярослав Пылаев  
По лекциям Устинова С.М.

January 7, 2020

Перейти от линейно независимой функции к ортогональной позволяет метод ортогонализации Грамма-Шмидта.

## 1 Метод Ортогонализации Грамма-Шмидта

$$\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots, \varphi_m(x) \quad [a, b], p(x) > 0$$

Требуется построить новый набор функций  $g(x)$ , удовлетворяющий следующим условиям:

- функции ортогональны на промежутке  $[a, b]$  с весом  $p(x)$ ,
- функции являются линейной комбинацией  $\varphi_k(x)$ .

$\widetilde{g}_k$  - функция ортогональная, но не нормированная.

$g_k(x)$  строится так, чтобы она была ортогональна всем функциям  $g_i(x)$ , построенным до нее.

$$\begin{aligned} \widetilde{g_0}(x) &= \varphi_0(x) \\ \int_a^b \underbrace{p(x)}_{>0} \underbrace{\widetilde{g_0}(x)^2}_{>0} dx &= \alpha_0^2 \\ \text{нормируем} \Rightarrow g_0(x) &= \frac{\widetilde{g_0}(x)}{\alpha_0} \text{ и дальше по индукции} \end{aligned}$$

$$\widetilde{g_m}(x) = \varphi_m(x) - \sum_{k=0}^{m-1} C_{m,k} \cdot g_k(x) \quad \left| g_i(x), p(x), \int_a^b \right.$$

$C_{m,k}$  - коэффициенты, подлежащие определению,  
 $g_k(x)$  - функции, построенные до  $\widetilde{g_m}(x)$   
 $[i = 0, 1, \dots, m-1]$

$$\begin{aligned} 0 &= \int_a^b p(x) \widetilde{g_m}(x) g_i(x) dx = \int_a^b p(x) \varphi_m(x) g_i(x) dx - \\ &\quad - C_{m,i} \cdot \int_a^b p(x) g_i^2(x) dx \end{aligned}$$

$$C_{m,i} = \frac{\int_a^b p(x) \varphi_m(x) g_i(x) \cdot dx}{\underbrace{\int_a^b p(x) g_i^2(x) dx}_{=1, \text{ т.к. } g_i(x) \text{ нормированы}}}$$

$$\int_a^b p(x) g_m^2(x) dx = \alpha_m^2$$

$$g_m(x) = \frac{\widetilde{g_m(x)}}{\alpha_m} - \text{нормируем.}$$

## 2 Примеры ортогональных полиномов

Различные семейства ортогональных полиномов главным образом отличаются друг от друга весовой функцией  $p(x)$ .

Ортогональные полиномы строят для стандартного промежутка (чаще всего  $[-1, 1], [0, 1]$ ), а затем при необходимости переходят к произвольному промежутку  $[a, b]$  при помощи замены переменных:

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cdot t$$

$$t \in [-1, 1], x \in [a, b].$$

### 2.1 Ортогональные полиномы Лежандра

$$[-1, 1], \quad p(x) \equiv 1$$

$$L_n(x) = \frac{(-1)^n}{n!2^n} \cdot \frac{d^n}{dx^n} \left[ (1-x^2)^n \right]$$

$$L_0(x) = 1, L_1(x) = x, L_2(x) = \frac{3x^2 - 1}{2}$$

$L_n(x)$  ортогональны, но не нормированы.

Для полиномов Лежандра имеет место следующее рекуррентное соотношение:

$$(n+1)L_{n+1}(x) - (2n+1)xL_n(x) + nL_{n-1}(x) = 0.$$

Нули полиномов Лежандра являются нулями (узлами) квадратурных формул Гаусса.

## 2.2 Ортогональные полиномы Чебышёва

$$[-1, 1], \quad p(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\boxed{T_n(x) = \cos(n \cdot \arccos(x))}$$

$$T_0(x) = 1, T_1(x) = x, T_2(x) = 2x^2 - 1.$$

Получим рекуррентное соотношение для полиномов Чебышёва:

$$\varphi = \arccos(x)$$

$$\cos((n+1)\varphi) + \cos((n-1)\varphi) = 2\cos\varphi \cdot \cos(n\varphi)$$

$$T_{n+1}(x) + T_{n-1}(x) = 2xT_n(x)$$

$$T_{n+1}(x) = 2xT_n(x) - T_{n-1}(x)$$