


# 13. Среднеквадратичная аппроксимация (дискретный случай). Понятие веса

Андрей Бареков      Ярослав Пылаев  
По лекциям Устинова С.М.

January 7, 2020

## 1 Постановка задачи



Маловероятно, что кривая  $f_1(x)$ , получившаяся в результате интерполирования по экспериментальным данным (точки на рисунке), имеет вид исходной зависимости. Скорее вид кривой  $f_2(x)$  отвечает этой зависимости, а отклонение экспериментальных данных обусловлено сравнительно большой погрешностью измерений. В таком случае или, если аппроксимируемая функция задана на промежутке  $[a, b]$  непрерывно, используют *среднеквадратичный критерий*.

*Задача* среднеквадратичной аппроксимации (или "метода наименьших квадратов"): так подобрать аппроксимирующую функцию  $Q(x)$

- чтобы квадрат расстояния между  $Q(x)$  и  $f(x)$  был минимальным

$$\rho^2 = \|Q(x) - f(x)\|^2 = (Q(x) - f(x), Q(x) - f(x)) \rightarrow \min$$

Линейное пространство со скалярным произведением

- $Q(x)$  выбирается в виде обобщенного многочлена:

$$Q_m(x) = a_0\varphi_0(x) + a_1\varphi_1(x) + \dots + a_m\varphi_m(x) = \sum_{k=0}^m a_k\varphi_k(x) \quad (1)$$

$\varphi_k$  - заданный набор линейно независимых функций,  
коэффициенты  $a_k$  подлежат определению

## 2 Дискретный случай

Коэффициенты  $a_k$  выбираются из условия минимума  $\rho^2$

$$\rho^2 = (Q(x) - f(x), Q(x) - f(x)) = \sum_{i=1}^N (Q_m(x_i) - f(x_i))^2 \rightarrow \min. \quad (2)$$

Три варианта соотношения чисел  $N$  и  $m$ :

1.  $N = m + 1$ . Число коэффициентов  $a_k$  равно числу точек таблицы, через которые проходит интерполяционный полином, являющийся *единственным решением*;  $\rho_{min}^2 = 0$ .
2.  $N < m + 1$ . Задача имеет *бесконечное множество решений*, при этом  $\rho_{min}^2 = 0$ .
3.  $N > m + 1$ . Задача имеет *единственное решение*, но  $\rho_{min}^2 \neq 0$ . Это типичный случай среднеквадратичной аппроксимации, на практике  $N \gg m + 1$ .

Необходимое условие экстремума:

$$\frac{\partial \rho^2}{\partial a_k} = 0, \quad k = 0, 1, 2, \dots, m.$$

Система из  $m + 1$  уравнения с  $m + 1$  неизвестными

Дифференцируем (2):

$$0 = \frac{\partial \rho^2}{\partial a_k} = 2 \sum_{i=1}^N (Q_m(x_i) - f(x_i)) \varphi_k(x_i)$$

$$\sum_{i=1}^N Q_m(x_i) \varphi_k(x_i) = \sum_{i=1}^N f(x_i) \varphi_k(x_i), \quad \text{при этом } Q_m(x_i) = \sum_{j=0}^m a_j \varphi_j(x_i)$$

$$\Rightarrow a_0 \sum_{i=1}^N \varphi_0(x_i) \varphi_k(x_i) + a_1 \sum_{i=1}^N \varphi_1(x_i) \varphi_k(x_i) + \dots +$$

$$+ a_m \sum_{i=1}^N \varphi_m(x_i) \varphi_k(x_i) = \sum_{i=1}^N f(x_i) \varphi_k(x_i)$$

$$k = 0, 1, \dots, m.$$

Решаем систему уравнений и находим коэффициенты  $a_k$ .

### 3 Понятие веса

На практике возникает ситуация, когда различным экспериментальным точкам доверяют в разной степени, это можно учесть введением весовых коэффициентов

$$\rho^2 = \sum_{i=1}^N \underbrace{p_i}_{p_i > 0} \left( Q_m(x_i) - f(x_i) \right)^2 \rightarrow \min. \quad (3)$$

Для тех точек, которым мы доверяем больше и к которым аппроксимирующую функцию хотим провести ближе, весовые коэффициенты нужно выбирать больше.

Обращаясь к практике, положительные весовые коэффициенты  $p_i$  часто задают так, чтобы их сумма была равна, например, 1 или 100. Важным является отношение  $p_i$  друг к другу.