

09. Квадратурные формулы левых, правых, и
средних прямоугольников, трапеций, Симпсона.
Малые и составные формулы, их остаточные
члены.

Андрей Бареков Ярослав Пылаев
По лекциям Устинова С.М.

January 4, 2020

1 Квадратурные формулы

Так называются формулы для вычисления определённых интегралов.

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

$$Q_0(x) = f(x_0)$$

$$I \approx \int_a^b f(x_0) dx = (b - a)f(x_0)$$


$$f(x) = Q_m(x) + R_m(x)$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^b Q_m(x) dx$$

$$\varepsilon = \int_a^b R_m(x) dx$$


$$x_0 = a \Rightarrow I \approx (b - a)f(a)$$

(1)




Квадратурная формула левых прямоугольников.

$$x_0 = b \Rightarrow I \approx (b - a)f(b) \quad (2)$$



Квадратурная формула правых прямоугольников.


$$x_0 = \frac{a + b}{2} \Rightarrow I \approx (b - a)f\left(\frac{a + b}{2}\right) \quad (3)$$



Квадратурная формула средних прямоугольников.

$$Q_1(x) = \frac{x-b}{a-b}f(a) + \frac{x-a}{b-a}f(b)$$


$$I \approx \int_a^b Q_1(x) dx = \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)) \quad (4)$$



Квадратурная формула трапеций.

$$Q_2(x); x_0 = a, x_1 = \frac{a+b}{2}, x_2 = b$$

$$I \approx \int_a^b Q_2(x) dx = \frac{b-a}{6}(f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b)) \quad (5)$$



Метод параболы или квадратурная формула Симпсона.

Для повышения точности исходный промежуток разбивается на участки,

на каждом из них применяется какая-то квадратурная формула, а результаты складываются. Эти квадратурные формулы получили название

2 Составные квадратурные формулы

Разобьём исходный промежуток на m участков одинаковой длины:

$[x_0, x_1], [x_1, x_2], \dots, [x_k, x_{k+1}], \dots, [x_{N-1}, x_N]$ На каждом участке вычисляем(*) интеграл:

$$I_k = \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \approx \frac{b-a}{N} f(x_k)$$

$$x_k = x_0 + k \frac{b-a}{N}$$

$$x_0 = a, x_N = b$$

$$x_{k+1} - x_k = \frac{b-a}{N}$$

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

$$I \approx \frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f(x_k) \quad (1^*)$$

$$I \approx \frac{b-a}{N} \sum_{k=1}^N f(x_k) \quad (2^*)$$

$$I \approx \frac{b-a}{N} \sum_{k=0}^{N-1} f(x_k + \frac{b-a}{2N}) \quad (3^*)$$

$$I_k = \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) dx \approx \frac{b-a}{2N} (f(x_k) + f(x_{k+1}))$$

$$I \approx \frac{b-a}{2N} \sum_{k=1}^{N-1} f(x_k) \quad (4^*)$$

В формуле Симпсона выберем N чётных. Количество промежутков будет $N/2$, каждый промежуток будет вдвое большей длины.

$$I_k = \int_{x_k}^{x_{k+2}} f(x) dx \approx \frac{b-a}{3N} (f(x_k) + 4f(x_{k+1}) + f(x_{k+2}))$$

$$I \approx \frac{b-a}{3N} (f(a) + 4(f_1 + f_3 + \dots + f_{N-1}) + 2(f_2 + f_4 + \dots + f_{N-2}) + f(b)) \quad (5^*)$$

3 Погрешности квадратурных формул

Теорема о 'средней' точке:

$$\int_a^b f(x)g(x) dx = g(c) \int_a^b f(x) dx, c \in [a, b]$$

Чтобы теорема работала, функция, стоящая под знаком интеграла, должна быть знакопостоянна. Теорема о 'средней' точке-2:

$$\frac{1}{N} \sum_{k=1}^N f(x_k) = f(\eta)$$

3.1 Погрешности несоставных формул

$$\varepsilon = \int_a^b R_m(x) dx$$

Погрешность равна интегралу от остаточного члена интерполяционного полинома.

$$R_0(x) = \frac{x-a}{1!} f'(\eta)$$

$$\varepsilon_{\text{л.пр.}} = \int_a^b \frac{x-a}{1!} f'(\eta) dx = \int_a^b (x-a) dx f'(\eta^*) = \frac{(b-a)^2}{2} f'(\eta^*)$$

$$\varepsilon_{\text{пр.пр.}} = \int_a^b \frac{x-b}{1!} f'(\eta) dx = -\frac{(b-a)^2}{2} f'(\eta^*)$$

$$\varepsilon_{\text{трап.}} = \int_a^b \frac{(x-a)(x-b)}{2!} f''(\eta) dx = -\frac{(b-a)^2}{12} f''(\eta^*)$$

$$\varepsilon_{\text{ср.пр.}} = \int_a^b \frac{x - \frac{a+b}{2}}{1!} f'(\eta) dx$$

Теорема о 'среднем' здесь не работает, используется другой способ. Рассмотрим разложение функции в степенной ряд Тейлора до $2^{\text{й}}$ в точке $\frac{a+b}{2}$:

$$f(x) = f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{x - \frac{a+b}{2}}{1!} f'\left(\frac{a+b}{2}\right) + \frac{(x - \frac{a+b}{2})^2}{2!} f''(\eta)$$

Проинтегрируем слева и справа на $[a; b]$:

$$\int_a^b f(x) dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right) + \underbrace{0 + \int_a^b \frac{(x - \frac{a+b}{2})^2}{2!} f''(\eta) dx}_{\varepsilon_{\text{ср.пр.}}}$$

$$\varepsilon_{\text{ср.пр.}} = \int_a^b \frac{(x - \frac{a+b}{2})^2}{2!} f''(\eta) dx = \frac{(b-a)^3}{24} f''(\eta^*)$$

$$\varepsilon_{\text{симп.}} = \int_a^b \frac{(x-a)(x-\frac{a+b}{2})(x-b)}{3!} f'''(\eta) dx$$

Теорема о 'среднем' не работает, погрешность выводится по другому.

$$\varepsilon_{\text{симп.}} = -\frac{(b-a)^5}{2880} f''''(\eta^*)$$

$$\varepsilon_{\text{л.пр.}} = \frac{(b-a)^2}{2} f'(\eta^*)$$

$$\varepsilon_{\text{пр.пр.}} = -\frac{(b-a)^2}{2} f'(\eta^*)$$

$$\varepsilon_{\text{трап.}} = -\frac{(b-a)^2}{12} f''(\eta^*)$$

$$\varepsilon_{\text{ср.пр.}} = \frac{(b-a)^3}{24} f''(\eta^*)$$

$$\varepsilon_{\text{симп.}} = -\frac{(b-a)^5}{2880} f''''(\eta^*)$$