



Домедична допомога при електротравмі

Виконав студент групи ПП-44 Верещак Богдан

Визначення та небезпека


Електротравма — це місцеві та загальні пошкодження, що виникають в результаті впливу електричного струму великої сили або розряду блискавки.

Судоми м'язів часто унеможливають самостійне від'єднання потерпілого від провідника. Будь-яке звільнення призводить до загибелі людини.

- Дія струму порушує роботу серцево-судинної системи.
- Викликає термічні опіки в місцях контакту ("мітки струму").
- Призводить до зупинки дихання та втрати свідомості.

Звільнення від дії струму (до 1000 В)

- **Відключення напруги:**
Найперша дія — вимкнути рубильник або вимикач.
- **Використання ізоляції:**
Використовувати суху палицю, дошку, одяг, шапку або діелектричні рукавиці.
- **Перерізання проводів:**
Інструментом з ізовольованими ручками або сокирою з сухим дерев'яним топорищем.



Звільнення потерпілого від дії електричного струму:
а – вимкнення електричного струму; б – відокремлення електричного проводу сухим дерев'яним предметом; в – перерубування електричного проводу; г – відокремлення потерпілого за сухий одяг; д – відтягування потерпілого в гумових рукавицях.

Заходи власної безпеки

- **При відтягуванні за одяг:** Уникати дотику до металевих предметів та відкритих частин тіла потерпілого.
- **Захист ніг:** Не можна торкатися взуття потерпілого (може бути сирим).
- **Самоізоляція:** Слід стати на гумовий килимок або суху дошку.
- **Захист рук:** Обмотати руки шарфом або натягнути рукав піджака, якщо немає спеціальних рукавиць.

Рятувальник не повинен стати другою жертвою електричного ланцюга.

Класифікація станів потерпілого

I Стан

При свідомості.

Забезпечити спокій,
спостереження 2-3
години, обов'язковий
виклик лікаря.

II Стан

Непритомний, дихає.

Покласти
горизонтально,
розстебнути тісний
одяг, дати
нашатишний спирт.

III Стан

Не дихає / уривчасто.

Негайно почати
штучне дихання та
непрямий масаж
серця.

Послідовність дій

- Переконатися у відсутності небезпеки для себе.
- Припинити дію струму на потерпілого.
- Провести огляд (свідомість, дихання).
- Викликати бригаду ЕМД (103).
- Почати СЛР (якщо дихання відсутнє).
- Надати стабільного положення.
- Накласти пов'язки на опіки.
- Постійний нагляд.

Віддалені наслідки

Навіть якщо потерпілий
прийшов до тями:

- > **Заборонено відпускати додому!**
- > Наслідки можуть проявитися через кілька годин.
- > Можлива раптова зупинка серця.
- > Обов'язкова госпіталізація.

