



Домедична допомога при електротравмі

Виконав студент групи ПП-44 Верещак Богдан

Визначення та небезпека

Електротравма — це місцеві та загальні пошкодження, що виникають в результаті впливу електричного струму великої сили або розряду блискавки.

Судоми м'язів часто унеможливають самостійне від'єднання потерпілого від провідника. Будь-яке зволікання призводить до загибелі людини.

- Дія струму порушує роботу серцево-судинної системи.
- Викликає термічні опіки в місцях контакту ("мітки струму").
- Призводить до зупинки дихання та втрати свідомості.



Звільнення від дії струму (до 1000 В)

- **Відключення напруги:** Найперша дія — вимкнути рубильник або вимикач.
- **Використання ізоляції:** Використовувати суху палицю, дошку, одяг, шапку або діелектричні рукавиці.
- **Перерізання проводів:** Інструментом з ізольованими ручками або сокирою з сухим дерев'яним топорщем.



Заходи власної безпеки

- **При відтягуванні за одяг:** Уникати дотику до металевих предметів та відкритих частин тіла потерпілого.
- **Захист ніг:** Не можна торкатися взуття потерпілого (може бути сирим).
- **Самоізоляція:** Слід стати на гумовий килимок або суху дошку.
- **Захист рук:** Обмотати руки шарфом або натягнути рукав піджака, якщо немає спеціальних рукавиць.

Класифікація станів потерпілого

I Стан

При свідомості.

Забезпечити спокій,
спостереження 2-3 години,
обов'язковий виклик лікаря.

II Стан

Непритомний, дихає.

Покласти горизонтально,
розстебнути тісний одяг, дати
нашатирний спирт.

III Стан

Не дихає / уривчасто.

Негайно почати штучне дихання
та непрямий масаж серця.

Послідовність дій (Домедична допомога)

Першочергові кроки

1. Переконатися у відсутності небезпеки для себе.
2. Припинити дію струму на потерпілого.
3. Провести огляд (свідомість, дихання).
4. Викликати бригаду ЕМД (103).

Медичне втручання

1. Почати СЛР (якщо дихання відсутнє).
2. Надати стабільного положення (якщо без свідомості, але дихає).
3. Накласти чисті пов'язки на опіки.
4. Постійний нагляд до приїзду лікарів.

Віддалені наслідки

Навіть якщо потерпілий прийшов до тями:

- **Заборонено відпускати додому або до роботи!**
- Наслідки дії струму можуть проявитися через кілька годин.
- Можлива раптова зупинка серця або спазм судин.
- Обов'язкова госпіталізація для клінічного спостереження.

