

Max Planck Institute for Gravitational Physics  
Quantum Quality group  
Notes for Optomechanics  
A quick review

PhD Study

Adrian Udovičić

Hannover, 2023

# SADRŽAJ

1	Osnovna svojstva	1
2	Uvod1	2
3	Uvod2	3
4	Uvod3	4
5	Uvod4	5

## **Abstract**

**Key words:**

# 1 Osnovna svojstva

Gledamo prvo klasični odziv jednostavne Fabry-Perot (FP) rezonirajuće komore. FP rezonantna šupljina sastoji se od dva visoko reflektivna zrcala udaljena  $L$  jedno od drugog, i niz rezonancija dane s kružnom frekvencijom  $\omega_{cav,m} \approx \frac{m\pi c}{L}$ . Ovdje je  $m$  cijeli broj koji označava vibracijski mod. Razmak između dva logitudinalna rezonantna moda je dan s  $\delta\omega_{FSR} = \pi \frac{c}{L}$ , gdje  $\delta\omega_{FSR}$  označava slobodni spektralni raspon, odnosno raspon frekvencija kojim naš rezonator ne vibrira. Konačna transparentnost zrcala i interna absorpcija ili raspršenje van rezonantne šupljine dovode do konačnog fotonske stope istjecaja  $\kappa$ .

## 2 Uvod1

### 3 Uvod2

## 4 Uvod3

## 5 Uvod4