



Kapitola 1. Posloupnosti

Karta 1.0.' (aritmetika a neurčité výrazy na \mathbb{R}^*)

Uspořádání na rozšířené množině reálných čísel $\mathbb{R}^* = \langle -\infty, +\infty \rangle$ a absolutní hodnota:

$$-\infty < +\infty \quad -\infty < c < +\infty \quad \text{pro každé } c \in \mathbb{R}$$

$$|-\infty| = |+\infty| = +\infty$$

Stručně o aritmetice \mathbb{R}^* :

$$\begin{array}{ll} -(\pm\infty) = \mp\infty & (+\infty)^c = \begin{cases} 0 & \text{pro } c < 0 \\ +\infty & \text{pro } c > 0 \end{cases} \\ c + (\pm\infty) = \pm\infty & \text{pro } c \neq \mp\infty \\ c \cdot (\pm\infty) = \begin{cases} \pm\infty & \text{pro } c > 0 \\ \mp\infty & \text{pro } c < 0 \end{cases} & c^{+\infty} = \begin{cases} 0 & \text{pro } 0 < c < 1 \\ +\infty & \text{pro } c > 1 \end{cases} \\ \frac{c}{\pm\infty} = 0 & \text{pro } c \in \mathbb{R} & c^{-\infty} = \begin{cases} +\infty & \text{pro } 0 < c < 1 \\ 0 & \text{pro } c > 1 \end{cases} \end{array}$$

odkud je však na první (druhý, třetí, ...) pohled zřejmé, že existuje **7** problematických operací:

$$\text{"}\frac{\infty}{\infty}\text{"} \quad \text{"}\frac{\text{cokoli}}{0}\text{"} \quad \text{"}0 \cdot \infty\text{"} \quad \text{"}\infty - \infty\text{"} \quad \text{"}1^\infty\text{"} \quad \text{"}0^0\text{"} \quad \text{"}\infty^0\text{"}$$

Souhrně je nazýváme **neurčité výrazy** a snadno se s nimi můžeme setkat při výpočtu limit:

$$\begin{array}{ll} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} & \text{limita typu } \text{"}\frac{\infty}{\infty}\text{"} \text{ resp. } \text{"}\frac{0}{0}\text{"} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot b_n & \text{limita typu } \text{"}0 \cdot \infty\text{"} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - b_n) & \text{limita typu } \text{"}\infty - \infty\text{"} \\ \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n^{b_n} & \text{limita typu } \text{"}1^\infty\text{"} \text{ resp. } \text{"}0^0\text{"} \text{ resp. } \text{"}\infty^0\text{"} \end{array}$$

Okolí nevlastních čísel $\pm\infty$:

okolí plus nekonečna

$$U(+\infty) = (1/\delta, +\infty)$$

okolí mínus nekonečna

$$U(-\infty) = \langle -\infty, -1/\delta \rangle$$

prstencové okolí plus nekonečna

$$P(+\infty) = (1/\delta, +\infty)$$

prstencové okolí mínus nekonečna

$$P(-\infty) = \langle -\infty, -1/\delta \rangle$$

Karta 1.0." (limity posloupností)

$$\ln n \ll \sqrt{n} \ll n \ll n^2 \ll n^3 \ll \dots \ll n^k \ll e^n \ll n! \ll n^n$$

$$\triangleright \lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = \begin{cases} 0 & \text{pro } -1 < q < 1 \\ 1 & \text{pro } q = 1 \\ +\infty & \text{pro } 1 < q \\ \nexists & \text{pro } q \leq -1 \end{cases}$$

$$\triangleright \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^k}{a^n} = \begin{cases} 0 & \text{pro } |a| > 1 \\ +\infty & \text{pro } 0 < a \leq 1 \\ \nexists & \text{pro } -1 \leq a < 0 \end{cases} \quad k \in \mathbb{N}$$

$$\triangleright \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln n}{n} = 0 \qquad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\log_a n}{n^k} = 0 \quad \text{pro } a > 0, a \neq 1, k \in \mathbb{N}$$

$$\triangleright \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e^n}{n!} = 0 \qquad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n}{n!} = 0 \quad \text{pro } a \in \mathbb{R}$$

$$\triangleright \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{n^n} = 0$$

$$\underbrace{\log_a n}_{a>0, a \neq 1} \ll \underbrace{n^k}_{|a|>1} \ll \underbrace{a^n}_{a \in \mathbb{R}} \ll n! \ll n^n \qquad k \in \mathbb{N}$$

$$\triangleright \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = 1 \qquad \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a} = 1 \quad \text{pro } a > 0$$

$$\triangleright \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e \qquad \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n = \frac{1}{e}$$

Definice 1.1. (posloupnost reálných čísel)

Posloupnost reálných čísel je zobrazení,

jehož definičním oborem je množina \mathbb{N} a oborem hodnot množina $H \subset \mathbb{R}$.

$$\text{píšeme: } (a_n), \quad (a_n)_{n=1}^{+\infty}, \quad (a_1, a_2, a_3, \dots), \quad (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

Číslo n říkáme index prvku a číslu a_n n -tý člen posloupnosti.

Definice 1.2. (algebra posloupností)

Posloupnosti $\left\{ \begin{array}{l} (a_n + b_n) \\ (a_n - b_n) \\ (a_n \cdot b_n) \\ \left(\frac{a_n}{b_n}\right) \end{array} \right.$ nazýváme $\left\{ \begin{array}{l} \text{součtem} \\ \text{rozdílem} \\ \text{součinem} \\ \text{podílem} \end{array} \right.$ posloupností (a_n) a (b_n) .

(v případě podílu předpokládáme $b_n \neq 0$ pro všechna $n \in \mathbb{N}$)

Definice 1.3. (omezená posloupnost)

Řekneme, že posloupnost (a_n) je

- i) **omezená zdola**, jestliže existuje číslo $m \in \mathbb{R}$ takové, že $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \geq m$,
- ii) **omezená shora**, jestliže existuje číslo $M \in \mathbb{R}$ takové, že $\forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq M$.

Konečně (a_n) je **omezená posloupnost**, pokud je omezená zdola i shora.

(pro omezené posloupnosti se často používá zápis $\exists K > 0 \forall n \in \mathbb{N} : |a_n| \leq K$)

Definice 1.4. (monotónní posloupnost)

Posloupnost (a_n) se nazývá:

$\left. \begin{array}{l} \text{klesající, platí-li } \forall n \in \mathbb{N} : a_n \geq a_{n+1}, \\ \text{rostoucí, platí-li } \forall n \in \mathbb{N} : a_n \leq a_{n+1}, \end{array} \right\} \text{monotónní,}$

$\left. \begin{array}{l} \text{ostře klesající, platí-li } \forall n \in \mathbb{N} : a_n > a_{n+1}, \\ \text{ostře rostoucí, platí-li } \forall n \in \mathbb{N} : a_n < a_{n+1}, \end{array} \right\} \text{ostře monotónní.}$

Definice 1.5. (minimum, maximum, infimum a supremum posloupnosti)

$\left. \begin{array}{l} \text{Minimum} \\ \text{Maximum} \\ \text{Infimum} \\ \text{Supremum} \end{array} \right\} \text{posloupnosti } (a_n), \text{ rozumíme } \left. \begin{array}{l} \text{minimum} \\ \text{maximum} \\ \text{infimum} \\ \text{supremum} \end{array} \right\} \text{množiny } \{a_n\}.$

(korektně množina $\{a_n\} = \{a \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N} : a = a_n\}$ je oborem hodnot posloupnosti)

Definice 1.6. (podposloupnost)

Nechť je dána posloupnost (a_n) a nechť (k_1, k_2, k_3, \dots) je ostře rostoucí posloupnost přirozených čísel. Posloupnost (a_{k_n}) se nazývá **posloupnost vybraná** z posloupnosti (a_n) nebo také **podposloupnost** posl. (a_n) .

Definice 1.7. (limita posloupnosti)

Řekneme, že posloupnost (a_n) má **limitu**, jestliže

existuje $a \in \mathbb{R}^*$ takové, že $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N} : n > n_0 \Rightarrow a_n \in U_\varepsilon(a)$

$$\left(\text{píšeme: } \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = a \quad \lim a_n = a \quad a_n \rightarrow a \right)$$

Rozlišujeme: **limitu vlastní** ... $a \in \mathbb{R}$

limitu nevlastní ... $a = \pm\infty$

Posloupnost (a_n) nazveme: **konvergentní** pokud má vlastní limitu,

divergentní pokud má limitu nevlastní a nebo limita neexistuje.

Věta 1.8. (o limitách posloupností)

i) Každá posloupnost má nejvýše jednu limitu.

ii) Každá konvergentní posloupnost je omezená

$$\text{konvergentní} \Rightarrow \text{omezená}$$

iii) Každá omezená a monotónní posloupnost je konvergentní.

$$\text{konvergentní} \Leftarrow \text{omezená} + \text{monotónní}$$

$$\lim a_n = \inf\{a_n\}$$

klesající

$$\lim a_n = \sup\{a_n\}$$

rostoucí

$$\left(\text{omezená} \not\Rightarrow \text{konvergentní} \quad \text{monotónní} \not\Rightarrow \text{konvergentní} \quad \text{konvergentní} \not\Rightarrow \text{monotónní} \right)$$

Věta 1.9. (algebra limit posloupností)

Mějme dvě posloupnosti, které mají limitu: $\begin{cases} a_n \rightarrow a, \\ b_n \rightarrow b. \end{cases}$

Potom má limitu i jejich součet, rozdíl, součin a podíl, přičemž platí:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = a \pm b$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot b_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = a \cdot b$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n} = \frac{a}{b}$$

$\left(\begin{array}{l} \text{pokud} \\ \text{na pravé straně} \\ \text{není} \\ \text{neurčitý výraz} \end{array} \right)$

Věta 1.10. (o sevření)

Mějme tři posloupnosti (a_n) , (b_n) , (c_n) a předpokládejme, že:

- i) pro skoro všechna n platí $a_n \leq b_n \leq c_n$
- ii) posloupnosti (a_n) , (c_n) mají stejnou limitu a

Potom má posloupnost (b_n) také limitu a platí:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = a$$

Definice 1.11. (Eulerovo číslo)

Eulerovo číslo definujeme vztahem $e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \doteq$

Definice 1.12. (cauchyovská posloupnost)

Reálná posloupnost (a_n) se nazývá **cauchyovská v \mathbb{R}** (**fundamentální v \mathbb{R}**), jestliže:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n, m \in \mathbb{N} : n > n_0 \wedge m > n_0 \Rightarrow |a_n - a_m| < \varepsilon.$$

Definice 1.13. (horní a dolní limita)

Číslo $c \in \mathbb{R}^*$ je **hromadný bod posloupnosti** (a_n) , pokud existuje podposloupnost (a_{k_n}) posloupnosti (a_n) , pro kterou platí

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_{k_n} = c.$$

Označme: $M = \{ c \in \mathbb{R}^* : c \text{ je hromadný bod posloupnosti } (a_n) \}$

Supremum (infimum) množiny M nazveme **horní (dolní) limitou** posloupnosti (a_n) :

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n = \sup M \quad (= \limsup_{n \rightarrow +\infty} a_n \text{ tzv. limes superior })$$

$$\underline{\lim}_{n \rightarrow +\infty} a_n = \inf M \quad (= \liminf_{n \rightarrow +\infty} a_n \text{ tzv. limes inferior })$$