

南京信息工程大学 2022-2023 学年第一学期

《高等数学 (1)》第二次月考暨期中试卷参考答案及评分标准

一、填空题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 函数 $y = \ln(1-2x) + \arcsin \frac{x-1}{2}$ 的定义域为 $\left[-1, \frac{1}{2}\right]$.

2. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{20^n + 1960^n + 70^n + 2022^n} = 2022$. $2022^n < 20^n + 1960^n + 70^n + 2022^n < 4 \cdot 2022^n$

3. 设函数 $f(x) = \cos(5x)$, 则当 $n \geq 1$ 时, $f^{(n)}(x) = 5^n \cos\left(5x + \frac{n\pi}{2}\right)$.

4. 函数 $f(x) = \begin{cases} e^{\frac{x}{2}} + \cos x - 2, & x < 0 \\ 2 \sin x, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的左导数 $f'_-(0) = \frac{1}{2}$. $f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{x}{2}} + \cos x - 2}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}} - \sin x}{1} = \frac{1}{2}$

5. 设 $y = \operatorname{arccot} \sqrt{1-x}$, 则 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=-1} = \frac{\sqrt{2}}{12}$.

二、选择题 (每题 3 分, 共 15 分)

1. 函数 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处连续是可微的 (B)

- (A) 充分非必要条件 (B) 必要非充分条件
(C) 充要条件 (D) 既非充分也非必要条件

2. 设函数 $y = f(e^{-x})$, 则 $y' =$ (C)

- (A) $f'(e^{-x})$ (B) $e^{-x} f'(e^{-x})$ (C) $-e^{-x} f'(e^{-x})$ (D) $-f'(e^{-x})$

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{3}, & x \leq 1 \\ x^2, & x > 1 \end{cases}$, 则在 $x=1$ 处 $f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$, $f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{2}{3}$ (A)

- (A) 左导数存在, 右导数不存在 (B) 左导数与右导数均存在
(C) 左导数与右导数均不存在 (D) 左导数不存在, 右导数存在

4. 由方程 $xy + 2 \ln x = y^4$ 所确定的 $y = f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线方程为 (D)

- (A) $x + y = 1$ (B) $x - y = 1$ (C) $y = -x$ (D) $y = x$

5. 设函数 $f(x) = x(x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)$, 则方程 $f'(x) = 0$ 根的个数为 (C)

- (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6

$f(x) = 0 \Rightarrow x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2, x_4 = 3, x_5 = 4, x_6 = 5$.
 $f'(x) = 0$ 的根为 $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2, x_4 = 3, x_5 = 4, x_6 = 5$.



三、计算题 (每小题 6 分, 共 30 分)

1. 求函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{(1 - e^{-x}) \ln(1 + x^2)}$.

解: 原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+x^2} - 1}{3x^2}$ 4 分

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-1}{3(1+x^2)} = -\frac{1}{3}$6 分

2. 求函数极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (e^x + x)^{\frac{1}{\tan 2x}}$.

解: 原式 $= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x + x)}{\tan 2x}} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(e^x + x)}{2x}}$ 3 分

$= e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^x + 1}{2(e^x + x)}} = e$6 分

3. 设 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $f(x_0 + 3\Delta x) - f(x_0) - 2\Delta x$ 是比 Δx 高阶的无穷小, 求 $df(x_0)$.

解: 由题设 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 3\Delta x) - f(x_0) - 2\Delta x}{\Delta x} = 0$, 则2 分

$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 3\Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 3\Delta x) - f(x_0)}{3\Delta x} \times 3 = 3f'(x_0) = 2$4 分

于是 $df(x_0) = f'(x_0)dx = \frac{2}{3}dx$6 分

4. 设 $y = x^2 e^{2x}$, 求 $y^{(20)}$.

解: 记 $u = e^{2x}$, $v = x^2$, 则 $u^{(k)} = 2^k e^{2x}$, $v' = 2x$, $v'' = 2$, $v''' = 0$2 分

由莱布尼兹公式, $y^{(20)} = u^{(20)}v + C_{20}^1 u^{(19)}v' + C_{20}^2 u^{(18)}v'' + 0$ 4 分

$= 2^{20} e^{2x} \cdot x^2 + 20 \cdot 2^{19} e^{2x} \cdot 2x + 190 \cdot 2^{18} e^{2x} \cdot 2$

$= 2^{20} e^{2x} (x^2 + 20x + 95)$6 分

5. 设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t) \\ y = t^3 + \frac{3}{2}t^2 \end{cases}$ 所确定, 求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2} \Big|_{t=1}$.

解: $\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{3t^2 + 3t}{1 - \frac{1}{1+t}} = 3(t+1)^2$2 分



$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right)}{\frac{dx}{dt}} = \frac{6(t+1)}{1-\frac{1}{1+t}} = \frac{6(t+1)^2}{t}, \quad \left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{t=1} = \left.\frac{6(t+1)^2}{t}\right|_{t=1} = 24. \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

四、(本题 8 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} e^{ax}, & x \leq 0 \\ b(1-x^2), & x > 0 \end{cases}$ 处处可导, 求 a, b .

解: $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = b = f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$ 2 分

$f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 则 $f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1-x^2-1}{x} = 0$ 5 分

$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a = f'_+(0) = 0$. 即 $a=0, b=1$ 8 分

五、(本题 8 分) 求函数 $f(x) = \frac{x \arctan x}{e^{\frac{x^2}{x^2-1}} - 1}$ 的间断点, 并判断其类型.

解: 函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 及 $x=2$ 处无定义.

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \arctan x}{e^{\frac{x^2}{x^2-1}} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\frac{x^2}{x-2}} = \lim_{x \rightarrow 0} (x-2) = -2$, $x=0$ 是第一类可去间断点. 4 分

$\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x \arctan x}{e^{\frac{x^2}{x^2-1}} - 1} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x \arctan x}{e^{\frac{x^2}{x^2-1}} - 1} = -2 \arctan 2$, $x=2$ 是第一类跳跃间断点. 8 分

六、(本题 8 分) 设函数 $f(x)$ 具有连续的二阶导数, $f(0)=0$, $g(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ f'(0), & x = 0 \end{cases}$. 求 $g'(x)$ 并

讨论 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

解: 由题设, $g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x) - g(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{f(x)}{x} - f'(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f'(0)x}{x^2}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) - f'(0)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2} = \frac{1}{2} f''(0)$ 3 分

$g'(x) = \begin{cases} \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2}, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2} f''(0), & x = 0 \end{cases}$ 5 分



$$\lim_{x \rightarrow 0} g'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf'(x) - f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x) + xf''(x) - f'(x)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{2} = \frac{1}{2} f''(0) = g'(0),$$

则 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.8 分

七、(本题 8 分) 证明费马引理: 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有定义, 且在 x_0 处可导. 若

对任意的 $x \in U(x_0)$, 有 $f(x) \leq f(x_0)$, 则 $f'(x_0) = 0$.

-只有导数定义 2分

证明: $f(x)$ 在 x_0 处可导, 且 $\forall x \in U(x_0)$, 有 $f(x) \leq f(x_0)$, 则 $f(x) - f(x_0) \leq 0$.

由导数的定义及极限的保号性, $\forall x \in U(x_0)$,

$$\text{当 } x > x_0 \text{ 时, } \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0, \quad f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq 0. \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

少" = " -2

$$\text{当 } x < x_0 \text{ 时, } \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0, \quad f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \geq 0. \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$\text{所以 } f'(x_0) = f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = 0. \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

八、(本题 8 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 内连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $f(0) = f(1) = 0$. 证明:

$(x^2 + 1)f'(x) - 2xf(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少存在一个根.

$$\text{证明: 令 } F(x) = \frac{f(x)}{x^2 + 1}, \quad x \in [0, 1], \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $F(0) = F(1) = 0$. 由罗尔定理,5 分

$$\text{至少存在一点 } \xi \in (0, 1), \text{ 使得 } F'(\xi) = \frac{(x^2 + 1)f'(x) - 2xf(x)}{(x^2 + 1)^2} \Big|_{x=\xi} = 0, \quad 2'$$

则 $(x^2 + 1)f'(x) - 2xf(x) = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个根 ξ , 得证.8 分

注: 有的题目有多种解法, 以上解答和评分标准仅供参考.

