

Inlever 1 Lial 2

Boris van Boxtel en Lotte Gritter

November 2022

- (a). Lemma 7.3.2. De kern van een lineaire afbeelding $A : V \rightarrow W$ is een lineaire deelruimte van V .

De kern van A is de verzameling van alle elementen in A waarvoor geldt dat $A(x) = 0$. We gaan bewijzen dat $\ker(A)$ een lineaire deelruimte van V is door te laten zien dat $\ker(A)$ niet leeg is, en dat optelling en scalaire vermenigvuldiging gedefiniëerd zijn.

Bewijs.

1. De kern van A bevat de nulvector.
2. Stel x, y in $\ker(A)$. Dan geldt dat $A(x + y) = A(x) + A(y) = \mathbf{0} + \mathbf{0} = \mathbf{0}$. Dus $x + y$ zit in $\ker(A)$.
3. Stel λ in \mathbb{R} en x in $\ker(A)$. Vanwege lineairiteit geldt dat $A(\lambda x) = \lambda A(x) = \lambda \mathbf{0} = \mathbf{0}$.

□

- (b). Lemma 7.3.5. Zij V, W een tweetal vectorruimten en $A : V \rightarrow W$ een lineaire afbeelding. Dan is $A(V)$ een lineaire deelruimte van W .

Het bewijs hiervoor lijkt op het bewijs bij (a).

Bewijs.

1. $A(V)$ is niet leeg, want $\mathbf{0} = A(0) \in A(V)$.
- 2.

□

- (c). Laat V een vectorruimte zijn van dimensie n en B een basis van V . (hier moet nog tekst).

We gaan bewijzen dat f_B een isomorfisme geeft tussen V en \mathbb{R}_n .

- (d). *Bewijs.*

□