

Содержание

1	Понятие первообразной. Теорема о двух первообразных. Понятие неопределенного интеграла.	3
2	Таблица неопределенных интегралов.	4
3	Свойства неопределенного интеграла.	4
4	Интегрирование рациональных дробей. Теорема о разложении на простейшие дроби и две леммы.	5
5	Интегрирование простейших дробей	5
6	Определение интеграла Римана. Пример неинтегрируемой функции.	5
6.1	Пример неинтегрируемой функции.	6
7	Понятие сумм Дарбу, их свойства: неравенство для интегральной суммы, представления точными гранями, неравенства при измельчении разбиения, неравенства между верхней и нижней суммой для разных разбиений.	7
7.1	Очевидно, что . . . ака неравенство для интегральной суммы.	7
7.2	Представление точными гранями.	7
7.3	Неравенства при измельчении разбиения.	8
7.4	Неравенство между верхней и нижней суммой Дарбу при различных разбиениях.	8
8	Понятия интегралов Дарбу. Неравенство, связывающее суммы и интегралы Дарбу. Необходимое условие интегрируемости функции.	9
8.1	Неравенство связывающее суммы и интегралы Дарбу.	9
8.2	Необходимое условие интегрируемости.	9
9	Критерии интегрируемости (Дарбу, Римана, через интегралы Дарбу). Запись с помощью колебания функции.	9
9.1	Запись с помощью колебаний функции.	10
10	Свойства интегрируемых функций: линейность; интегрируемость произведения, частного, модуля; интегрируемость на меньшем отрезке и на склейке отрезков.	10
10.1	Склейка отрезков	12
11	Классы интегрируемых функций: непрерывная, с конечным числом точек разрыва, монотонная.	12
11.1	Интегрируемость непрерывной функции	12
11.2	Конечное число точек разрыва	13
11.3	Интегрируемость монотонной функции	13
12	Свойства интеграла Римана: линейность; аддитивность по промежутку, монотонность, делимость от нуля, неравенство с модулем.	14
12.1	Линейность определенного интеграла	14
12.2	Аддитивность по промежутку интегрирования	14
12.3	Монотонность интеграла	14
12.4	Делимость от нуля	15
12.5	Неравенство с модулем	15
13	Первая теорема о среднем	15
14	Интеграл с переменным верхним пределом: определение, непрерывность, дифференцируемость (две теоремы).	16
14.1	Непрерывность $\Phi(x)$	16
14.2	Дифференцируемость $\Phi(x)$	16

15	Формула Ньютона-Лейбница. Усиленная формула и обобщенная формула.	17
15.1	Формула Ньютона-Лейбница	17
15.2	Усиленная формула Ньютона-Лейбница	18
15.3	Обобщенная формула Ньютона-Лейбница	18

Билеты к коллоку

i.g. i.a.

20 марта 2023 г.

1 Понятие первообразной. Теорема о двух первообразных. Понятие неопределенного интеграла.

Замечание: Ниже под обозначением $\langle a, b \rangle$ будет пониматься произвольный промежуток: отрезок, интервал или полуинтервал.

Определение. Первообразной функции $f(x)$ на промежутке $\langle a, b \rangle$ называется функция $F(x)$ такая, что для всех $x \in \langle a, b \rangle$ выполняется равенство:

$$F'(x) = f(x)$$

Несколько примеров:

1. Пусть $f(x) = x^2$, тогда первообразная $F(x) = \frac{x^3}{3}$;
2. Пусть $f(x) = \sin x$, тогда $F(x) = -\cos x$;
3. Пусть $f(x) = 0$, тогда $F(x) = C$, $C \in \mathbb{R}$.

и так далее.

Теорема (о двух первообразных). Пусть $F(x)$ - первообразная функция $f(x)$ на $\langle a, b \rangle$. Для того, чтобы $\Phi(x)$ также была первообразной для $f(x)$ на $\langle a, b \rangle$, необходимо и достаточно, чтобы

$$F(x) - \Phi(x) \equiv C, \quad \forall x \in \langle a, b \rangle$$

Доказательство. Необходимость. Пусть $\Psi(x) = F(x) - \Phi(x)$, где $F(x), \Phi(x)$ - первообразные $f(x)$ на $\langle a, b \rangle$. Тогда $\forall x \in \langle a, b \rangle$:

$$\Psi'(x) = (F(x) - \Phi(x))' = F'(x) - \Phi'(x) = f(x) - f(x) = 0$$

По следствию из теоремы Лагранжа, для любых $x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle$ таких, что $x_1 < x_2$

$$\Psi(x_2) - \Psi(x_1) = \Psi'(\xi)(x_2 - x_1) = 0, \quad \xi \in (x_1, x_2)$$

тогда $\Psi(x) \equiv \text{const}$

Достаточность. Пусть $F(x) - \Phi(x) = C$ выполнено, тогда $\Phi(x) = F(x) + C$ и тогда

$$\Phi'(x) = F'(x) + C' = F'(x) + 0 = f(x)$$

значит $\Phi(x)$ - первообразная $f(x)$ на $\langle a, b \rangle$. □

Определение. Неопределенным интегралом функции $f(x)$ на промежутке $\langle a, b \rangle$ называется множество всех первообразных на этом промежутке. Обозначается:

$$\int f(x) dx$$

Также это значит, что

$$\int f(x)dx = F(x) + C$$

Определение. Функция $F(x)$ называется *обобщенной первообразной* $f(x)$ на $\langle a, b \rangle$, если $F(x)$ - непрерывна на $\langle a, b \rangle$ и $F'(x) = f(x)$ везде, кроме не более чем конечного числа точек.

2 Таблица неопределенных интегралов.

1. $\int 0 \cdot dx = C$	9. $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\text{ctg}x + C$
2. $\int dx = \int 1 \cdot dx = x + C$	10. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \text{tg}x + C$
3. $\int x^n \cdot dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C,$ $n \neq -1, x > 0$	11. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C, x < a $
4. $\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$	12. $\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctg \frac{x}{a} + C$
5. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$	13. «Высокий» логарифм: $\int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{a+x}{a-x} \right + C, x \neq a$
6. $\int e^x dx = e^x + C$	14. «Длинный» логарифм: $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right + C$
7. $\int \sin x dx = -\cos x + C$	
8. $\int \cos x dx = \sin x + C$	

Рис. 1: Таблица неопределенных интегралов.

Доказательство каждого из них состоит в том, что нужно продифференцировать правую часть. . . **!!ВЫУЧИТЕ ТАБЛИЦУ!!**

3 Свойства неопределенного интеграла.

ladies and gentlemen:

1. **Теорема (связь с производной).** Пусть $\int f(x)dx$ на $\langle a, b \rangle$, тогда на $\langle a, b \rangle$:

(a) $(\int f(x)dx)' = f(x);$

(b) $d(\int f(x)dx) = f(x)dx.$

Доказательство. 1, 2)

$$\left(\int f(x)dx \right)' = (F(x) + C)' = f(x)$$

Напомним, что $df = f'(x)dx$ и все становится очевидно.

□

2. **Лемма.** Если $F(x)$ интегрируема на $\langle a, b \rangle$, то $\int dF(x) = F(x) + C$.

3. **Теорема (линейность).** Пусть на $\langle a, b \rangle$ существуют неопределенные интегралы $\int f(x)dx$ и $\int g(x)dx$, $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$. Тогда

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x))dx = \alpha \int f(x)dx + \beta \int g(x)dx$$

Доказательство. По предыдущему свойству,

$$\left(\alpha \int f(x)dx + \beta \int g(x)dx \right)' = \alpha f(x) + \beta g(x)$$

проинтегрировав обе части получим, что

$$\alpha \int f(x)dx + \beta \int g(x)dx = \int (\alpha f(x) + \beta g(x))dx$$

□

4. **Теорема формулы замены переменной.** Пусть на $\langle a, b \rangle$ существует неопределенный интеграл $\int f(x)dx$, $\varphi(t) : \langle \alpha, \beta \rangle \rightarrow \langle a, b \rangle$, дифференцируема на $\langle \alpha, \beta \rangle$, тогда

$$\int f(x)dx = \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$$

Доказательство. Пусть $F(x)$ - первообразная для функции $f(x)$ на $\langle a, b \rangle$, тогда, согласно теореме о производной сложной функции, $F(\varphi(t))$ - первообразная для функции $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ на $\langle \alpha, \beta \rangle$, откуда и следует равенство. □

5. **Теорема формула интегрирования по частям.** Пусть u, v - дифференцируемы на $\langle a, b \rangle$ и на этом промежутке существует неопределенный интеграл $\int vdu$, тогда на $\langle a, b \rangle$

$$\int vdu = uv - \int u dv$$

Доказательство.

$$(uv)' = u'v + uv'$$

перейдем к дифференциалам

$$d(uv) = u dv + v du \Leftrightarrow v du = d(uv) - u dv$$

проинтегрировав (найдем первообразные) обе части получим требуемое. □

4 **Интегрирование рациональных дробей. Теорема о разложении на простейшие дроби и две леммы.**

5 **Интегрирование простейших дробей**

6 **Определение интеграла Римана. Пример неинтегрируемой функции.**

Определение. Говорят, что **разбиение** τ введено на отрезке, если введена система точек x_i , $i \in \{0, 1, \dots, n\}$, удовлетворяющая условию:

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$$

Обозначения:

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \quad \Delta_i = [x_{i-1}, x_i], \quad i \in \{1, 2, \dots, n\}$$

Определение. Величина $\lambda(\tau) = \max_{i \in \{1, 2, \dots, n\}} \Delta x_i$ называется **мелкостью(или рангом) разбиения(дробления)**.

Определение. Говорят, что на отрезке введено **оснащенное разбиение** (τ, ξ) , если на нем введено разбиение τ и выбрана система точек $\xi_i, i \in \{1, 2, \dots, n\}$, таким образом, что они находятся внутри i -ых отрезков.

Определение. Пусть на отрезке задана функция $f(x)$ и введена разбиение (τ, ξ) . Величина

$$\sigma_\tau(f, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

называется **интегральная суммой** для функции $f(x)$ на отрезке.

Определение. Пусть функция $f(x)$ задана на отрезке $[a, b]$. Говорят, что число I является **интегральным Римана** от функции $f(x)$ по отрезку $[a, b]$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta, \forall \xi \Rightarrow |\sigma_\tau(f, \xi) - I| < \varepsilon$$

при этом пишут

$$I = \int_a^b f(x) dx$$

Определение. Функция $f(x)$, для которой существует интеграл Римана на отрезке $[a, b]$, называется **интегрируемой по Риману** на этом отрезке и обозначается $f \in R[a, b]$.

6.1 Пример неинтегрируемой функции.

Например *функция Дирихле*

$$d(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

не интегрируема ни на каком отрезке. Рассмотрим отрезок $[0, 1]$ и пусть τ - разбиение на нем. Выберем в каждом отрезке Δ_i точку $\xi_i \in \mathbb{Q}$. Тогда

$$\sigma_\tau(f, \xi) = \sum_{i=1}^n d(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \Delta x_i = 1$$

Выберем в каждом отрезке Δ_i точку $\xi_i \in \mathbb{I}$. Тогда

$$\sigma_\tau(f, \xi) = \sum_{i=1}^n d(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n 0 \Delta x_i = 0$$

Тем самым, устремляя мелкость разбиения к нулю, "предел" зависит от выбора средних точек ξ , что противоречит определению интеграла.

Определение. Расширим определение интеграла:

$$\int_a^a f(x) dx = 0$$

$$\int_b^a f(x) dx = - \int_a^b f(x) dx, \quad a < b$$

7 Понятие сумм Дарбу, их свойства: неравенство для интегральной суммы, представления точными гранями, неравенства при измельчении разбиения, неравенства между верхней и нижней суммой для разных разбиений.

Определение. Пусть функция $f(x)$ задана на отрезке $[a, b]$ и τ - некоторое разбиение этого отрезка. Величины

$$S_\tau(f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad M_i = \sup_{x \in \Delta_i} f(x)$$

$$s_\tau(f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i, \quad m_i = \inf_{x \in \Delta_i} f(x)$$

называют **верхней и нижней суммами Дарбу** для $f(x)$, отвечающими разбиению τ , соответственно.

7.1 Очевидно, что ... aka неравенство для интегральной суммы.

Из определения нижней и верхней сумм дарбу очевидно:

$$s_\tau(f) \leq \sigma_\tau(f, \xi) \leq S_\tau(f)$$

Лемма. Ограниченность $f(x)$ сверху(снизу) равносильна конечности верхней(нижней) суммы Дарбу.

Доказательство. Очевидно.

По хорошему, если функция $f(x)$ ограничена сверху, то ее супремум конечное число, и так как все супремумы на отрезках не больше супремума функции, *очевидно*, что верхняя сумма Дарбу конечна. \square

7.2 Представление точными гранями.

Лемма. Справедливы равенства.

$$S_\tau(f) = \sup_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi), \quad s_\tau(f) = \inf_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi)$$

Доказательство. Докажем первое равенство.

Очевидно что... $S_\tau(f) \geq \sigma_\tau(f, \xi)$. Пусть f ограничена сверху на $[a, b]$. Пусть $\varepsilon > 0$ и по определению супремума

$$\exists \xi_i \in \Delta_i : M_i - \frac{\varepsilon}{b-a} < f(\xi_i), \quad i = 1 \dots n$$

Домножим каждое неравенство на Δx_i и сложим по i , получим

$$\sum_{i=1}^n \left(M_i - \frac{\varepsilon}{b-a} \right) \Delta x_i < \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

свернув в правой и левой части формулы получим

$$S_\tau(f) - \varepsilon < \sigma_\tau(f, \xi)$$

и так как $S_\tau(f) \geq \sigma_\tau(f, \xi)$:

$$S_\tau(f) = \sup_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi)$$

по критерию супремума.

Если f не ограничена сверху на $[a, b]$, то она не ограничена хотя бы на одной подотрезке $[a, b]$. Для определенности рассмотрим такой подотрезок Δ_1 . Тогда на этом подотрезке супремумом будет являться $+\infty$, а тогда верхняя сумма Дарбу

$$S_\tau(f) = \sum_{i=1}^{n-1} M_i \Delta x_i + \infty = +\infty$$

А так как любая интегральная сумма будет меньше чем $S_\tau(f)$, то $S_\tau(f) = \sup_\xi \sigma_\tau(f, \xi)$.

Второе равенство доказывается аналогично. □

7.3 Неравенства при измельчении разбиения.

Определение. Пусть на отрезке $[a, b]$ введены разбиения τ_1 и τ_2 . Говорят, что разбиение τ_1 является **измельчением** разбиения τ_2 , если $\tau_2 \subset \tau_1$.

Лемма. Пусть $\tau_2 \subset \tau_1$, тогда.

$$S_{\tau_2}(f) \geq S_{\tau_1}(f), \quad s_{\tau_1}(f) \geq s_{\tau_2}(f)$$

то есть при измельчении разбиения, верхние суммы Дарбу не увеличиваются, а нижние суммы Дарбу не уменьшаются.

Доказательство. Достаточно доказать лемму для случая, когда измельчение τ_1 получается из τ_2 добавлением одной точки $\hat{x} \in (x_{k-1}, x_k)$. Тогда

$$S_{\tau_2} = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = \sum_{i=1, i \neq k}^n M_i \Delta x_i + M_k \Delta x_k$$

Пусть $M'_k = \sup_{x \in [x_{k-1}, \hat{x}]} f(x)$ и $M''_k = \sup_{x \in [\hat{x}, x_k]} f(x)$,

$$M_k \geq M'_k, \quad M_k \geq M''_k$$

и далее распишем $M_k \Delta x_k$

$$M_k \Delta x_k = M_k(\hat{x} - x_{k-1}) + M_k(x_k - \hat{x}) \geq M'_k(\hat{x} - x_{k-1}) + M''_k(x_k - \hat{x}),$$

откуда (очевидно)

$$S_{\tau_2}(f) \geq \sum_{i=1, i \neq k}^n M_i \Delta x_i + M'_k(\hat{x} - x_{k-1}) + M''_k(x_k - \hat{x}) = S_{\tau_1}(f)$$

Второе неравенство доказывается аналогично. □

7.4 Неравенство между верхней и нижней суммой Дарбу при различных разбиениях.

Лемма. Пусть τ_1 и τ_2 - разбиения отрезка $[a, b]$, тогда.

$$s_{\tau_1}(f) \leq S_{\tau_2}(f)$$

то есть любая нижняя сумма Дарбу не превосходит любой верхней суммы Дарбу.

Доказательство. Пусть разбиения $\tau = \tau_1 \cup \tau_2$ является разбиением отрезка $[a, b]$, причем $\tau_1 \subset \tau$, $\tau_2 \subset \tau$. По прошлой лемме и неравенстве между интегральными суммами и суммами Дарбу:

$$s_{\tau_1}(f) \leq s_\tau(f) \leq S_\tau(f) \leq S_{\tau_2}(f)$$

что очевидно доказывает лемму. □

8 Понятия интегралов Дарбу. Неравенство, связывающее суммы и интегралы Дарбу. Необходимое условие интегрируемости функции.

Определение. Пусть функция задана и ограничена на $[a, b]$. Величины

$$I^*(f) = \inf_{\tau} S_{\tau}(f), \quad I_*(f) = \sup_{\tau} s_{\tau}(f)$$

называются **верхним и нижним интегралами Дарбу** соответственно.

8.1 Неравенство связывающее суммы и интегралы Дарбу.

Для любых разбиений τ_1 и τ_2 отрезка $[a, b]$ выполнено неравенство

$$s_{\tau_1}(f) \leq I_* \leq I^* \leq S_{\tau_2}(f)$$

доказательство очевидно.

8.2 Необходимое условие интегрируемости.

Пусть $f \in R[a, b]$, тогда f ограничена на $[a, b]$.

Доказательство. Пусть f не ограничена, например сверху. Тогда $S_{\tau}(f) = +\infty$ для любого разбиения τ . Поэтому для любого числа I и разбиения τ найдется такое оснащенное разбиение (τ, ξ) , что

$$\sigma_{\tau}(f, \xi) > I + 1$$

то есть никакое число I не является интегралом данной функции. \square

9 Критерии интегрируемости (Дарбу, Римана, через интегралы Дарбу). Запись с помощью колебания функции.

Теорема (Критерии интегрируемости). Пусть f задана на $[a, b]$. Тогда следующие утверждения равносильны:

1. $f \in R[a, b]$;

2. Критерий Дарбу:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall \tau \lambda(\tau) < \delta \Rightarrow S_{\tau}(f) - s_{\tau}(f) < \varepsilon$$

3. Критерий Римана:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \tau : S_{\tau}(f) - s_{\tau}(f) < \varepsilon$$

4.

$$I_* = I^* \quad (= I)$$

Доказательство. • Докажем $1 \Rightarrow 2$. Пусть функция $f(x)$ интегрируема на отрезке $[a, b]$ и $\varepsilon > 0$. Тогда

$$\exists \delta > 0 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta \quad \Rightarrow \quad |\sigma_{\tau}(f, \xi) - I| < \frac{\varepsilon}{3}$$

откуда (раскрываем модуль)

$$I - \frac{\varepsilon}{3} < \sigma_{\tau}(f, \xi) < I + \frac{\varepsilon}{3}$$

перейдем к инфимуму и к супремуму в левой и правой части соответственно

$$I - \frac{\varepsilon}{3} \leq s_{\tau}(f) \leq S_{\tau}(f) \leq I + \frac{\varepsilon}{3}$$

откуда

$$S_{\tau}(f) - s_{\tau}(f) \leq \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon$$

- Переход $2 \Rightarrow 3$ очевиден, так как мы доказали для любого разбиения, а в критерии Римана сужение к "какому-то".
- Докажем $3 \Rightarrow 4$. Пусть $\varepsilon > 0$ и разбиение τ такое, что $S_\tau(f) - s_\tau(f) < \varepsilon$. Заметим, что тогда f ограничена. Так как (из предыдущих свойств)

$$s_\tau \leq I_* \leq I^* \leq S_\tau$$

то $0 \leq I^* - I_* < \varepsilon$ для любого ε . То есть $I^* = I_*$.

- И докажем $4 \Rightarrow 1$. Пусть $I^* = I_* = I$. Тогда для $\varepsilon > 0$

$$I_* = \sup_{\tau} s_\tau \Rightarrow \exists \tau_1 : s_{\tau_1} > I_* - \frac{\varepsilon}{4}$$

$$I^* = \inf_{\tau} S_\tau \Rightarrow \exists \tau_2 : S_{\tau_2} > I^* + \frac{\varepsilon}{4}$$

□

9.1 Запись с помощью колебаний функции.

Определение. Пусть функция $f(x)$ задана на множестве E . **Колебанием функции** на этом множестве называется величина

$$\omega(f, E) = \sup_{x, y \in E} |f(x) - f(y)|$$

И из определений супремума и инфимума легко получить

$$\omega(f, E) = \sup_{x \in E} f(x) - \inf_{x \in E} f(x)$$

И в критериях Дарбу и Римана можно заменить $S_\tau - s_\tau$

$$S_\tau - s_\tau = \sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i$$

10 Свойства интегрируемых функций: линейность; интегрируемость произведения, частного, модуля; интегрируемость на меньшем отрезке и на склейке отрезков.

Пусть $f(x), g(x) \in R[a, b]$, тогда

1. $\alpha f(x) + \beta g(x) \in R[a, b], \alpha, \beta \in \mathbb{R}$;
2. $f(x)g(x) \in R[a, b]$;
3. $|f(x)| \in R[a, b]$;
4. Если $|f(x)| \geq C > 0$ на $[a, b]$, то $\frac{1}{f(x)} \in R[a, b]$;
5. Пусть $[c, d] \subset [a, b]$, тогда $f(x) \in R[c, d]$.

Доказательство. 1. Так как

$$\begin{aligned} |\alpha f(x) + \beta g(x) - \alpha f(y) - \beta g(y)| &\leq |\alpha| |f(x) - f(y)| + |\beta| |g(x) - g(y)| \leq \\ &\leq |\alpha| \omega(f, E) + |\beta| \omega(g, E) \end{aligned}$$

то переходя к супремуму в левой части

$$\omega(\alpha f + \beta g, E) \leq |\alpha| \omega(f, E) + |\beta| \omega(g, E)$$

Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $f \in R[a, b]$, перепишем критерий Дарбу через колебания

$$\exists \delta_1 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta_1 \Rightarrow \sum_{i=1}^n \omega(f, \Delta_i) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2(|\alpha| + 1)}$$

аналогично для g :

$$\exists \delta_2 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta_2 \Rightarrow \sum_{i=1}^n \omega(g, \Delta_i) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2(|\beta| + 1)}$$

Пусть $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, тогда для любого τ такого, что $\lambda(\tau) < \delta$ выполняется

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \omega_i(\alpha f + \beta g) \Delta x_i &\leq |\alpha| \sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i + |\beta| \sum_{i=1}^n \omega_i(g) \Delta x_i \leq \\ &\leq \frac{|\alpha| \varepsilon}{2(|\alpha| + 1)} + \frac{\beta \varepsilon}{2(|\beta| + 1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Значит по критерию Дарбу, $\alpha f + \beta g \in R[a, b]$.

2. Так как $f, g \in R[a, b]$, то по необходимому условию они ограничены на $[a, b]$, то есть

$$\exists C : |f(x)| < C, |g(x)| < C, \forall x \in [a, b]$$

Кроме того, так как

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - f(y)g(y)| &= |f(x)g(x) - f(x)g(y) + f(x)g(y) - f(y)g(y)| \leq \\ &\leq |f(x)||g(x) - g(y)| + |g(y)||f(x) - f(y)| \leq C(\omega_i(f) + \omega_i(g)) \end{aligned}$$

то переходя к супремуму в левой части неравенства получим, что

$$\omega_i(fg) \leq C(\omega_i(f) + \omega_i(g))$$

Распишем критерии Дарбу через колебания для f, g (прошлый пункт) и тогда

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \omega_i(fg) \Delta x_i &\leq C \left(\sum_{i=1}^n f \Delta x_i + \sum_{i=1}^n g \Delta x_i \right) \leq \\ &\leq C \left(\frac{\varepsilon}{2C} + \frac{\varepsilon}{2C} \right) = \varepsilon \end{aligned}$$

3. Так как

$$||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)| \leq \omega_i(f)$$

то, переходя к супремуму в левой части неравенства, получается, что

$$\omega_i(|f|) \leq \omega_i(f)$$

далее аналогично п1, п2

4. Так как

$$\left| \frac{1}{f(x) - \frac{1}{f(y)}} \right| = \frac{f(x) - f(y)}{f(x)f(y)} \leq \frac{|f(x) - f(y)|}{C^2} \leq \frac{\omega_i(f)}{C^2}$$

то переходя к супремуму

$$\omega_i\left(\frac{1}{f}\right) \leq \frac{\omega_i(f)}{C^2}$$

далее аналогично п1, п2

5. Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $f \in R[a, b]$, то, согласно критерию Дарбу

$$\exists \delta : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta \Rightarrow \sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i < \varepsilon$$

Пусть τ' - произвольное разбиение отрезка $[c, d]$ такое, что $\lambda(\tau') < \delta$. Дополним его до разбиения τ отрезка $[a, b]$ так, чтобы $\lambda(\tau) < \delta$, введя разбиения отрезков $[a, c]$ и $[d, b]$, но не добавляя новых точек в отрезок $[c, d]$. Тогда

$$\sum_{[c,d]} \omega_i(f) \Delta x_i \leq \sum_{[a,b]} \omega_i(f) \Delta x_i < \varepsilon$$

так как все слагаемые входящие в левую сумму, входят в правую сумму и омеги больше нуля. Таким образом $f \in R[c, d]$. □

10.1 Склейка отрезков

Теорема (склейка отрезков). Пусть $f(x) \in R[a, c]$, $f(x) \in R[c, b]$, тогда $f(x) \in R[a, b]$.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Так как функция $f \in R[a, c]$, то по критерию Римана

$$\exists \tau_1 : \sum_{[a,c]} \omega_i(f) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}$$

и аналогично для $f \in R[c, b]$

$$\exists \tau_2 : \sum_{[c,b]} \omega_i(f) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2}$$

Пусть $\tau = \tau_1 \cup \tau_2$ является разбиением отрезка $[a, b]$, причем

$$\sum_{[a,b]} \omega_i(f) \Delta x_i = \sum_{[a,c]} \omega_i(f) \Delta x_i + \sum_{[c,b]} \omega_i(f) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

значит по критерию Римана $f(x) \in R[a, b]$. □

11 Классы интегрируемых функций: непрерывная, с конечным числом точек разрыва, монотонная.

11.1 Интегрируемость непрерывной функции

Теорема (об интегрируемости непрерывной функции). Непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция интегрируема на нем.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Непрерывная на отрезке функция равномерно непрерывна на нем по теореме Кантора, а значит

$$\exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in [a, b] : |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

Пусть τ - разбиение отрезка $[a, b]$, причем $\lambda(\tau) < \delta$, тогда

$$\omega_i(f) < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

и

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \varepsilon$$

тогда по критерию Римана, $f \in R[a, b]$. □

11.2 Конечное число точек разрыва

Теорема (о конечном числе точек разрыва). Пусть f задана и ограничена на $[a, b]$. Пусть, кроме того, множество точек разрыва - конечно. Тогда функция интегрируема.

Доказательство. Так как функция ограничена, то $|f| \leq C$. Тогда $\omega(f, [a, b]) \leq 2C$ (так как колебание по определению - модуль разности супремума и инфимума, которые могут быть равны C и $-C$ соответственно).

Пусть $\varepsilon > 0$. Построим вокруг каждой точки разрыва интервал радиуса $\delta_1 = \frac{\varepsilon}{16Ck}$, где k - количество точек разрыва. Дополнение к этому набору интервалов (к набору интервалов окрестностей k точек) - это




Рис. 2: Схематичный график функции с k точек разрыва.

набор отрезков (отрезки, где нет точек разрыва), на каждом из которых $f(x)$ - непрерывна, а следовательно равномерно непрерывна. А так как число отрезков конечно ($k + 1$ штука), то существует δ_2 такое, что если x', x'' из какого-то отрезка и $|x' - x''| < \delta_2$, то

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$$

Пусть $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$ и τ - разбиение отрезка $[a, b]$ мелкости меньше δ .

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i = \sum' \omega_i(f) \Delta x_i + \sum'' \omega_i(f) \Delta x_i$$

где первая сумма - отрезки, не имеющие общих точек с интервалами, а вторая - по всем остальным отрезкам. Поэтому

$$\sum' \omega_i(f) \Delta x_i \leq \frac{\varepsilon}{2(b-a)}(b-a) = \frac{\varepsilon}{2}$$

Сумма длин оставшихся частей меньше, чем

$$(\delta + 2\delta_1 + \delta)k \leq \frac{\varepsilon}{4C}$$

а значит

$$\sum'' \omega_i(f) \Delta x_i \leq \frac{\varepsilon}{4C} 2C = \frac{\varepsilon}{2}$$

и тогда

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(f) \Delta x_i \leq \varepsilon$$

в итоге получаем требуемое. □

11.3 Интегрируемость монотонной функции

Теорема (об интегрируемости монотонной функции). Заданная и монотонная на отрезке $[a, b]$ функция $f(x)$ интегрируема на этом отрезке.

Доказательство. Рассмотрим два случая:

1. Пусть $f(x) \equiv C$ - интегрируемость очевидна.

2. Пусть $f(x) \neq C$ и для определенности не убывает. Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда положив $\delta = \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)}$ и взяв разбиение τ отрезка $[a, b]$ мелкости меньше δ , выполняется

$$\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)} \sum_{i=1}^n \omega_i(f) = \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)} \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) = \varepsilon$$

(кратко: оценили сверху так, что длина всех отрезков меньше $\varepsilon/(b-a)$)
Значит, согласно критерию Римана, теорема доказана. □

12 Свойства интеграла Римана: линейность; аддитивность по промежутку, монотонность, делимость от нуля, неравенство с модулем.

12.1 Линейность определенного интеграла

Теорема (о линейности определенного интеграла). Пусть $f, g \in R[a, b]$, тогда

$$\int_a^b (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

Доказательство. То, что $\alpha f + \beta g \in R[a, b]$ известно из прошлых теорем. Пусть $I_f = \int_a^b f(x) dx$, $I_g = \int_a^b g(x) dx$. Тогда для разбиения (τ, ξ) имеем

$$\left| \sigma_\tau(\alpha f + \beta g, \xi) - \alpha I_f - \beta I_g \right| \leq |\alpha| \left| \sigma_\tau(f, \xi) - I_f \right| + |\beta| \left| \sigma_\tau(g, \xi) - I_g \right|$$

так как I_f и I_g интегрируемы (то есть модули этих разностей, допустим, меньше $\frac{\varepsilon}{2|\alpha|}$ и $\frac{\varepsilon}{2|\beta|}$) получим требуемое. □

12.2 Аддитивность по промежутку интегрирования

Теорема (о аддитивности промежутка интегрирования). Пусть $f \in R[a, b]$, $c \in [a, b]$, тогда

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

Доказательство. Интегрируемость функции f на промежутках $[a, c]$ и $[c, b]$ известна. Пусть τ - разбиение отрезка $[a, b]$, содержащее точку c . Тогда оно порождает два разбиения τ_1, τ_2 , причем $\lambda(\tau_1) \leq \lambda(\tau)$ и $\lambda(\tau_2) \leq \lambda(\tau)$. И так как

$$\sum_{[a,b]} f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{[a,c]} f(\xi_i) \Delta x_i + \sum_{[c,b]} f(\xi_i) \Delta x_i$$

и при $\lambda(\tau) \rightarrow 0$ получаем требуемое. □

12.3 Монотонность интеграла

Теорема (о монотонности интеграла). Пусть $a \leq b$, $f, g \in R[a, b]$, причем $f(x) \leq g(x)$, $x \in [a, b]$, тогда

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

Доказательство. Для интегральных сумм справедливо равенство:

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i$$

переходя к пределу при $\lambda(\tau) \rightarrow 0$ получаем требуемое. \square

Важное следствие

Пусть $a \leq b, f \in R[a, b], m = \inf_{x \in [a, b]} f(x), M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$, тогда

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

12.4 Отделимость от нуля

Теорема (об отделимости от нуля). Пусть $a < b, f \in R[a, b], f \geq 0$ и существует точка $x_0 \in [a, b]$ такая, что $f(x_0) > 0$, причем f непрерывна в x_0 . Тогда

$$\int_a^b f(x) dx > 0$$

Доказательство. Так как $f(x) > 0$ и f непрерывна в точке x_0 , то существует окрестность $U(x_0)$, что при $x \in U(x_0)$ выполняется $f(x) > f(x_0)/2$. Тогда в силу монотонности

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_{[a, b] \cap U(x_0)} f(x) dx > \frac{f(x_0)}{2} \cdot \text{мера}([a, b] \cap U(x_0)) > 0$$

\square

12.5 Неравенство с модулем

Теорема (о неравенстве с модулем). Пусть $f \in R[a, b]$, тогда

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Доказательство. Интегрируемость функции $|f|$ известна. А так как

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right| \leq \sum_{i=1}^n |f(\xi_i)| \Delta x_i$$

то переходя к пределам получим требуемое. \square

13 Первая теорема о среднем

Теорема (первая теорема о среднем). Пусть $f, g \in R[a, b], g(x)$ не меняет знак на $[a, b], m = \inf f(x), M = \sup f(x)$, тогда

$$\exists \mu \in [m, M] : \int_a^b f(x) g(x) dx = \mu \int_a^b g(x) dx$$

Кроме того, если $f(x) \in C[a, b]$, то

$$\exists \xi \in [a, b] : \int_a^b f(x) g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

Доказательство. Пусть $g(x) \geq 0$ на отрезке $[a, b]$, тогда

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x), \quad x \in [a, b]$$

и по монотонности интеграла

$$m \int_a^b g(x)dx \leq \int_a^b f(x)g(x)dx \leq M \int_a^b g(x)dx$$

Если $\int_a^b g(x)dx = 0$, то μ - любое число отрезка. А если $\int_a^b g(x)dx \neq 0$, то $\int_a^b g(x)dx > 0$ и, поделив на этот интеграл получим

$$m \leq \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx} \leq M$$

Тогда пусть $\mu = \frac{\int_a^b f(x)g(x)dx}{\int_a^b g(x)dx}$ (напомним, интеграл - это какое-то число).

Если $f \in C[a, b]$, то по теореме Больцано-Коши для каждого $\mu \in [m, M]$ существует $\xi \in [a, b]$, что $f(\xi) = \mu$. \square

14 Интеграл с переменным верхним пределом: определение, непрерывность, дифференцируемость (две теоремы).

Определение. Пусть $f \in R[a, b]$ и $x \in [a, b]$. Функция

$$\Phi(x) = \int_a^x f(x)dx$$

называется **интегралом с переменным верхним пределом**.

14.1 Непрерывность $\Phi(x)$

Теорема (о непрерывности $\Phi(x)$).

$$\Phi(x) \in C[a, b]$$

Доказательство. Пусть $x_0 \in [a, b]$, $x_0 + \Delta x \in [a, b]$. Так как функция $f \in R[a, b]$, то она ограничена на отрезке, то есть

$$|f(x)| \leq C, \quad x \in [a, b]$$

и тогда

$$\begin{aligned} |\Phi(x_0 + \Delta x) - \Phi(x_0)| &= \left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(x)dx \right| \leq \left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} |f(x)|dx \right| \leq \\ &\leq \left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} Cdx \right| = C|\Delta x| \end{aligned}$$

значит при $\Delta x \rightarrow 0$ выполняется $\Phi(x_0 + \Delta x) \rightarrow \Phi(x_0)$, что и означает непрерывность функции в точке x_0 , а так как x_0 - произвольная точка $[a, b]$, то утверждение доказано. \square

14.2 Дифференцируемость $\Phi(x)$

Теорема (о дифференцируемости $\Phi(x)$ или т.Барроу). $\Phi(x)$ дифференцируема в точках непрерывности функции $f(x)$, причем

$$(\Phi(x))'(x_0) = f(x_0)$$

Доказательство. Пусть $f(x)$ непрерывна в точке x_0 и $x_0 + \Delta x \in [a, b]$.

$$\left| \frac{\Phi(x_0 + \Delta x) - \Phi(x_0)}{\Delta x} - f(x_0) \right| = \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f(x) dx - f(x_0) \Delta x}{\Delta x} \right| =$$

$$\left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} (f(x) - f(x_0)) dx}{\Delta x} \right|$$

(последний переход - сворачивание $f(x_0)\Delta x$ как интеграла по такому же промежутку)
Пусть $\varepsilon > 0$, тогда (так как $f(x)$ непрерывна)

$$\exists \delta > 0 : \forall x \in [a, b] : |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Пусть $\Delta x < \delta$ ($x - x_0 < \delta$), тогда

$$\left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} (f(x) - f(x_0)) dx}{\Delta x} \right| \leq \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} |f(x) - f(x_0)| dx}{\Delta x} \right| < \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} \varepsilon \cdot dx}{\Delta x} \right| = \varepsilon$$

что означает, что (по определению производной)

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x_0 + \Delta x) - \Phi(x_0)}{\Delta x} = f(x_0)$$

□

15 Формула Ньютона-Лейбница. Усиленная формула и обобщенная формула.

15.1 Формула Ньютона-Лейбница

Теорема (Формула Ньютона-Лейбница). Пусть $f(x) \in C[a, b]$ и $F(x)$ - ее первообразная. Тогда

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

Доказательство. Любая первообразная непрерывной функции имеет вид:

$$F(x) = \int_a^x f(x) dx + C$$

Так как

$$F(a) = \int_a^a f(x) dx + C = C$$

то $C = F(a)$. Положив в равенстве

$$F(x) = \int_a^x f(x) dx + F(a)$$

то при $x = b$ получается

$$F(b) = \int_a^b f(x) dx + F(a) \Rightarrow \int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

□

15.2 Усиленная формула Ньютона-Лейбница

Теорема (Усиленная формула Ньютона-Лейбница). Пусть $f \in R[a, b]$ и существует некоторая первообразная $F(x)$ на $[a, b]$, тогда

$$\int_a^b f(x)dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

Доказательство. Пусть $x_k = a + \frac{k(b-a)}{n}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ - разбиение (кстати равномерное) отрезка. Тогда

$$F(b) - F(a) = F(x_n) - F(x_0) = \sum_{k=1}^n (F(x_k) - F(x_{k-1}))$$

Согласно теореме Лагранжа, существует $\xi_k^n \in (x_k, x_{k-1})$ такое, что

$$F(x_k) - F(x_{k-1}) = f(\xi_k^n)(x_k - x_{k-1})$$

а тогда

$$F(b) - F(a) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k^n) \Delta x_k$$

перейдя к пределу с $n \rightarrow +\infty$ получим

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k^n) \Delta x_k = \int_a^b f(x)dx$$

что и завершает доказательство. □

Эта формула работает для любой первообразной $f(x)$.

15.3 Обобщенная формула Ньютона-Лейбница

Теорема (Обобщение формулы Ньютона-Лейбница). Пусть $f(x) \in R[a, b]$ и $F(x)$ - обобщенная первообразная функции $f(x)$, тогда

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

Доказательство. Пусть $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{k-1}$ - точки внутри (a, b) , в которых нарушено $F'(x) = f(x)$. Добавим к ним $\alpha_0 = a$, $\alpha_k = b$. Так как интеграл - непрерывная функция по обоим пределам, то

$$\begin{aligned} \int_{\alpha_{p-1}}^{\alpha_p} f(x)dx &= \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\alpha_{p-1}+\varepsilon}^{\alpha_p-\varepsilon} f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (F(\alpha_p - \varepsilon) - F(\alpha_{p-1} + \varepsilon)) = \\ &= F(\alpha_p) - F(\alpha_{p-1}) \end{aligned}$$

где последнее - так как функция непрерывна. Тогда

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= \sum_{p=1}^k \int_{\alpha_{p-1}}^{\alpha_p} f(x)dx = \sum_{p=1}^k (F(\alpha_p) - F(\alpha_{p-1})) = \\ &= F(\alpha_k) - F(\alpha_0) = F(b) - F(a) \end{aligned}$$

□