



# Лекция 8

## Спектральный анализ оператора

### Содержание лекции:

В этой лекции мы начинаем систематически исследовать структуру инвариантных и собственных подпространств операторов. Здесь мы вводим основополагающие понятия собственного значения и собственного вектора, а также обсуждаем свойства этих объектов.

### Ключевые слова:

Характеристический полином, теорема Гамильтона-Кэли, инвариант линейного оператора, собственный вектор, собственное число, спектр, характеристическое число.

### Авторы курса:

Трифанов А. И.

Москаленко М. А.

### Ссылка на ресурсы:

[mathdep.ifmo.ru/geolin](http://mathdep.ifmo.ru/geolin)

## 8.1 Характеристический полином

*Nota bene* Из определения ядра оператора  $\varphi$  следует, что

$$x \in L_j \Leftrightarrow (\varphi - \lambda_j \mathcal{I})^{r_j} x = 0.$$

Рассмотрим частный случай, когда  $r_j = 1$ . Имеем:

$$(\varphi - \lambda_j \mathcal{I}) x = 0 \Rightarrow \varphi x = \lambda_j x.$$

**Характеристическим полиномом линейного оператора  $\varphi$**  называется операторный полином  $\chi_\varphi \in \mathbb{K}[\varphi]$ , такой что:

$$\chi_\varphi(\lambda) = \det(\varphi - \lambda \mathcal{I}). \quad (8.1)$$

**Лемма 8.1.** *Характеристический полином  $\chi_\varphi(\lambda)$  не зависит от выбора базиса, то есть он является функцией от  $\lambda$ , не зависящей от базиса.*



Пусть  $A$  и  $\tilde{A}$  - матрицы оператора  $\varphi$  в двух различных базисах пространства  $X$ , тогда

$$\begin{aligned} \tilde{\chi}_\varphi(\lambda) &= \det(\tilde{A} - \lambda E) = \det(SAT - \lambda E) = \\ &= \det S \cdot \det(A - \lambda E) \cdot \det T = \det(A - \lambda E) = \chi_\varphi(\lambda). \end{aligned}$$



**Теорема 8.1.** (Гамильтон-Кэли) *Характеристический полином линейного оператора  $\varphi$  является его аннулирующим полиномом:*

$$\chi_\varphi \in (p_\varphi).$$



Пусть характеристический полином  $\chi_\varphi$  имеет следующую запись:

$$\chi_\varphi(\lambda) = a_0 + a_1 \lambda + a_2 \lambda^2 + \dots + a_n \lambda^n.$$

С другой стороны, если в одном из базисов пространства  $X$  оператор  $\varphi$  имеет матрицу  $A$ , тогда имеет место равенство

$$\det(A - \lambda E) \cdot E = (A - \lambda E) \tilde{A}(\lambda),$$

где  $\tilde{A}(\lambda)$  - матрица, союзная матрице  $(A - \lambda E)$ . Пусть

$$\tilde{A}(\lambda) = C_0 + C_1 \lambda + C_2 \lambda^2 + \dots + C_{n-1} \lambda^{n-1},$$

тогда имеют место следующие равенства:

$$a_0 E = AC_0, \quad a_1 E = AC_1 - C_0, \quad \dots, \quad a_{n-1} E = AC_{n-1} - C_{n-2}, \quad a_n = -C_{n-1}.$$

Умножив обе части на степени  $A$ , получим

$$a_0 E = AC_0, \quad \dots, \quad a_{k-1} A^{k-1} = A^k C_{k-1} - A^{k-1} C_{k-2}, \quad \dots, \quad a_n A^n = -A^n C_{n-1}.$$

Сложение данных равенств дает в левой части  $\chi_\varphi(A)$ , а в правой - ноль.



## СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕРАТОРА

**Nota bene** Из того, что  $\chi_\varphi \in (p_\varphi)$  следует, в частности, что  $\chi_\varphi : p_\varphi$  то есть имеет место

$$p_\varphi(\lambda) = \prod_{i=1}^m (\lambda - \lambda_i)^{r_i} \Rightarrow \chi_\varphi(\lambda) \sim \prod_{i=1}^m (\lambda - \lambda_j)^{s_i}, \quad r_i \leq s_i.$$

|| **Инвариантом линейного оператора** называется такая его числовая функция, значение которой не зависит от выбора базиса.

**Nota bene** Все коэффициенты характеристического полинома являются инвариантами линейного оператора.

## 8.2 Спектр и собственные векторы

|| **Собственным вектором** оператора  $\varphi$  называется вектор  $x \in X$ , такой что

$$x \neq 0, \quad \varphi x = \lambda x, \quad \lambda \in \mathbb{k},$$

|| при этом  $\lambda$  называется **собственным числом** линейного оператора  $\varphi$ .

**Nota bene** В дальнейшем мы остановимся на самых важных и практически значимых случаях  $\mathbb{k} = \mathbb{R}$  и  $\mathbb{k} = \mathbb{C}$ .

---

### Пример 8.1.

1. Пусть  $\varphi = \mathcal{I} : X \rightarrow X$ , так что  $\mathcal{I}x = x$ , тогда

$\lambda = 1$  – собственное значение,  $\forall x \in X$  – собственный вектор.

2. Пусть  $\varphi = O : X \rightarrow X$ , так что  $Ox = 0$ , тогда

$\lambda = 0$  – собственное значение,  $\forall x \in X$  – собственный вектор.

---

|| **Спектром** называется множество всех значений линейного оператора:

$$\sigma_\varphi = \sigma(\varphi) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k\}.$$
$$\sigma_{\mathcal{I}} = \{1\}, \quad \sigma_O = \{0\}.$$

---

**Пример 8.2.** Пусть  $X = L_1 \dot{+} L_2$  и  $\varphi = \mathcal{P}_{L_1}^{\|L_2} : X \rightarrow X$ , так что

$$x \in L_1 \Rightarrow \mathcal{P}_{L_1}^{\|L_2} x = 1 \cdot x,$$
$$y \in L_2 \Rightarrow \mathcal{P}_{L_1}^{\|L_2} y = 0 \cdot y,$$

и значит  $\sigma(\mathcal{P}_{L_1}^{\|L_2}) = \{0, 1\}$ .

---

**Пример 8.3.** Пусть  $A = \text{diag} \{ \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \}$  - диагональная матрица оператора  $\varphi$  в базисе  $\{e_j\}_{j=1}^n$ . Тогда

$$\varphi e_i = \lambda_i e_i \quad \Rightarrow \quad \sigma_\varphi = \{ \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \}.$$

### 8.3 Подпространства $L_\lambda$

**Лемма 8.2.** Пусть  $L_\lambda$  - множество собственных векторов, отвечающих собственному значению  $\lambda$ , тогда  $L_\lambda$  - подпространство линейного пространства  $X$ .



Пусть  $x_1, x_2$  - собственные векторы, отвечающие собственному значению  $\lambda$ , тогда

$$\begin{aligned} \varphi(x_1 + \alpha x_2) &= \varphi x_1 + \alpha \varphi x_2 = \lambda x_1 + \alpha \lambda x_2 = \lambda(x_1 + \alpha x_2) \\ \Rightarrow \quad (x_1 + \alpha x_2) &- \text{собственный вектор,} \end{aligned}$$



**Лемма 8.3.** Собственные векторы, отвечающие различным собственным значениям линейно независимы:

$$\begin{aligned} \lambda_1 \rightarrow x_1 \in X, \quad \lambda_2 \rightarrow x_2 \in X, \quad \dots, \quad \lambda_k \rightarrow x_k \in X, \\ \lambda_i \neq \lambda_{k \neq i} \quad \Rightarrow \quad \{x_i\}_{i=1}^k - \text{линейно-независимы} \end{aligned}$$



Выполним доказательство по индукции:

$$\begin{aligned} m = 1 : \quad \{x_1 \neq 0\} - \text{Л.Н.З.}, \\ m > 1 : \quad \{x_1, x_2, \dots, x_m\} - \text{верно, что Л.Н.З.}, \\ \Rightarrow \quad \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \dots + \alpha_m x_m = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0, \end{aligned}$$

Покажем, что  $\{x_1, x_2, \dots, x_m, x_{m+1}\}$  - Л.Н.З. Пусть

$$\sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i x_i = 0 \quad \Rightarrow \quad \varphi \left( \sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i x_i \right) = \sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i \lambda_i x_i,$$

тогда

$$\sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i \lambda_i x_i - \lambda_{m+1} \sum_{i=1}^{m+1} \alpha_i x_i = \sum_{i=1}^m \alpha_i (\lambda_i - \lambda_{m+1}) x_i = 0,$$

и значит  $\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_m = 0$ , откуда следует, что  $\alpha_{m+1} x_{m+1} = 0$ .



## СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПЕРАТОРА

**Nota bene** Линейный оператор в конечномерном пространстве не может иметь более  $n$  различных собственных значений.

**Пример 8.4.** Рассмотрим задачу вычисления собственных векторов и собственных значений. Для этого положим

$$x = \sum_{i=1}^n \xi^i e_i, \quad A = \|\alpha_k^i\|, \quad \xi = (\xi^1, \xi^2, \dots, \xi^n)^T,$$

тогда

$$\begin{aligned} \varphi x = \lambda x &\Leftrightarrow A\xi = \lambda\xi \Leftrightarrow A\xi - \lambda E\xi = 0, \\ (A - \lambda E)\xi &= 0, \quad (A - \lambda E) = \|\alpha_k^i - \lambda\delta_k^i\|. \end{aligned}$$

Соответствующая однородная система линейных уравнений для  $\xi^i$  имеет вид:

$$\begin{cases} (\alpha_1^1 - \lambda)\xi^1 + \alpha_2^1\xi^2 + \dots + \alpha_n^1\xi^n = 0 \\ \alpha_1^2\xi^1 + (\alpha_2^2 - \lambda)\xi^2 + \dots + \alpha_n^2\xi^n = 0 \\ \dots \\ \alpha_1^n\xi^1 + \alpha_2^n\xi^2 + \dots + (\alpha_n^n - \lambda)\xi^n = 0 \end{cases}$$

Найдем все нетривиальные решения. Вычислим характеристический полином:

$$\det(A - \lambda E) = \det(\varphi - \lambda \mathcal{I}) = \chi_\varphi(\lambda).$$

1. Если  $\chi_\varphi(\lambda) \neq 0$ , тогда по теореме Крамера решение существует и единственно.
2. Если  $\chi_\varphi(\lambda) = 0$ , тогда по теореме Кронекера-Капели у системы существует нетривиальное решение, а значит можно найти собственный вектор.

Процедура вычисления собственных значений и собственных векторов:

1.  $\chi(\lambda) = \det(\varphi - \lambda \mathcal{I}) = 0 \Rightarrow \sigma_\varphi = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k\};$
2.  $\lambda = \lambda_1: (A - \lambda_1 E)\xi_1 = 0 \Rightarrow \xi_1;$   
 $\lambda = \lambda_2: (A - \lambda_2 E)\xi_2 = 0 \Rightarrow \xi_2;$   
.....  
 $\lambda = \lambda_k: (A - \lambda_k E)\xi_k = 0 \Rightarrow \xi_k.$

**Nota bene** Из основной теоремы алгебры следует, у каждого многочлена есть хотя бы один корень, а значит у любого оператора на  $X(\mathbb{C})$  существует по крайней мере одно собственное значение и одне собственный вектор.

## 8.4 Характеристические числа

*Nota bene* Предположим теперь, что  $X = X(\mathbb{R})$ , тогда  $\chi_\varphi(\lambda)$  - многочлен с вещественными коэффициентами. Если  $\lambda \in \mathbb{C}$  - корень данного многочлена, то ему соответствует комплексный вектор, который будет решением уравнения на собственные векторы, однако он не будет являться элементом  $X$ .

|| Корень характеристического многочлена называется **характеристическим числом** линейного оператора.

**Теорема 8.2.** Если  $X = X(\mathbb{C})$  - линейное пространство над полем  $\mathbb{C}$ , то все характеристические числа являются одновременно и собственными. Если  $X = X(\mathbb{R})$  - линейное пространство над полем  $\mathbb{R}$ , то собственными являются только вещественные характеристические числа.

---

**Пример 8.5.** Рассмотрим матрицу поворота двумерного пространства на угол  $\alpha$ :

$$R_\alpha = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Ее характеристический многочлен

$$\chi_R(\lambda) = \begin{vmatrix} \cos \alpha - \lambda & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha - \lambda \end{vmatrix} = (\cos \alpha - \lambda)^2 + \sin^2 \alpha,$$

имеет комплексные корни:

$$\lambda = \cos \alpha \pm i \sin \alpha,$$

которым соответствуют комплексные собственные векторы

$$V_\pm = \begin{pmatrix} \pm i & 1 \end{pmatrix}$$

Таким образом, диагонализировать матрицу поворота в  $X(\mathbb{R})$  нельзя.

---