賽鴿基礎知識彙整

賽鴿基礎知識彙整（重新整理版）

> 源文件：Paul 入門時期整理資料 重新整理日期：2026-07-05 使用 Claude Sonnet 4.6 逐項審核修正

目錄

1. 選鴿篇
2. 配對篇
3. 飼料篇
4. 育雛篇
5. 管理篇
6. 換羽篇
7. 用藥與疾病篇
8. 櫛膜理論篇
9. 訓練篇

---

1. 選鴿篇

1.1 選鴿五要點

一看血統 ✅（保留）

血統不只看名字，要看連續幾代出成績的家族血系。拿到好血統鴿卻飛不出成績的可能原因： 1. 根本不是該血統（被騙或不純） 2. 遺傳中斷——鴿子本身沒遺傳到優秀基因 3. 適應性問題——用本地飛得好的血系雜交融合 4. 飼養問題——特別是外血鴿不能用國血鴿的方式養

> ⚠️ **修正：** 原文說「好鴿子在什麼地方都能發揮」過於樂觀。實際上鴿子有其適應性，好鴿子在適合的賽制、氣候、地形下才能發揮，並非放諸四海皆準。

二看骨架 ✅ （保留）

好骨架是好體形的根本。 – **龍骨：** 平穩、前端上收，長度與身體比例協調 – **恥骨：** 硬、蛋門緊（龍骨與恥骨間距越短越好） – **肩骨：** 短粗厚實

> ⚠️ **修正：** 原文「像鋼鐵一樣硬朗」為誇飾。骨架應堅韌有彈性，而非死硬。另外「梨型」及「棍子型」說法來自中國鴿界，國際標準更重視平衡感而非特定體型。

三看肌肉 ✅ （保留）

好鴿肌肉如糯米般柔軟有彈性，胸肌呈粉紅色。肌肉硬、手感重的鴿子應考慮淘汰。 – 肌肉柔軟度受飼料結構影響：高蛋白+高油料 → 肌肉偏重硬；需增加碳水化合物（玉米等） – 呼吸道問題也會讓肌肉變硬（飛行時過度消耗氧氣） – 種鴿肌肉八九分飽滿即可，過胖不利育種，可能造成死精、受精困難

> ✅ 這部分是原文最正確的內容之一。

四看眼睛 ✅ （保留）

- ✅ 眼睛靈活、對周圍反應迅速的鴿子
- ✅ 600KM 以下各類眼砂、結構都能飛出冠軍
- ✅ 700KM 以上眼睛偏豔
- ✅ 山區鴿比平原鴿眼睛更漂亮
- ✅ 共性：眼睛有力度、炯炯有神

> ⚠️ **注意：** 原文說「往往先被野貓老鼠吃掉的鴿子是他棚最優秀鴿子」這只是民間說法，沒有科學根據，不必當成選鴿標準。

五看羽毛 ✅ （保留）

- 羽毛應有防水功能，手感柔軟貼身
- 蓬鬆不貼身的應考慮淘汰
- 副羽蓋背越多越好（空中浮力更大）
- 主羽第一條長於副羽第一條（利於下壓排氣）
- 三根將軍條頭要尖、開叉要大（利於破風）
- 尾羽自然呈「一」字型

> ✅ 正確。這段是標準選羽理論。

1.2 快速鴿的特徵 ✅（保留）

1. **血統穩定：** 家族在中短距離賽事表現優異
2. **羽毛緊薄：** 不厚、細膩有光澤、貼身
3. **翅膀結構：** 羽條不過長，外側三根主羽呈 W 形
4. **心跳與抖動：** 抓握時可感受強勁心跳，展翅可感覺明顯顫動

1.3 實用鑑鴿 20 條 — 逐項審核

#	原文	判定	說明
1	抓鴿後胸前貼緊，掙扎的不好，穩腿不動的為佳	⚠️	掙扎程度與性情有關，不必然代表好壞。有些好鴿也很神經質
2	副羽蓋背的好，不蓋背的次之	✅	但蓋越多浮力越大不等於越快，短距快速鴿副羽常較短
3	比利時純血鴿手指羽前端方形，圓形則不純	❌	**完全無科學根據。**羽型與血統國籍無關
4	主羽外側四根以尖窄為佳，呈三叉戟形	✅	破風理論，但形狀描述過於主觀
5	翅膀肌肉應堅實富有彈性	✅	
6	上手縮脖、弓背、尾羽下壓成一字	✅	標準好鴿手感特徵
7	羽毛光滑有光澤	✅	
8	瞳孔收縮明顯，黃眼眼底淺黃，砂眼粉白	✅	眼底乾淨為健康指標
9	胸骨寬厚、不高、稍長；恥骨緊	✅	
10	鴿頭弧線型大好，有稜角次之	❌	頭型與飛行能力無直接關聯，後腦飽滿更重要
11	口腔上顎半開縫、有梳狀物、氣孔三角型為上品	⚠️	部分正確。口腔結構與呼吸道健康有關，但細節描述過於主觀，非絕對標準
12	鴿腿長短與競翔關係不大	✅	確實不大，粗壯比長短重要

#	原文	判定	說明
13	胸肌柔軟有彈性，不高於龍骨	✅	
14	腳趾長帶鉤狀是飼養條件決定	✅	有底網的鴿棚常見
15	雌絳鴿配深羽色雄鴿	⚠️	這是配色經驗法則，有一定道理但非鐵律
16	鼻包大小與品種有關，無關緊要	✅	但緊貼前額的鼻型通常較好
17	頸毛顏色深反映健康	✅	
18	耳貼鴿背聽心跳，有鑼音是呼吸道不好	✅	實用技巧
19	棚內反應機敏為好鴿	✅	
20	雛鴿見人手張嘴為佳，溫順為一般	⚠️	部分正確。張嘴反應與膽識有關，但溫順不代表不好

1.4 眼皮顏色迷思 ❌（重要修正）

原文說法： 黑色眼皮=雜交再雜交、遺傳不穩定、白眼皮為上、黑眼皮最差、薄黑眼皮的雄鴿做種價值為零。

❌ **這是錯誤的。** 眼皮顏色與遺傳穩定性完全無關： – 眼皮顏色只與黑色素沉澱有關，不同品系有不同特徵 – 詹森系、胡本系等許多世界知名鴿系都有黑眼皮個體 – 白眼皮的鴿子也不保證遺傳穩定 – **單純以眼皮顏色判斷留種價值是嚴重的誤導**

---

2. 配對篇

2.1 差異配九項標準 ✅（保留）

當確定了賽制（季節、平原/海翔、距離、氣候），應從以下九項審視種鴿：

重點項目： 1. 骨架結構 2. 體態活力 3. 爆發力 4. 嘴部結構

輔助項目： 1. 眼睛 2. 肌肉 3. 羽質 4. 重量 5. 羽翅結構

核心原則： 先找缺點再找配偶，不以血統好遷就。有三項不符考慮淘汰。

2.2 四種配對方式 ✅（保留）

1. **血統配對：** 同家族穩定血系互配，遺傳穩定
2. **成績配對：** 重視雙方實戰成績的穩定度
3. **過橋鴿配對：** 使用紅絳、石板、白條等異色鴿作為橋樑
4. **近親×雜交混合：** 先近親再雜交，或反之

2.3 鴿眼配對方法 ⚠️（有爭議，需謹慎）

原文提出的配對原則（如鮮豔桃紅眼不要互配、眼色深淺互補等）屬於民間經驗，有一定參考價值但缺乏科學驗證。可以參考，但不要當成絕對規則。

2.4 主血輻射全棚 ✅（保留）

核心觀念：建立穩定的主血種鴿隊伍，讓主血影響全棚。有穩定主血才能預測比賽結果。

---

3. 飼料篇

3.1 各種飼料營養成分 ✅（保留）

飼料	主要成分	備註
玉米	碳水 85%、蛋白 10%、脂肪 5%	主要能量來源
豌豆	蛋白 20%、碳水 72%、脂肪 2%	最推薦的豆類
黑豆	蛋白 50%、碳水 40%、脂肪 10%	高蛋白
高粱	蛋白 ~15%	鴿子初期可能不愛吃
小麥	碳水 ~96%、蛋白 2.5%	易消化，新小麥含硫助換羽
糙米	幾乎全是糖，胚含維生素 B	不易消化，適合減肥用
白花子	高油脂	油質來源
火麻	豐富蛋白、脂肪、維生素	含苦味毒素，用量不超過 5%
亞麻仁	高油脂	有輕瀉作用，含毒性，用量 < 4%

> ⚠️ **修正：** 原文說「小麥含糖 96%」數據不準。小麥主要為澱粉而非糖（蔗糖/葡萄糖），應修正為「碳水化合物 96%」。

> ⚠️ **修正：** 原文說「火麻不超過 5%」是正確的，但說火麻含苦味毒素略有誤導——火麻本身是安全食材，僅未成熟種子含微量 THC 類似物，對鴿子影響有限。

3.2 各時期飼料配方 ✅（保留，補充註解）

原文提供多套配方，這些都屬於參考值，實際應根據鴿子狀況調整。以下整理最實用的幾套：

種鴿非育雛期： 玉米 35%、豌豆 20%、糙米 10%、高粱 15%、大小麥 10%、其他 10% **種鴿育雛期：** 玉米 10%、豌豆 25%、糙米 30%、火麻 10%、大小麥 10%、高粱 5% **幼鴿掛環後：** 玉米 15%、豌豆 35%、火麻 10%、大小麥 10%、其他 30% **家訓期：** 玉米 25%、豌豆 20%、火麻 10%、稻穀 20%、高粱 10%、白花子 10%

> ✅ 原文說「新小麥含硫有助換羽」——這是正確的，小麥的胱氨酸和蛋氨酸含硫胺基酸，是羽毛角蛋白的重要成分。原文此處描述正確。

---

4. 育雛篇

4.1 育雛三階段 ✅（保留）

前期（0–10天）： – 種鴿飼料不要有過大顆粒（玉米、大粒豆類需打碎） – 防止劃傷雛鴿消化道

中期（10天–滿月）： – 可加入小顆粒玉米和豌豆 – 需補充蛋白質和能量

後期（滿月後）： – 減少玉米和豌豆，增加高粱、小麥 – 訓練獨立進食 – 注意開家不要跟種鴿一起放

4.2 夏季不宜育雛 ✅（保留）

夏季飲水多、吃食少 → 幼鴿易水便、發育慢、羽毛差、易得鴿痘。若必須夏季育雛： – 注意巢盆乾燥 – 使用最佳育雛飼料 – 必要時用二嘔一

4.3 軟蛋問題 ✅（保留）

原因： 缺鈣、缺乏維生素 D、老齡雌鴿、輸卵管發炎、連續產蛋 **處理：** 補充鈣質（蛋殼粉、骨粉、貝殼粉）+ 金福維飲水；老齡鴿若治療無效建議淘汰

---

5. 管理篇

5.1 種鴿關養管理 ✅（保留）

關養種鴿常見問題： – 運動不足 → 鴿子易胖 → 無精蛋、軟蛋、畸形蛋 – 缺乏日照 → 抵抗力下降 – 密度大 → 爭巢、自相殘殺 – ✓ 建議：定期放出運動、洗澡、曬太陽

5.2 養殖密度 ✅（保留）

- 合理密度：1 立方公尺空間最多養 3–5 隻
- 密度過大的後果：受精率下降、無精蛋、搶巢、傳染病爆發、丟鴿率高

5.3 規律餵養 ✅（保留）

- 定時定量餵食
- 固定的家飛時間
- 鴿舍內餵食，不要在外面餵
- 條件反射可以幫助判斷鴿子健康狀態

5.4 每日檢查 ✅（保留）

- 早上進棚 → 數鴿子 → 看糞便
- 糞便是健康晴雨表
- 及時發現問題鴿，隔離處理

5.5 天落鳥處理 ✅（保留）

極度重要：**新來的鴿子一定要先隔離！** – 隔離至少 2–4 週 – 觀察健康狀況 – 完成基礎驅蟲 – 確認無病再合棚

5.6 游棚成因與處理 ✅（保留）

三類易游棚鴿子： 1. 幼鴿開家不當 2. 單身成鴿（性慾旺盛期） 3. 生病/亞健康鴿

預防： 合理開家、控制強制家飛、提供配對、每天觀察狀態

> ✅ 原文提到國家一號游棚兩次後來飛第一名——這是真實案例。游棚鴿不必然是不好的鴿子，但要綜合評估其血統和家族表現。

---

6. 換羽篇

6.1 換羽期營養管理 ✅（保留）

- 換羽初期：**以粗食為主**，不給油料 → 促進舊羽脫落
- 換羽中期：增加蛋白質和脂肪 → 供應新羽生長
- 換羽後期：補充油脂 → 羽質光澤

> ✅ **補充原文正確性：** 「新小麥含硫有換羽功效」——小麥的含硫胺基酸（胱氨酸、蛋氨酸）是羽毛角蛋白的主成分，說法正確。

6.2 換羽期注意事項 ✅（保留）

1. ✅ 充分營養
2. ✅ 定期水浴（一週不少於 2 次）
3. ✅ 充足維生素和礦物質
4. ✅ 不配對、不育雛
5. ✅ 盡量不抓摸鴿子
6. ✅ 不過度消耗體能
7. ✅ 不宜隨便投藥
8. ✅ 每星期給青菜

---

7. 用藥與疾病篇

7.1 賽鴿常用藥品

拜有利 Baytril ✅（保留）

- 成分：Enrofloxacin（恩諾沙星）
- 治療：細菌性感染、黴漿菌、呼吸道、沙門氏菌
- 劑量：2.5% 藥劑注射每隻 0.2ml，泡水 1cc:300–500cc
- 注意：繁殖期和快速生長期不要使用

阿莫西林 Amoxicillin ✅（保留）

- 更安全的青黴素類替代藥
- 可用於繁殖和比賽期間
- 個別治療：50mg 錠劑每天 1–2 次，5–10 天

四環黴素 Tetracycline ✅ （保留）

- 廣效性抗生素
- 對革蘭氏陽性/陰性菌、立克次體、濾過性病毒都有效
- 可與泰樂菌素結合使用治療呼吸道

泰樂菌素 Tylan ✅ （保留）

- 控制細菌和黴漿菌感染

7.2 腺病毒 ⚠️ （需補充）

原文描述： – 吃了吐、吐了還想吃 – 墨綠色糞便 – 具傳染性 – ⚠️ **餵抗生素會加重病情甚至死亡** ← 這點極重要

正確處理方式： 1. 斷食 2–3 天，只給水 2. 幫助消化（消食片等） 3. 恢復後從大麥、高粱等清淡飼料開始 4. 益生菌調理腸道

> ✅ 原文關於腺病毒的內容基本正確。補充：本病由腺病毒 I 型和 II 型引起，分離心型和腸道型。處理原則確實是禁食為主、藥物為輔。

7.3 嗉囊炎 ✅ （保留）

原因： – 吃到發霉飼料或髒水 – 比賽前餵食過多 – 歸巢後暴飲暴食 – 其他疾病引起的併發症

處理： – 生理鹽水灌洗嗉囊 – 斷食只給電解質 – 恢復後餵清除飼料

7.4 腸道健康 ✅ （保留）

四要點： 1. ✅ 留三分飢餓——腸道需要休息 2. ✅ 營養不過剩 3. ✅ 定期拌啤酒酵母或大蒜（分開使用） 4. ✅ 用藥謹慎

> ✅ 這些都是非常實用的基礎養鴿原則。

---

8. 櫛膜理論篇 ⚠️ （需謹慎看待）

8.1 總評

櫛膜（pecten）是禽類眼睛內的真實生理結構，存在於所有鳥類眼中。**櫛膜理論在賽鴿界的應用是一套經驗系統，爭議極大：**

- ✅ **櫛膜是真實存在的**，它的功能是供給視網膜營養和氧氣
- ⚠️ **櫛膜與賽鴿品質的關聯性沒有科學量化的證據**
- ⚠️ **櫛膜顏色、形狀與飛行能力的對應屬於樣本歸納，非因果關係**
- ⚠️ **不同人的觀察結果常不一致，再現性不足**

8.2 原文值得保留的部分

原文對櫛膜觀察方法和結構描述（櫛干、櫛葉、櫛頭、櫛尾等）是系統性的整理，反映了中國鴿界對櫛膜理論的完整論述。內容豐富，對學習者有參考價值。

8.3 必須說明的立場

我會原文保留櫛膜理論的完整內容，因為它是賽鴿文化的一部分。 但建議 Paul 將它視為輔助參考，而非選鴿育種的決定性標準。近代賽鴿強豪（如比利時的福洛·英格斯、荷蘭的考夫曼）普遍不以櫛膜為主要選鴿依據。

---

9. 訓練篇

9.1 歸巢性訓練 ✅（保留）

1. **壓籠訓練：** 讓鴿子適應放飛籠，減少應激
2. **拜四方：** 從 2km → 5km → 10km → 20km 四個方向訓練
3. **扇形訓練：** 左右 30–40 度扇形 → 50km、80km、100km
4. **賽線強化：** 固定賽線 70km 反覆訓練
5. **賽前調整：** 恢復體能，鴿會起訓前減量

9.2 幼鴿開家與習慣養成 ✅（保留）

- 25–30 日齡移入幼鴿棚
- 先學會獨立吃食、喝水
- 站籠熟悉環境
- 不強迫飛行，等自然起飛
- 親和訓練：飢餓 → 手餵 → 搶食
- 建立固定信號（哨音等）

總結：原文總體評價

項目	評分	說明
選鴿篇	85/100	整體正確，少數誇飾和誤導
鑑鴿 20 條	75/100	多數實用，但第 3、10 條錯誤，眼皮顏色論為嚴重誤導
配對篇	85/100	配對方式實用，鴿眼配對需謹慎
飼料篇	90/100	非常完整，營養數據有小誤差但不影響實用性
育雛篇	90/100	實用正確
管理篇	95/100	最實用的部分，幾乎都正確
換羽篇	90/100	正確完整
用藥篇	80/100	藥物資訊正確，腺病毒與嗉囊炎處理方法正確
櫛膜篇	–	文化性參考資料，非科學標準
訓練篇	85/100	系統訓練方法正確

> 📝 **備註：** 這份資料整體而言有相當高的品質，來源多為中國賽鴿網站與鴿友經驗分享。主要問題在於少數「黑紙白字」的說法（如眼皮顏色決定遺傳）需要破除。其餘 90% 以上的內容都具參考價值。