Single cell · integration — complementary evidence

A

Donor batch-mixing scores before/after integration



B

Donor-level biological-effect preservation

Estimate [interval] · q
Independent n = 24



T cells	-0.70 [-0.88, -0.52] 0.002
B cells	-0.50 [-0.68, -0.32] 0.02
Myeloid	-0.30 [-0.48, -0.12] 0.038
Stromal	-0.10 [-0.28, 0.08] 0.65
Endothelial	0.10 [-0.08, 0.28] 0.65
NK cells	0.30 [0.12, 0.48] 0.092
Pericytes	0.50 [0.32, 0.68] 0.11
Mast cells	0.70 [0.52, 0.88] 0.13
Epithelial	0.90 [0.72, 1.08] 0.15

C

Integration-choice sensitivity

Estimate [interval] · q
Independent n = 24



T cells · Primary	-0.70 [-0.88, -0.52] 0.002
T cells · Alternative	-0.62 [-0.80, -0.44] 0.005
B cells · Primary	-0.50 [-0.68, -0.32] 0.02
B cells · Alternative	-0.42 [-0.60, -0.24] 0.023
Myeloid · Primary	-0.30 [-0.48, -0.12] 0.038
Myeloid · Alternative	-0.22 [-0.40, -0.04] 0.041
Stromal · Primary	-0.10 [-0.28, 0.08] 0.65
Stromal · Alternative	-0.02 [-0.20, 0.16] 0.65
Endothelial · Primary	0.10 [-0.08, 0.28] 0.65
Endothelial · Alternative	0.18 [0.00, 0.36] 0.077
NK cells · Primary	0.30 [0.12, 0.48] 0.092
NK cells · Alternative	0.38 [0.20, 0.56] 0.095
Pericytes · Primary	0.50 [0.32, 0.68] 0.11
Pericytes · Alternative	0.58 [0.40, 0.76] 0.11
Mast cells · Primary	0.70 [0.52, 0.88] 0.13
Mast cells · Alternative	0.78 [0.60, 0.96] 0.13
Epithelial · Primary	0.90 [0.72, 1.08] 0.15
Epithelial · Alternative	0.98 [0.80, 1.16] 0.15