



Bilgisayar Mühendisliğinde Matematik Uygulamaları Ders Notları
Prof.Dr. Adnan Kavak

İçindekiler


1 Bölüm1	5
1.1 Ortogonal Alt Uzaylar	5
1.1.1 İzdüşüm Matrisi(Projection Matrix)	6
1.1.2 Vektör İzdüşümü	6
1.1.3 Ev Ödevi Sorusu	7
1.2 Gram-Schmidt Dikleştirme Prosedürü	8
1.2.1 Ev Ödevi Sorusu	9
1.2.2 Örnek	10
1.3 Range Space Of A Matrix(Bir Matrisin Değer Uzayı)	11
1.3.1 Boş Uzay(NULL Space)	12
1.4 Bazı Önemli Matris Ayrıştırma Yöntemleri	12
1.4.1 $A=mxm$ ise	12
1.4.2 $A \rightarrow mxn$ matris ise $m>n$	12
1.4.3 LU Matris ayrıştırması	13
1.4.4 Cholesky Matris ayrıştırması	13
1.4.5 QR ayrıştırması	13
1.5 EigenValue Decomposition (EVD) Veya Singular Value Decomposition (SVD)	14
1.6 LU Ayrıştırması Ve Denklem Sistemi Çözümü	15
2 Bölüm2	17
2.1 LU Ayrıştırması	17
2.2 Pivot Seçme İle LU Ayrıştırması	18
3 Bölüm3	23
3.1 EigenValue Decomposition(Özdeğer Ayrıştırması)	23
3.1.1 Özdeğer Ve ÖzVektör Nasıl Bulunur?	24
3.1.2 ÖzVektörlerin(EigenVectors)Lineer Bağımsızlığı?	26
3.2 Matrisin Ayrıştırılması	26
3.3 Özdeğer Ve Özvektörlerden Matris Oluşturma	27
3.4 Self-Adjoint Matrislerin Köşegenleştirilmesi	29

3.5	EVD Uygulamaları	30
3.6	Korelasyon Matrisi Özellikleri	31
4	Bölüm4	33
4.1	QR Ayrıştırması	33
4.2	Niçin QR ?	34
4.3	HouseHolder Dönüşümü:	35
4.4	QR Yöntemi İle Denklem Sistemi Çözümü Matlab Örneği . . .	40
5	Bölüm5	47
5.1	Optimizasyon(En İyileme)	47
5.2	Koşullu (Constraint) Optimizasyon	52
5.3	Ara Sınav Çözümleri	55

Bölüm 1

Bölüm1

1.1 Ortogonal Alt Uzaylar



Şekil 1.1: Ortogonal Alt Uzay


$$\bar{\mathbf{X}} = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_3 \end{pmatrix} \in \mathbf{S}$$

- $\mathbf{S} = \mathbb{R}^3$
- $V \subset \mathbf{S}$
- $V^\perp = W$
- $W^\perp = V$

- ✓ X ve W ortogonal altuzaylardır.
- ✓ \bar{X} vektörü S 'de bir vektordür.
- ✓ \bar{X}_v V altuzayında \bar{X} 'in izdüşüm vektörüdür.
- ✓ \bar{X}_w W altuzayında \bar{X} 'in izdüşüm vektörüdür.

1.1.1 İzdüşüm Matrisi(Projection Matrix)

$\bar{P}_1, \bar{P}_2, \bar{P}_3 \dots \bar{P}_n$ V altuzayını tarayan (span) vektörleri olsun




$$\bar{X}_v = C_1 \bar{P}_1 + C_2 \bar{P}_2 + C_3 \bar{P}_3 + \dots + C_n \bar{P}_n$$

$$\mathbf{A}_{m \times n} = [\bar{P}_1 \bar{P}_2 \bar{P}_3 \dots \bar{P}_n]$$

$$\bar{P}_v = A_{m \times n} (A_{m \times n}^H A_{m \times n})^{-1} A_{m \times n}^H \rightarrow \text{izdüşüm matrisi}$$

1.1.2 Vektör İzdüşümü



$$\bar{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \bar{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \bar{y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{a}_x = ?$$


$$\langle \bar{a}, \bar{x} \rangle = \bar{a}^T * \bar{x} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = 3$$

$$\bar{a}_y = ?$$

$$\langle \bar{a}, \bar{y} \rangle = \bar{a}^T * \bar{y} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 2$$

$$\langle \bar{a}, \bar{x} \rangle = \|\bar{a}\| * \|\bar{x}\| * \cos(\Theta) = \|\bar{a}\| * \cos(\Theta) \text{ yandaki ifadede } \|\bar{x}\| = 1 \text{ dir.}$$

Ev ödevi sorusu aşağıdaki gibidir :




Şekil 1.2: Ev Ödevi Sorusu

$$\mathbf{W} \longrightarrow \bar{A}_w = [\bar{P}_2 \quad \bar{P}_3] \longrightarrow \bar{P}_{A_w} = \cdots$$

$$\overline{X}_v = \overline{P}_{A_v} \cdot \overline{X} \dots$$

$$\overline{X}_w = \overline{P}_{A_w} \cdot \overline{X} \dots$$

1.2 Gram-Schmidt Dikleştirme Prosedürü



\bar{a} ve \bar{b} 'yi kullanarak birbirine dik vektörler nasıl oluşturulur?

$$\|\bar{q}_1\| = 1, \|\bar{q}_2\| = 1$$

1- $\bar{\Delta}_1 \rightarrow \bar{b}$ 'nin \bar{q}_1 üzerindeki bileşeni

2- $\bar{e}_1 \rightarrow \bar{b}$ 'nin $\bar{\Delta}_1$ 'den fark vektörü

3- $\bar{q}_2 \rightarrow \bar{e}_1$ 'in normalize edilmiş hali

Algoritma:

$\mathbf{T} = \bar{P}_1, \bar{P}_2, \dots, \bar{P}_n$ vektörleri için birbirine dik olan

$$\mathbf{T}' = \bar{q}_1, \bar{q}_2, \dots, \bar{q}_k \quad k \leq n$$

$$\langle \bar{q}_i, \bar{q}_j \rangle = \bar{q}_i^T \cdot \bar{q}_j = \delta_{ij}$$

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i=j \text{ ise} \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

$$1) \bar{q}_1 = \frac{\bar{p}_1}{\|\bar{p}_1\|}$$

$$\|\bar{p}_1\| = (\bar{p}_1^T \cdot \bar{p}_1)^{\frac{1}{2}}$$

$$2) \overline{\Delta_2} = \langle \overline{\mathbf{p}}_2, \overline{\mathbf{q}}_1 \rangle \overline{\mathbf{q}}_1$$

$\overline{\Delta_2}$ $\overline{\mathbf{p}}_2$ 'nin $\overline{\mathbf{q}}_1$ üzerindeki izdüşümü

$$\overline{\mathbf{e}}_2 = \overline{\mathbf{p}}_2 - \overline{\Delta_2}$$

$$\overline{\mathbf{q}}_2 = \frac{\overline{\mathbf{e}}_2}{\|\overline{\mathbf{e}}_2\|}$$

\vdots


k.adımda

$$\overline{\mathbf{e}}_k = \overline{\mathbf{p}}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle \overline{\mathbf{p}}_k, \overline{\mathbf{q}}_i \rangle \overline{\mathbf{q}}_i$$

$$\overline{\mathbf{q}}_k = \frac{\overline{\mathbf{e}}_k}{\|\overline{\mathbf{e}}_k\|}$$

1.2.1 Ev Ödevi Sorusu




Home exercise !



$$\overline{P}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \overline{P}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -4 \\ 2 \end{bmatrix}, \overline{P}_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}, \overline{P}_4 = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$\overline{P}_1, \overline{P}_2, \overline{P}_3$ ve \overline{P}_4 'ü kullanarak Gram-Schmidt yöntemiyle birbirine dik olan vektörleri bulunuz ?

1.2.2 Örnek




$x(t), y(t)$
 ve $z(t)$ 'yi
 birbirine
 dik (ortogonal)
 sinyaller
 şeklinde
 ifade
 ediniz?

$$\langle x(t), y(t) \rangle = \int_0^{2T} x(t)y(t)dt$$

$$\|x(t)\| = (\langle x(t), x(t) \rangle)^{\frac{1}{2}}$$

1.3 Range Space Of A Matrix (Bir Matrisin Değer Uzayı)

$$\mathbf{A} = [\bar{P}_1 \quad \bar{P}_2 \quad \cdots \quad \bar{P}_m] \quad \mathbf{A} \cdot \bar{x} = \bar{y} \quad \bar{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} \in \mathbf{R}^m$$



$$\bar{y} = x_1 \bar{P}_1 + x_2 \bar{P}_2 + \cdots + x_m \bar{P}_m$$


Örnek: $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \bar{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$

$$\mathbf{A} \cdot \bar{x} = x_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \\ x_1 + x_3 \end{bmatrix} = \bar{y}$$

\bar{y} vektörü $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ vektörlerinin lineer birleşimidir.

$R(\mathbf{A}) = \text{span} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, $R(\mathbf{A}) \rightarrow$ değer uzayıdır .

1.3.1 Boş Uzay (NULL Space)



$$\bar{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$A\bar{x} = \bar{0}$ işlemini sağlayan \bar{x} vektörüne A'nın boş uzayı (null space) denir. $N(A)$ ile gösterilir.

Örnek: Yukarıdaki A matrisi için :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$x_1 = 0, x_1 + x_3 = 0 \rightarrow x_3 = 0$ x_2 herhangi bir α değeridir

$$N(A) = \text{span}\left\{ \begin{bmatrix} 0 \\ \alpha \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

1.4 Bazı Önemli Matris Ayrıştırılmaları

$A\bar{x} = \bar{b}$ denklem sistemi için

1.4.1 $A = m \times m$ ise

Klasik yöntem: $\bar{x} = A^{-1} \cdot \bar{b}$

Bazı durumlarda A^{-1} almak oldukça zor ve karmaşık bir işlem.

$O(m^3) \rightarrow$ polinom derecesi en fazla m^3 olan sayıda (+) ve (*) işlemi gerekir.

1.4.2 $A \rightarrow m \times n$ matris ise $m > n$

$$A\bar{x} = \bar{b}$$

$$(A_{n \times m}^H \cdot A_{m \times n})\bar{x}_{n \times 1} = A_{n \times m}^H \bar{b}_{m \times 1}$$

$$\bar{x} = (A^H A)^{-1} A^H \cdot \bar{b}$$

$$(A^H A)^{-1} A^H \rightarrow A^\# : A \text{ 'nın pseudo-invers}$$

1.4.3 LU Matris ayrıştırması

A: $m \times m$ kare matris, $A = L \cdot U$

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ x & 1 & 0 & 0 \\ x & \vdots & \ddots & 0 \\ x & \dots & x & 1 \end{bmatrix}_{m \times m} \implies \text{Lower-Triangular (alt üçgensel)}$$

$$\mathbf{U} = \begin{bmatrix} x & x & x & x \\ 0 & x & x & x \\ 0 & \vdots & \ddots & x \\ 0 & \dots & 0 & x \end{bmatrix}_{m \times m} \implies \text{Upper-Triangular (üst üçgensel)}$$

Uygulaması: $A\bar{x} = \bar{b}$ denklem sistemi çözümünde kullanılır. (Eğer A: $m \times m$ ise)

1.4.4 Cholesky Matris ayrıştırması

A = simetrik, pozitif-definite bir matris ise $A \rightarrow m \times m$

$\bar{x}^T \cdot A\bar{x} > 0$ $\bar{x} \in R^n$ vektör ise A pozitif definite bir matris

$\langle \bar{x}, A\bar{x} \rangle = \bar{x}^T \cdot A\bar{x}$ $y = A\bar{x}$

$$A = LD\bar{L}^H, D \Rightarrow \text{köşegen} \quad D = \begin{bmatrix} x & 0 & 0 & 0 \\ 0 & x & 0 & 0 \\ 0 & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & x \end{bmatrix}$$

Cholesky ayrıştırması aşağıdaki gibidir:

$$\begin{cases} A = UDU^H \\ A = LD\bar{L}^H \end{cases}$$

Uygulaması: Kestirim ve Kalman filtresi problemlerinin çözümünde

1.4.5 QR ayrıştırması

A: $m \times n$ kare olmayan bir matris ise

$A_{m \times n} \bar{x}_{n \times 1} = \bar{b}_{m \times 1}$ $A = QR$

$$Q \text{ unitary bir matris} \Rightarrow Q^H \cdot Q = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

R = üst-üçgensel bir matris ancak köşegendeki değerler "1" değil.

$$A\bar{x} = \bar{b}$$

↓

$$Q \cdot R \cdot \bar{x} = \bar{b}$$

$$\underbrace{Q^H Q}_{I} \cdot R\bar{x} = \underbrace{Q^H \bar{b}}_{\bar{c}}$$

→ çözümü $A\bar{x} = \bar{b}$ ' ye göre daha kolay .

1.5 EigenValue Decomposition (EVD) Veya Singular Value Decomposition (SVD)

$A : m \times m$ kare \Rightarrow EVD

$A : m \times n$ kare değil \Rightarrow SVD

SVD: $A = U \Sigma V^H$

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \Lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \Lambda_2 & 0 & 0 \\ 0 & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & \Lambda_n \end{bmatrix}_{n \times n}$$


Λ_i : singular(tekil)değerler

$$A = \begin{bmatrix} \boxed{}_{\rightarrow n \times n} \\ \boxed{}_{\rightarrow (m-n) \times n} \end{bmatrix}$$

$U = m \times n \Rightarrow$ unitary $U^H \cdot U = I_{n \times n}$

$V^H = m \times n \Rightarrow$ unitary $V \cdot V^H = I_{n \times n}$

Uygulama: Sinyal işleme , haberleşme , kestirim vs...



Kullanıcı yönü $Q_i \quad i = 1, 2, \dots, N$

1.6 LU Ayrıştırması Ve Denklem Sistemi Çözümü

$$A_{m \times m} \bar{x}_{m \times 1} = \bar{b}_{m \times 1}$$

$$A = L \cdot U$$

↓

$$LU\bar{x} = \bar{b}$$

$$U\bar{x} = \bar{y}$$

$$L\bar{y} = \bar{b} \implies \bar{y} \implies \bar{x}$$

$$\begin{bmatrix} l_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ l_{21} & l_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ l_{m1} & l_{m2} & \cdots & l_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

$$y_1 = \frac{b_1}{l_{11}} \quad l_{11} = 1 \implies y_1 = b_1$$

$$l_{21} \cdot y_1 + l_{22} \cdot y_2 = b_2 \implies y_2 = \frac{b_2 - l_{21} \cdot y_1}{l_{22}} = b_2 - l_{21} \cdot y_1 \implies l_{22} = 1$$

↓

$$y_j = \left(b_j - \sum_{i=1}^{j-1} l_{ji} \cdot y_i \right)$$

$j = 2, 3, 4, \dots, m$ forward substitution (ileri yerine koyma)

$$U\bar{x} = \bar{y}$$

↓

$$\begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} & \cdots & u_{1m} \\ 0 & u_{22} & u_{23} & \cdots & u_{2m} \\ 0 & 0 & u_{33} & \cdots & u_{3m} \\ \vdots & \vdots & 0 & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & u_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}$$

$$x_m = \frac{1}{u_{mm}} \cdot y_m$$

$$x_{m-1} = \frac{1}{u_{m-1,m-1}} (y_{m-1} - x_m \cdot u_{m-1,m})$$

⋮

$x_j = \frac{1}{u_{jj}} \left(y_j - \sum_{k=j+1}^m (u_{jk} \cdot x_k) \right) \rightarrow$ Backward substitution (geriye yerine koyma)

$O(\frac{m^2}{2})$ işlem gerektirir ve $\bar{x} = \bar{A}^{-1} \cdot \bar{b}$ yöntemine göre daha az işlem yükü gerektirir.

Zorluk:

- 1-) u_{ii} 'lerin "0" olması
- 2-) u_{ii} 'ler pivot olarak adlandırılır .

Bölüm 2

Bölüm2

2.1 LU Ayrıştırması

$$\mathbf{A} \longrightarrow \mathbf{U} \longrightarrow \mathbf{L}$$

Gauss Elimination
(Birim Satır İşlemleri)

Satır işlemlerini saklayarak

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \overline{a_1^T} \\ \overline{a_2^T} \\ \vdots \\ \overline{a_m^T} \end{bmatrix}_{m \times m} = \begin{bmatrix} \text{satır1} \\ \text{satır2} \\ \vdots \\ \text{satırm} \end{bmatrix}_{m \times m}$$

Birim Satır İşlemi(B.S.İ)= satır i \leftarrow α satır i + β satır j $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$

Örnek:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -5 \\ 6 & 8 & 1 \\ 4 & -8 & -3 \end{bmatrix} \longrightarrow \mathbf{A} = \mathbf{LU}?, \mathbf{L} = ?, \mathbf{U} = ?$$

Amaç BSi ile köşegen altındaki değerleri sıfırlamak

$$1) S_2 \leftarrow S_2 - 3S_1 \quad 3 = \frac{a_{21}}{a_{11}}$$

$$\mathbf{A}_1 = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -5 \\ 0 & -4 & 16 \\ 4 & -8 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & -5 \\ 6 & 8 & 1 \\ 4 & -8 & -3 \end{bmatrix} \leftarrow \text{Orjinal A matrisi}$$

$$2) S_3 \leftarrow S_3 - 2S_1 \quad 2 = \frac{a_{31}}{a_{11}}$$

$$\mathbf{A}_2 = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -5 \\ 0 & -4 & 16 \\ 0 & -16 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & -5 \\ 0 & -4 & 16 \\ 4 & -8 & -3 \end{bmatrix} \leftarrow \text{updated(Bir önceki}$$

update edilmiş A)

$$3) S_3 \leftarrow S_3 - 4S_2 \quad 4 = \frac{a_{32}}{a_{22}}$$

$$\mathbf{A}_3 = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -5 \\ 0 & -4 & 16 \\ 0 & 0 & -57 \end{bmatrix} = \mathbf{U} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & -5 \\ 0 & -4 & 16 \\ 0 & -16 & 7 \end{bmatrix} \leftarrow \text{updated (Bir önceki update edilmiş A)}$$

U matrisi oluşturuldu .

L'yi bulmak için :

$$\overline{U = E_3 E_2 E_1 A} \implies A = E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1} U$$

$$E_1 A = A_1 \quad E_2 E_1 A = A_2 \quad L = E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1}$$

$$E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} = L$$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & -5 \\ 0 & -4 & 16 \\ 0 & 0 & -57 \end{bmatrix}$$

L U

2.2 Pivot Seçme İle LU Ayrıştırması

Amaç : Pivot(köşegen) elemanlarının o sütunda en büyük değer alacak şekilde satır yerlerinin değiştirilmesi (pivoting)

Örnek:

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -5 \\ 6 & 8 & 1 \\ 4 & -8 & -3 \end{bmatrix}$$

1-) a_{11} max olacak şekilde $S_1 \longleftrightarrow S_2$

Bunun anlamı orjinal A matrisini yer değiştirme matrisi (P_{12}) ile soldan çarpmak demektir.

$$P_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Yukarıdaki P_{12} matrisi birim matristeki 2.satırın yer değiştirilmiş halidir.

$$\mathbf{I}_{3 \times 3} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow P_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A_1 = P_{12}A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 & -5 \\ 6 & 8 & 1 \\ 4 & -8 & -3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 6 & 8 & 1 \\ 2 & 4 & -5 \\ 4 & -8 & -3 \end{bmatrix}$$

- \downarrow

2-)

a_{21} 'i sıfırlamak için katsayı $\frac{-1}{3} = \frac{-a_{21}}{a_{11}} \rightarrow E_1$

a_{31} 'i sıfırlamak için katsayı $\frac{-2}{3} = \frac{-a_{31}}{a_{11}} \rightarrow E_2$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{-2}{3} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{-1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} A_1$$

- \uparrow E_2 \uparrow E_1 \downarrow $P_{12} \cdot A$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 6 & 8 & 1 \\ 0 & \frac{4}{3} & \frac{-16}{3} \\ 0 & \frac{-40}{3} & \frac{-11}{3} \end{bmatrix} \longrightarrow 1. \text{ sütundaki } a'_{11} \text{ in altındaki elemanlar sıfırlandı .}$$

3-)

2.sütun için en son adımda güncellenmiş olan A_2 matrisinin a_{22} elemanı için pivot seçilir .

$$A_2 = \begin{bmatrix} 6 & 8 & 1 \\ 0 & \frac{4}{3} & \frac{-16}{3} \\ 0 & \frac{-40}{3} & \frac{-11}{3} \end{bmatrix} \rightarrow \text{alt matris } A_{21}$$

$|\frac{-40}{3}| > |\frac{4}{3}|$ olduğundan $S_2 \longleftrightarrow S_3(A'_2 \text{ de})$ ya da $S_1 \longleftrightarrow S_2(A'_{21} \text{ de})$

A'_2 'yi göz önüne alırsak :

$$P_{23} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad A_3 = P_{23} \cdot A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 8 & 1 \\ 0 & \frac{4}{3} & \frac{-16}{3} \\ 0 & \frac{-40}{3} & \frac{-11}{3} \end{bmatrix}$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 6 & 8 & 1 \\ 0 & \frac{-40}{3} & \frac{-11}{3} \\ 0 & \frac{4}{3} & \frac{-16}{3} \end{bmatrix} \rightarrow a_{32} \text{'yi sıfırlamak için katsayı} = \frac{\frac{-4}{3}}{\frac{-40}{3}} = \frac{1}{10} \Rightarrow E_3$$

4-)

$$A_4 = E_3 \cdot A_3 = E_3 \cdot P_{23} \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot P_{12} \cdot A$$

$$A_1 = P_{12} \cdot A$$

$$A_2 = E_2 \cdot E_1 \cdot P_{12} \cdot A$$

$$A_3 = P_{23} \cdot E_2 \cdot E_1 \cdot P_{12} \cdot A$$

$$A_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{10} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 8 & 1 \\ 0 & \frac{-40}{3} & \frac{-11}{3} \\ 0 & \frac{4}{3} & \frac{-16}{3} \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 6 & 8 & 1 \\ 0 & \frac{-40}{3} & \frac{-11}{3} \\ 0 & 0 & \frac{-57}{10} \end{bmatrix}}_U$$

-

\uparrow
 E_3

U

$$U = E_3 P_{23} E_2 E_1 P_{12} A$$

$$\Rightarrow A = \underbrace{P_{12}^{-1} E_1^{-1} E_2^{-1} P_{23}^{-1} E_3^{-1}}_V U$$

-

$$P_{23} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = P_{23}^{-1} \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{10} & 1 \end{bmatrix} \rightarrow E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{10} & 1 \end{bmatrix}$$

$$P_{23}^{-1} E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{10} & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{-2}{3} & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow E_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_2^{-1} \cdot P_{23}^{-1} \cdot E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{2}{3} & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{10} & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{10} & 1 \\ \frac{2}{3} & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$E_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{-1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_1^{-1} \cdot E_2^{-1} P_{23}^{-1} \cdot E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{10} & 1 \\ \frac{2}{3} & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{-1}{10} & 1 \\ \frac{2}{3} & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$P_{12} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = P_{12}^{-1}$$

$$P_{12}^{-1} \cdot E_1^{-1} E_2^{-1} P_{23}^{-1} E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{-1}{10} & 1 \\ \frac{2}{3} & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{-1}{10} & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{V}$$

$$A = \underbrace{P_{12}^{-1} \cdot E_1^{-1} E_2^{-1} P_{23}^{-1} E_3^{-1}}_{\mathbf{V}} \cdot \mathbf{U}$$

- \mathbf{V}

$$L = P_{23} P_{12} \cdot V = P_{23} P_{12} P_{12}^{-1} E_1^{-1} E_2^{-1} P_{23}^{-1} E_3^{-1}$$

$$= \underbrace{P_{12} P_{12}^{-1}}_{\mathbf{I}} E_1^{-1} E_2^{-1} \underbrace{P_{23} P_{23}^{-1}}_{\mathbf{I}} E_3^{-1}$$

- \mathbf{I}

$$= E_1^{-1} E_2^{-1} E_3^{-1}$$

$$\Rightarrow L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{2}{3} & 1 & 0 \\ \frac{1}{3} & \frac{-1}{10} & 1 \end{bmatrix}$$

Pivot seçme yönteminde

$$A = V \cdot U$$

$$P \cdot A = LU$$

¹ $P_{12} P_{12}^{-1}$ I birim matrisine eşittir

Bölüm 3

Bölüm3

3.1 EigenValue Decomposition(Özdeğer Ayrıştırması)

Fark denklemi (*):

$$y_1(t+1) = -y_1(t) - 1.5y_2(t)$$

$$y_2(t+1) = 0.5y_1(t) + y_2(t)$$

$$\bar{y}_2(t+1) = \begin{bmatrix} y_1(t+1) \\ y_2(t+1) \end{bmatrix} \quad \bar{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = ?$$

$$\Rightarrow \bar{y}(t+1) = \underbrace{\begin{bmatrix} -1 & -1.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}}_A \bar{y}(t) \Rightarrow \bar{y}(t+1) = A\bar{y}(t)$$

-

$$\text{Çözüm: } y_1(t) = \lambda^t x_1 \quad y_2(t) = \lambda^t x_2$$

$$\lambda^{t+1} x_1 = -\lambda^t x_1 - 1.5\lambda^t x_2$$

$$\lambda^{t+1} x_2 = 0.5\lambda^t x_1 + \lambda^t x_2$$

$$\Rightarrow A \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\bar{x}} = \lambda \underbrace{\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}}_{\bar{x}}$$


-

$$\Rightarrow A\bar{x} = \lambda\bar{x} \quad (**)$$

(**)denklem sisteminin çözümü aynı zamanda (*) denklem sisteminin çözümüdür.

\bar{x} : eigenvector(özvektör)

λ :eigenvalue(özdeğer)



3.1.1 Özdeğer Ve ÖzVektör Nasıl Bulunur?

$$A\bar{x} = \lambda\bar{x}$$

Genel olarak :

$$A : n \times n$$

$$\bar{x} : n \times 1$$

$$\lambda : 1 \times 1$$

$$\implies A\bar{x} = \lambda\bar{x}$$

$$(A - \lambda I)\bar{x} = \bar{0}$$

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = |A - \lambda I| \text{ karakteristik polinom}$$

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = 0 \longrightarrow \text{çözümü } \lambda \text{ değerlerini verir.}$$

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & -1.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} -1 & -1.5 \\ 0.5 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 - \lambda & -1.5 \\ 0.5 & 1 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$\chi_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = (-1 - \lambda)(1 - \lambda) - (0.5)(-1.5)$$

$$\lambda^2 - 0.25 = 0$$

$$(\lambda - 0.5)(\lambda + 0.5) = 0$$

↓

$$\lambda_1 = 0.5 \quad \lambda_2 = -0.5$$

bulduğumuz bu λ değerlerini $(A - \lambda I)\bar{x} = 0$ 'da yerine koyarsak :

$$\lambda_1 = 0.5 \longrightarrow \underbrace{\begin{bmatrix} -1 - \lambda & -1.5 \\ 0.5 & 1 - \lambda \end{bmatrix}}_B \bar{x}_1 = 0$$

-

\bar{x}_1 vektörü B'nin null space'ini oluşturur

$$\bar{x}_1 = \begin{bmatrix} \alpha \\ -\alpha \end{bmatrix} \quad \alpha = 1 \longrightarrow \bar{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\|\bar{x}_1\| = \sqrt{\alpha^2 + \alpha^2} = \sqrt{2}\alpha \longrightarrow \bar{x}_1 = \frac{\bar{x}_1}{\|\bar{x}_1\|} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2 = -0.5 \longrightarrow (A - \lambda_2 I)\bar{x}_2 = \underbrace{\begin{bmatrix} -0.5 & -1.5 \\ 0.5 & 1.5 \end{bmatrix}}_C \bar{x}_2 = \bar{0}$$

-

\bar{x}_2 C'nin null-space'idir.

$$\bar{x}_2 = \begin{bmatrix} -3\alpha \\ \alpha \end{bmatrix} \longrightarrow \|\bar{x}_2\| = \sqrt{9\alpha^2 + \alpha^2} = \sqrt{10}\alpha$$

$$\bar{x}_2 = \begin{bmatrix} \frac{-3}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} \end{bmatrix}$$

Özdeğer ÖzVektör

$$\lambda_1 = 0.5 \longrightarrow \bar{x}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$\lambda_2 = -0.5 \longrightarrow \bar{x}_2 = \begin{bmatrix} \frac{-3}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} \end{bmatrix}$$

Denklem sistemi çözümü :

$$\bar{y}_1(t) = \begin{bmatrix} \bar{y}_1(t) \\ \bar{y}_2(t) \end{bmatrix} = \lambda_1^t \bar{x}_1 = (0.5)^t \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{-1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

$$\bar{y}_2(t) = \begin{bmatrix} \bar{y}_1(t) \\ \bar{y}_2(t) \end{bmatrix} = \lambda_2^t \bar{x}_2 = (-0.5)^t \begin{bmatrix} \frac{-3}{\sqrt{10}} \\ \frac{1}{\sqrt{10}} \end{bmatrix}$$

Hem $\bar{y}_1(t)$ hem de $\bar{y}_2(t)$ orjinal denklem sist. çözümünü sağlıyor.

Sistem linear bir sistem olduğundan toplam çözüm:

$$\bar{y}_t(t) = C_1 \lambda_1^t \bar{x}_1 + C_2 \lambda_2^t \bar{x}_2$$

Denklem sisteminde başlangıç koşulları verilirse C_1 ve C_2 bulunabilir.

3.1.2 Öz Vektörlerin (Eigen Vectors) Lineer Bağımsızlığı?

$$\bar{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ -1 \\ \sqrt{2} \end{bmatrix} \quad \bar{x}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ \sqrt{10} \\ 1 \\ \sqrt{10} \end{bmatrix}$$

$$\langle \bar{x}_1, \bar{x}_2 \rangle = \bar{x}_1^T \cdot \bar{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ \sqrt{2} & \sqrt{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 \\ \sqrt{10} \\ 1 \\ \sqrt{10} \end{bmatrix} = \frac{-3}{\sqrt{20}} - \frac{1}{\sqrt{20}}$$

$$\bar{x}_1 \cdot \bar{x}_2 = \frac{-4}{\sqrt{20}} = \frac{-4}{2\sqrt{5}} = \frac{-2}{\sqrt{5}}$$

Lema: $n \times n$ boyutlu A matrisinin tüm özdeğerleri birbirinden farklı ise A matrisinin özvektörleri birbirinden lineer bağımsızdır.

$$k_1 \bar{x}_1 + k_2 \bar{x}_2 = \bar{0}$$

$$k_1 A \bar{x}_1 + k_2 A \bar{x}_2 = k_1 \lambda_1 \bar{x}_1 + k_2 \lambda_2 \bar{x}_2 = 0(*)$$

$$k_1 \lambda_2 \bar{x}_1 + k_2 \lambda_2 \bar{x}_2 = 0(**)^1$$

$$(*) - (**) \longrightarrow k_1(\lambda_1 - \lambda_2) \bar{x}_1 = \bar{0}$$

$$\lambda_1 \neq \lambda_2, \bar{x}_1 \neq \bar{0} \longrightarrow k_1 = 0 \text{ olmalı aynı şekilde } \lambda_1 \neq \lambda_2 \text{ için } \longrightarrow k_2 = 0 \text{ olmalı}$$

.

3.2 Matrisin Ayrıştırılması

$A : n \times n$

Özvektörleri: $\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{x}_3, \dots, \bar{x}_n$

- $\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$

Özdeğerleri: $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

$$A \bar{x}_i = \lambda_i \bar{x}_i \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$\begin{bmatrix} A \bar{x}_1 & A \bar{x}_2 & A \bar{x}_3 & \dots & A \bar{x}_n \end{bmatrix}_{n \times n} = \begin{bmatrix} \lambda_1 \bar{x}_1 & \lambda_2 \bar{x}_2 & \lambda_3 \bar{x}_3 & \dots & \lambda_n \bar{x}_n \end{bmatrix}_{n \times n}$$

- \downarrow

$$A_{n \times n} \underbrace{\begin{bmatrix} \bar{x}_1 & \bar{x}_2 & \bar{x}_3 & \dots & \bar{x}_n \end{bmatrix}_{n \times n}}_S = \underbrace{\begin{bmatrix} \bar{x}_1 & \bar{x}_2 & \bar{x}_3 & \dots & \bar{x}_n \end{bmatrix}_{n \times n}}_S \underbrace{\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}_{n \times n}}_\lambda$$

- S

S

λ

$$\longrightarrow AS = S\lambda$$

¹ $k_1 \bar{x}_1 + k_2 \bar{x}_2 = \bar{0}$ denklemi λ_2 ile çarpılarak elde edildi

Eğer eigenvector'ler lineer bağımsız iseler, S matrisi full rank ve tersi alınabilirler.

$$\longrightarrow A \underbrace{SS^{-1}}_I = S \wedge S^{-1}$$

$$\longrightarrow ASS^{-1} = S \wedge S^{-1} \quad veya \quad S^{-1}AS = \Lambda \quad \text{Eigenvalue Decomposition (EVD)}$$

A^n nasıl bulunur?

$$ASS^{-1} = S \wedge S^{-1}$$

$$A^2 = S \wedge \underbrace{S^{-1}S}_I \wedge S^{-1} = S \wedge^2 S^{-1}$$

$$A^3 = S \wedge^2 \underbrace{S^{-1}S}_I \wedge S^{-1} = S \wedge^3 S^{-1}$$

...

$$A^k = S \wedge^k S^{-1} \quad \text{eğer eigenvector'ler lineer bağımsız ise}$$

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$$\Lambda^k = \begin{bmatrix} \lambda_1^k & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2^k & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n^k \end{bmatrix}$$

.....

e^{At} nasıl bulunur?

$$e^x = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$$

$$e^{At} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{A^i t^i}{i!}$$

3.3 Özdeğer Ve Özvektörlerden Matris Oluşturma

$$\lambda_i, \bar{x}_i \quad i = 1, 2, \dots, n \quad \bar{x}_i^H \bar{x}_j = 0 \text{ olsun } (i \neq j)$$

$$n = 2 \text{ ele alalım.} \quad \|\bar{x}_i\| = 1$$

$$S = [\bar{x}_1 \quad \bar{x}_2] \quad \Lambda = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 & 0 \\ 0 & \bar{x}_2 \end{bmatrix}$$

$$S^{-1}S = I$$

$$\begin{bmatrix} - & \bar{x}_1^H & - \\ - & \bar{x}_2^H & - \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_1 & \bar{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \|\bar{x}_1\|^2 & \bar{x}_1^H \bar{x}_2 \\ \bar{x}_2^H \bar{x}_1 & \|\bar{x}_2\|^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow S^{-1} = S^H$$

$$A = S \wedge S^{-1} = S \wedge S^H$$

$$= \begin{bmatrix} \bar{x}_1 & \bar{x}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{\lambda}_1 & 0 \\ 0 & \bar{\lambda}_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} - & \bar{x}_1^H & - \\ - & \bar{x}_2^H & - \end{bmatrix} = [\lambda_1 \bar{x}_1 \quad \lambda_2 \bar{x}_2]_{2 \times 2} \begin{bmatrix} - & \bar{x}_1^H & - \\ - & \bar{x}_2^H & - \end{bmatrix}$$

$$A = \lambda_1 \bar{x}_1 \bar{x}_1^H + \lambda_2 \bar{x}_2 \bar{x}_2^H$$

Genel olarak ,özdeğerleri(λ_i) ve özvektörleri(\bar{x}_i) verilen bir matris için , eğer $\bar{x}_i^H \cdot \bar{x}_j = 0$ ise bu matris şu şekilde oluşturulabilir:

$$A = \lambda_1 \bar{x}_1 \bar{x}_1^H + \lambda_2 \bar{x}_2 \bar{x}_2^H + \dots + \lambda_n \bar{x}_n \bar{x}_n^H$$

$$\Rightarrow A = \sum_{i=1}^n \lambda_i \bar{x}_i \bar{x}_i^H \quad P_i = \bar{x}_i \bar{x}_i^H$$

Örnek:

$$\lambda_1 = \lambda_2 = 1 \quad \lambda_3 = -1$$

$$\bar{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \bar{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}, \quad \bar{x}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

A matrisini oluşturunuz?

Cevap:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{olmalı .}$$

Örnek:

$$\lambda_1 = 5, \lambda_2 = 10$$

$$\bar{x}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \bar{x}_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

A = ?

$$\bar{x}_1^H \bar{x}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix} = 0 \quad \bar{x}_1 \perp \bar{x}_2$$

$$\bar{u}_1 = \frac{\bar{x}_1}{\|\bar{x}_1\|} = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \bar{u}_2 = \frac{1}{5} \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$P_1 = \bar{u}_1 \bar{u}_1^H = \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 4 \end{bmatrix} = \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
P_2 &= \bar{u}_2 \bar{u}_2^H = \frac{1}{25} \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 & 3 \end{bmatrix} = \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 16 & -12 \\ -12 & 9 \end{bmatrix} \\
A &= \lambda_1 P_1 + \lambda_2 P_2 = 5 \cdot \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 9 & 12 \\ 12 & 16 \end{bmatrix} + 10 \cdot \frac{1}{25} \begin{bmatrix} 16 & -12 \\ -12 & 9 \end{bmatrix} \\
&= \frac{1}{5} \begin{bmatrix} 9 + 32 & 12 - 24 \\ 12 - 24 & 16 + 18 \end{bmatrix} \\
A &= \begin{bmatrix} \frac{41}{5} & \frac{-12}{5} \\ \frac{-12}{5} & \frac{34}{5} \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

Not:A simetrik bir matris.

3.4 Self-Adjoint Matrislerin Köşegenleştirilmesi

Self-adjoint matris $\longrightarrow \langle A\bar{x}, \bar{x} \rangle = \langle \bar{x}, A^H \bar{x} \rangle$

$$\begin{array}{c}
- \qquad \qquad \qquad \downarrow \qquad \qquad \downarrow \\
- \qquad \qquad \qquad \bar{x}^H A \bar{x} = \bar{x}^H A x
\end{array}$$

- * A matrisinin elemanları reel değerler ise Self-adjoint matrise simetrik matris denir ve $A^T = A$
- * A matrisinin elemanları kompleks değerler ise Self-adjoint matrise hermitian matris denir ve $A^T = A$

Özellikleri:

- 1- Self-adjoint matrisin ($A^H = A$ ise) eigenvalue'ları reel değerliktir.
ispat: $\langle A\bar{x}, \bar{x} \rangle = \langle \lambda \bar{x}, \bar{x} \rangle = \lambda \langle \bar{x}, \bar{x} \rangle = \lambda \bar{x}^H \bar{x}$
 $\langle \bar{x}, A^H \bar{x} \rangle = \lambda^* \langle \bar{x}, \bar{x} \rangle = \lambda^* \bar{x}^H \bar{x}$
 $\rightarrow \lambda \bar{x}^H \bar{x} = \lambda^* \bar{x}^H \bar{x} \rightarrow \lambda = \lambda^*$ için λ reel değerli olmalı.
- 2- Self-adjoint(simetrik veya hermitian)matrisler için birbirinden farklı eigenvalue'lara karşılık gelen eigenvektörler birbirine diktir.
ispat: $\langle A\bar{x}_1, \bar{x}_2 \rangle = \langle \bar{x}_1, A^H \bar{x}_2 \rangle = \langle \bar{x}_1, \lambda_2 \bar{x}_2 \rangle = \lambda_2 \langle \bar{x}_1, \bar{x}_2 \rangle =$
 $\lambda_2 \bar{x}_1^H \bar{x}_2$

aynı zamanda

$$\begin{aligned}
&\langle A\bar{x}, \bar{x} \rangle = \langle \lambda_1 \bar{x}_1, \bar{x}_2 \rangle = \lambda_1 \bar{x}_1^H \bar{x}_2 \\
&\Rightarrow (\lambda_1 \bar{x}_1^H \bar{x}_2 - \lambda_2 \bar{x}_1^H \bar{x}_2) = 0 \\
&\Rightarrow (\lambda_1 - \lambda_2)(\bar{x}_1^H \bar{x}_2) = 0
\end{aligned}$$


$\lambda_1 \neq \lambda_2$ ise $\bar{x}_1 \perp \bar{x}_2$ olmalı.

Teorem: $n \times n$ boyutu A matrisi hermitian bir matris ise ($A^H = A$ ise) A matrisinin EVD açılımı :

$$A = U \Lambda U^H = \sum_{i=1}^n \lambda_i \bar{U}_i \bar{U}_i^H \text{ şeklinde yazılır .}$$

Bu arada U matrisi $U = [\bar{U}_1 \ \bar{U}_2 \bar{U}_3 \cdots \bar{U}_n]$ unitary bir matristir.

3.5 EVD Uygulamaları



$$\bar{x} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_M \end{bmatrix} \quad \bar{a}(\Theta) = \begin{bmatrix} a_1(\Theta_i) \\ a_2(\Theta_i) \\ \vdots \\ a_M(\Theta_i) \end{bmatrix} \Rightarrow \text{steering vector at } \theta_i$$

$$\bar{x} = a(\theta_1)\alpha_1 S_1 + a(\theta_2)\alpha_2 S_2 + \cdots + a(\theta_k)\alpha_k S_k$$

Korelasyon matrisi:R

$$R = E\{\bar{x}\bar{x}^H\}$$

$M > K$

$$R \longrightarrow EVD \longrightarrow \lambda_i, \bar{U}_i$$

$$\Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \ddots & \dots & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \lambda_r & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \ddots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

Dominant eigenvalue sayısı $\rightarrow r$, ortamda r adet kullanıcı vardır .

EVD \rightarrow MUSIC, ESPRIT, \dots vs high resolution algoritmalarla Q_i 'ler bulunabilir .

3.6 Korelasyon Matrisi Özellikleri


1) $R \rightarrow$ hermitian bir matris

örnek: $x(t) = e^{j\omega t} \rightarrow$ kompleks sinusoid

$t = 0, 1, \dots, M-1$

$$\bar{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 \\ e^{j\omega} \\ e^{j2\omega} \\ \vdots \\ e^{j(M-1)\omega} \end{bmatrix}$$

$$R = E\{\bar{\mathbf{x}}\bar{\mathbf{x}}^H\} \cong \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \bar{\mathbf{x}}(i)\bar{\mathbf{x}}^H(i)$$



$$R = E\left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ e^{j\omega} \\ e^{j2\omega} \\ \vdots \\ e^{j(M-1)\omega} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & e^{j\omega} & e^{j2\omega} & \dots & e^{j(M-1)\omega} \end{bmatrix} \right\}$$

$$= E \left\{ \begin{bmatrix} 1 & e^{-jw} & e^{-j2w} & \dots & \dots & e^{-j(M-1)w} \\ e^{jw} & 1 & e^{-jw} & e^{-j2w} & \dots & e^{-j(M-1)w} \\ e^{j2w} & e^{jw} & 1 & \dots & \dots & e^{-j(M-3)w} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ e^{j(M-1)w} & e^{j(M-1)w} & \dots & \dots & \dots & 1 \end{bmatrix}_{m \times m} \right\}$$

R hermitian bir matris

2) R'nin eigenvalue'ları reel ve pozitif değerlerden oluşur .

$$\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \dots \neq \lambda_m > 0$$

3) R'nin eigenvektörleri birbirine diktir. $(\bar{q}_i \perp \bar{q}_j)$

$$\bar{q}_1, \bar{q}_2, \dots, \bar{q}_m \rightarrow \bar{q}_i^H \cdot \bar{q}_j$$

4) R^k matrisinin eigenvalue'ları

$$\lambda_1^k, \lambda_2^k, \dots, \lambda_m^k \quad \underline{\text{ispatı ? (ödev)}}$$

$$5) Q = [\bar{q}_1 \quad \bar{q}_2 \quad \dots \quad \bar{q}_m] \quad Q^H R Q = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 & \dots & \dots & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \ddots & \dots & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \lambda_r & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \ddots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \dots & \dots & \lambda_m \end{bmatrix}$$

Unitary– similarity transformation

$$6) \operatorname{tr}[R] = \sum_{i=1}^M \lambda_i \quad \underline{\text{İspatı ?}}$$

Bölüm 4

Bölüm4

4.1 QR Ayrıştırması

$$A = QR$$

Q:unitary matris

R:üst üçgensel matris

$$\text{Unitary matris: } Q^H \cdot Q = I$$

Eğer Q'nun sadece gerçekteğerlikli elemanları varsa Q'ya ortogonal matris denir.

$$\text{Lema1: } \bar{y} = Q\bar{x} \quad \|y\| = \|x\| \quad \bar{y} \in R^{m \times 1}, \bar{x} \in R^{m \times 1}$$

$$\text{Lema2: } Y = QX \quad , Y \text{ ve } X \text{ birer matris}$$

$$\|Y\|_F = \|X\|_F$$

Not: $\|\cdot\|_F \rightarrow$ matris Frobenius norm

$$\|X\|_F = (\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |X_{ij}^2|)^{\frac{1}{2}} = (tr(X^H X))^{\frac{1}{2}}$$

Örnek:

$$X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}, X^H = \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}$$

$$X^H X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 + c^2 & ab + cd \\ ab + cd & b^2 + d^2 \end{bmatrix}$$

$$tr(X^H X) = a^2 + b^2 + c^2 + d^2 = (\sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 |X_{ij}^2|)$$

4.2 Niçin QR ?

$$A_{m \times n} \bar{x}_{n \times 1} = \bar{b}_{m \times 1} \longrightarrow \text{çözüm} \hat{x} = \underbrace{(A^H A)^{-1} A^H}_{A^\#} \cdot \bar{b}$$

- $A^\#$: pseduo-inverse

-bu çözüm $\|A\bar{x} - \bar{b}\|_2^2$ minimize eden bir çözümdür.

-aynı zamanda least-squares(en küçük kareler) çözümünü olarakda adlandırılır.

$$\|A\bar{x} - \bar{b}\|^2 = (A\bar{x} - \bar{b})^H (A\bar{x} - \bar{b}) = (\bar{x}^H A^H - \bar{b}^H)(A\bar{x} - \bar{b})$$

$$J(\bar{x}) = \bar{x}^H A^H A \bar{x} - \bar{x}^H A^H \bar{b} - \bar{b}^H A \bar{x} + \bar{b}^H \bar{b}$$

↑

maliyet fonksiyonu

$$\text{vektörel türev} \rightarrow \frac{\partial J(\bar{x})}{\partial \bar{x}} = A^H A \bar{x} + A^H A \bar{x} - A^H \bar{b} - A^H \bar{b} = 0$$

$$\Rightarrow 2A^H A \bar{x} - 2A^H \bar{b} = 0$$

$$\Rightarrow \bar{x} = (A^H A)^{-1} A^H \bar{b} \quad \text{LS çözüm}$$

İpucu:

$$\frac{\partial}{\partial \bar{x}} (\bar{x}^H A) = A, \quad \frac{\partial}{\partial \bar{x}} (A \bar{x}) = A^H$$

Örnek:

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad \bar{c} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$$

$$\bar{x}^H \bar{c} = [x_1 c_1 + x_2 c_2 + x_3 c_3]$$

$$\frac{\partial}{\partial x_1} \bar{x}^H \bar{c} = c_1, \quad \frac{\partial}{\partial x_2} \bar{x}^H \bar{c} = c_2, \quad \frac{\partial}{\partial x_3} \bar{x}^H \bar{c} = c_3$$

$$\frac{\partial}{\partial \bar{x}} = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \\ \frac{\partial}{\partial x_2} \\ \frac{\partial}{\partial x_3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \bar{c}$$

$$A_{m \times n} = Q_{m \times m} R_{m \times n} = Q \begin{bmatrix} R_1 \\ \bar{0} \end{bmatrix}$$

$$m > n \quad R_1 : n \times n, \bar{0} : (m - n) \times n$$

$$A_{m \times n} \bar{x}_{n \times 1} = \bar{b}_{m \times 1} (*)$$

$$\Rightarrow QR\bar{x} = \bar{b}$$

$$\underbrace{Q^H Q}_{I} R\bar{x} = Q^H \bar{b}$$

$$R\bar{x} = Q^H \cdot \bar{b}$$

$$Q_{m \times m}^H \cdot b_{m \times 1} = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \rightarrow c : n \times 1 \quad d : (m - n) \times 1$$

$$R\bar{x} = Q^H \bar{b}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} R_1 \\ 0 \end{bmatrix} \bar{x} = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$$

$$R_{1n \times n} \bar{x}_{n \times 1} = \bar{c}_{n \times 1} \quad (**)$$

(*) ve (**) denklemlerinin çözümü aynı \bar{x} vektörüdür.


(**) kolaylıkla çözülebilir çünkü R_1 üst üçgensel bir matrisdir.

not: $m < n$ ise QR kullanılamaz!

QR Ayrıştırması:

Gram–Schmidt algoritması, Householder dönüşümü veya Givens rotation yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

4.3 HouseHolder Dönüşümü:



\bar{x}_v : \bar{x} vektörünün \bar{v} vektörü üzerine izdüşümü

\bar{x}_v^\perp : $(\bar{x} - \bar{x}_v)$ yani \bar{x} 'in \bar{x}_v 'ye dik olan bileşeni

$H_v \bar{x}$: \bar{x} vektörünün \bar{x}_v^\perp 'ye göre yansıtılmışı (döndürülmüşü)

$$\begin{aligned}\bar{x}_v &= P_v \cdot \bar{x} \\ P_v &= \frac{\overline{V}V^H}{(\overline{V}^H\overline{V})}, \quad \overline{V} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \bar{x}_v &= \frac{\overline{V}V^H}{(\overline{V}^H\overline{V})} \cdot \bar{x} \\ \bar{x}_v^\perp &= \overline{P}_v^\perp \bar{x}, \quad \overline{P}_v^\perp = I - \overline{P}_v = I - \frac{\overline{V}V^H}{(\overline{V}^H\overline{V})}\end{aligned}$$

$$\bar{x}_v^\perp = \left(I - \frac{\overline{V}V^H}{(\overline{V}^H\overline{V})}\right)\bar{x} = \bar{x} - \bar{x}_v$$

$$H_v = I - 2 \frac{\overline{V}V^H}{(\overline{V}^H\overline{V})}$$

Householder dönüşüm matrisi \bar{x} 'in yalnızca \overline{V} vektörü üzerindeki bileşenin yönünü değiştirir.

$$\begin{aligned}H_v &= I - \underbrace{\frac{\overline{V}V^H}{(\overline{V}^H\overline{V})}}_{= P_v^\perp - P_v} - \frac{\overline{V}V^H}{(\overline{V}^H\overline{V})} \\ &= P_v^\perp - P_v\end{aligned}$$

$$H_v \bar{x} = P_v^\perp \bar{x} - P_v \bar{x} = \bar{x}_v^\perp - \bar{x}_v = \bar{x}_v^\perp + (-\bar{x}_v)$$

$$H_v^2 = I \quad H_v^H = H_v$$

Ödev: $H_v.H_v = I$ olduğunu gösteriniz.

\overline{V} Nasıl seçilir?

$$\overline{\mathbf{X}} = \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_n \end{bmatrix}_{n \times 1}$$

Amaç ,bu \overline{X} vektörünü öyle bir H_v ile çarpmak ve sonuçta

$x_2 = x_3 = \dots = x_n = 0$ yapmak.

Amaç:

$$H_v \bar{x} = \begin{bmatrix} \alpha \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_{n \times 1} = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}_{n \times 1} = \alpha \bar{e}_1$$

$$\Rightarrow \left[I - 2 \frac{\overline{V} V^H}{(\overline{V}^H \overline{V})} \right] \bar{x} = \alpha \bar{e}_1$$

$$\bar{x} - 2 \frac{(\bar{V}^H \bar{x}) \bar{V}}{(\bar{V}^H \bar{V})} = \alpha \bar{e}_1$$


$$\Rightarrow \bar{x} - \alpha \bar{e}_1 = 2 \frac{(\bar{V}^H \bar{x})}{(\bar{V}^H \bar{V})} \cdot \bar{V} \quad (2 \frac{(\bar{V}^H \bar{x})}{(\bar{V}^H \bar{V})} = 1 \text{ kabul edersek})$$

$$(\text{Not}: H_v \bar{x} = \alpha \bar{e}_1 \quad \|H_v \bar{x}\| = \|\alpha \bar{e}_1\| \quad H_v: \text{unitary.} \quad \Rightarrow \|\bar{x}\| = \alpha)$$

$$\bar{x} - \alpha \bar{e}_1 = \bar{V}$$

$$\overline{x} \pm \|\overline{x}\| \overline{e}_1 = \overline{V}$$

$$\Rightarrow \bar{V} = \bar{x} + \text{sign}(x_1) \|x\| \bar{e}_1$$



$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} x & x & x \\ x & x & x \\ x & x & x \\ x & x & x \end{bmatrix} \quad \text{genel olarak } A_{m \times n}, m > n$$

Step1

$$\overline{H_1 A} = \begin{bmatrix} \alpha_1 & x & x \\ 0 & x & x \\ 0 & x & x \\ 0 & x & x \end{bmatrix}$$

$$H_1 : 4 \times 4$$

$$H_1 = Q = I - 2 \frac{v_1 \bar{v}_1^H}{\|\bar{v}_1\|^2}$$

$$\bar{v}_1 = \bar{x} + \text{sign}(x_1) \|\bar{x}\| \bar{e}_1 \rightarrow 4 \times 1$$

$$\bar{e}_1 = [1000]^T$$

$$V_1 : 4 \times 1$$

Step2

$$H_2 : 3 \times 3$$

$$H_2 = I - 2 \frac{\bar{v}_2 \bar{v}_2^H}{\|\bar{v}_2\|^2}$$

$$\bar{v}_2 = \bar{y} + \text{sign}(y_1) \|\bar{y}\| e_1 \rightarrow 3 \times 1 \quad V_2 : 3 \times 1$$

$$Q_2 = \begin{bmatrix} 1 & \bar{0}^T \\ \bar{0}^T & H_2 \end{bmatrix}_{2 \times 2} \quad \bar{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad Q_2 Q_1 A = \begin{bmatrix} \alpha_1 & x & x \\ 0 & \alpha_2 & x \\ 0 & 0 & x \\ 0 & 0 & x \end{bmatrix}$$

Step3:

$$H_3 : 2 \times 2$$

$$H_3 = I - 2 \frac{\bar{v}_3 \bar{v}_3^H}{\|\bar{v}_3\|^2}$$

$$\bar{v}_3 = \bar{z} + \text{sign}(z_1) \|\bar{z}\| e_1 \rightarrow 2 \times 1 \quad V_3 : 2 \times 1$$

$$Q_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \bar{0}^T \\ 0 & 1 & \bar{0}^T \\ \bar{0} & \bar{0} & H_3 \end{bmatrix}_{3 \times 3} \quad \bar{0} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad Q_3 Q_2 Q_1 A = \begin{bmatrix} \alpha_1 & x & x \\ 0 & \alpha_2 & x \\ 0 & 0 & \alpha_3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = R$$

Sonuçta :

$$Q_3 Q_2 Q_1 A = R$$

$$\underbrace{Q_3^H Q_3}_{I} Q_2 Q_1 A = Q_3^H R$$

I

$$\underbrace{Q_2^H Q_2}_{I} Q_1 A = Q_2^H Q_3^H R$$

I

$$\underbrace{Q_1^H Q_1}_{I} A = Q_1^H Q_2^H Q_3^H R$$

I

$$\Rightarrow A = \underbrace{Q_1^H Q_2^H Q_3^H}_{Q} R$$

-

$$\Rightarrow A = QR$$

$$Q = Q_1^H Q_2^H Q_3^H, Q^H = Q_3 Q_2 Q_1$$

Denklem sistemi

$$A\bar{x} = \bar{b}$$

$$QR\bar{x} = \bar{b}$$

$$R\bar{x} = Q^H b = \begin{bmatrix} \bar{c} \\ \bar{d} \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} n \\ m-n \end{matrix} \left\{ \begin{bmatrix} R_1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \right\} \bar{X} = \begin{bmatrix} \bar{c} \\ \vdots \\ \bar{d} \end{bmatrix} \begin{matrix} \} n \\ \} m-n \end{matrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_n$

Problem $R_1 \bar{X} = \bar{C}$ sistemi çözümüne indirgenmiştir.

R_1 üst üçgensel bir matris olduğundan çözüm geri yerine koyma yöntemiyle kolaylıkla bulunabilir.

Not:

2. ve 3. adımdaki Q_2 ve Q_3 'ler

$$Q_{24 \times 4} = I - 2 \frac{\tilde{V}_2 \tilde{V}_2^H}{\|\tilde{V}_2\|^2} \quad \tilde{V}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ \tilde{V}_2 \end{bmatrix}_{4 \times 1}$$

$$Q_{34 \times 4} = I - 2 \frac{\tilde{V}_3 \tilde{V}_3^H}{\|\tilde{V}_3\|^2} \quad \tilde{V}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \tilde{V}_3 \end{bmatrix}_{4 \times 1}$$

4.4 QR Yöntemi İle Denklem Sistemi Çözümü

Matlab Örneği

```
>> A = [788; 862; 173; 073; 695]
```

```
A =  $\begin{bmatrix} 788 \\ 862 \\ 173 \\ 073 \\ 695 \end{bmatrix}$ 
```

```
>> b = [4726242339]'
```

```
b =  $\begin{bmatrix} 47 \\ 26 \\ 24 \\ 23 \\ 39 \end{bmatrix}$ 
```

```
>> [m,n] = size(A)
```

```
m =
```

```
5
```

```
n =
```

```
3
```

```
-----  
function v = makehouse(x)
```

```
%
```

```
% Make the Householder vector v such that  
Hx has zeros in
```

```
% all but the first component
```

```
%
```

```
% function v = makehouse(x)
```

```
%
```

```
% x= vector to be transformed
```

```
%
```

```
% v= Householder vector
```

```
% © 1999 by Todd K. Moon
```

```
    v = x(:);
```

```
    nv = norm(v);
```

```
    if(abs(x(1)) == nv)
```

```
        v = 0 * v;
```

```
    else
```

```
        if(v(1))
```



```

v(1) = v(1) + sign(v(1)) * nv;
else
v(1) = v(1) + nv;
end
end
. >> v = makehouse(A(:,1));

```

```

v =  $\begin{bmatrix} 19.2474 \\ 8.0000 \\ 0 \\ 6.0000 \end{bmatrix}$ 
>> a = A(:,1)

```

```

a =  $\begin{bmatrix} 7 \\ 8 \\ 1 \\ 0 \\ 6 \end{bmatrix}$ 

```

```

>> na = (a' * a)^0.5

```

```

na =
12.2474

```

```

>> e1 = [10000]

```

```

e1 =
[10000]

```

```

>> e1 = na * e1

```

```

e1 =
[12.2474 0000]

```

```

e1 = e1'
e1 =  $\begin{bmatrix} 12.2474 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ 

```

```

>> v = a + e1

```

```

v =  $\begin{bmatrix} 19.2474 \\ 8.0000 \\ 1.0000 \\ 0 \\ 6.0000 \end{bmatrix}$ 

```

```

>> eye(5,5)

```

$$\begin{aligned}
ans &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
\gg H_1 &= eye(5, 5) - 2 * v * v' / (v' * v) \\
H_1 &= \begin{bmatrix} -0.5715 & -0.6532 & -0.0816 & 0 & -0.4899 \\ -0.6532 & 0.7285 & -0.0339 & 0 & -0.2036 \\ -0.0816 & -0.0339 & 0.9958 & 0 & -0.0225 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 & 0 \\ -0.4899 & -0.2036 & -0.0255 & 0 & 0.8473 \end{bmatrix} \\
\gg Q_1 &= H_1 \\
Q_1 &= \begin{bmatrix} -0.5715 & -0.6532 & -0.0816 & 0 & -0.4899 \\ -0.6532 & 0.7285 & -0.0339 & 0 & -0.2036 \\ -0.0816 & -0.0339 & 0.9958 & 0 & -0.0225 \\ 0 & 0 & 0 & 1.0000 & 0 \\ -0.4899 & -0.2036 & -0.0255 & 0 & 0.8473 \end{bmatrix} \\
\gg A_1 &= Q_1 * A \\
A_1 &= \begin{bmatrix} -12.2474 & -13.4722 & -8.5732 \\ -0.0000 & -2.9247 & -4.8885 \\ -0.0000 & 5.8844 & 2.1389 \\ 0 & 7.0000 & 3.0000 \\ -0.0000 & 2.3065 & -0.1664 \end{bmatrix} \\
a_1 &= A_1(2 : 5, 2) \\
a_1 &= \begin{bmatrix} -2.9247 \\ 5.8844 \\ 7.0000 \\ 2.3065 \end{bmatrix} \\
\gg v_2 &= a_1 - (sqrt(a_1' * a_1)) * [1000]' \\
v_2 &= \begin{bmatrix} -12.7989 \\ 5.8844 \\ 7.0000 \\ 2.3065 \end{bmatrix} \\
\gg H_2 &= eye(4, 4) - 2 * v_2 * v_2' / (v_2' * v_2) \\
H_2 &= \begin{bmatrix} -0.2962 & 0.5959 & 0.7089 & 0.2336 \\ 0.5959 & 0.7260 & -0.3259 & -0.1074 \\ 0.7089 & -0.3259 & 0.6123 & -0.1278 \\ 0.2336 & -0.1074 & -0.1278 & 0.9579 \end{bmatrix} \\
Q_2 &= zeros(5, 5)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Q_2 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
\gg Q_2 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
\gg Q_2(2:5, 2:5) &= H_2 \\
Q_2 &= \begin{bmatrix} 1.0000 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.2962 & 0.5959 & 0.7089 & 0.2336 \\ 0 & 0.5959 & 0.7260 & -0.3259 & -0.1074 \\ 0 & 0.7089 & -0.3259 & 0.6123 & -0.1278 \\ 0 & 0.2336 & -0.1074 & -0.1278 & 0.9579 \end{bmatrix} \\
\gg A_2 &= Q_2 * A_1 \\
A_2 &= \begin{bmatrix} -12.2474 & -13.4722 & -8.5732 \\ 0.0000 & 9.8742 & 4.8105 \\ -0.0000 & -0.0000 & -2.3203 \\ -0.0000 & -0.0000 & -2.3046 \\ -0.0000 & 0 & -1.9142 \end{bmatrix} \\
a_3 &= \begin{bmatrix} -2.3203 \\ -2.3046 \\ -1.9142 \end{bmatrix} \\
\gg v_3 &= a_3 - (sqrt(a'_3 * a_3)) * [1 \ 0 \ 0]' \\
v_3 &= \begin{bmatrix} -6.1096 \\ -2.3046 \\ -1.9142 \end{bmatrix} \\
\gg H_3 &= eye(3,3) - 2 * v_3 * v'_3 / (v'_3 * v_3) \\
H_3 &= \begin{bmatrix} -0.6123 & -0.6082 & -0.5052 \\ -0.6082 & 0.7706 & -0.1906 \\ -0.5052 & -0.1906 & 0.8417 \end{bmatrix} \\
\gg Q_3 &= zeros(5,5) \\
Q_3 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
\gg Q3(1:2, 1:2) &= eye(2,2)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
Q_3 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
\gg Q3(3:5, 3:5) &= \bar{H}_3 \\
Q_3 &= \begin{bmatrix} 1.0000 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1.0000 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.6123 & -0.6082 & -0.5052 \\ 0 & 0 & -0.6082 & 0.7706 & -0.1906 \\ 0 & 0 & -0.5052 & -0.1906 & 0.8417 \end{bmatrix} \\
\gg A_3 &= Q_3 * A_2 \\
A_3 &= \begin{bmatrix} -12.2474 & -13.4722 & -8.5732 \\ 0.0000 & 9.8742 & 4.8105 \\ 0.0000 & 0.0000 & 3.7893 \\ 0.0000 & -0.0000 & -0.0000 \\ -0.0000 & 0.0000 & 0 \end{bmatrix} \\
\gg U &= A_3(1:3,:) \\
U &= \begin{bmatrix} -12.2474 & -13.4722 & -8.5732 \\ 0.0000 & 9.8742 & 4.8105 \\ 0.0000 & 0.0000 & 3.7893 \end{bmatrix} \\
\gg Q_h &= Q_3 * Q_2 * Q_1 \\
Q_h &= \begin{bmatrix} -0.5715 & -0.6532 & -0.0816 & 0 & -0.4899 \\ 0.0304 & -0.2836 & 0.5975 & 0.7089 & 0.2431 \\ 0.7795 & -0.5901 & -0.1516 & -0.1083 & -0.0974 \\ 0.0695 & 0.1682 & -0.6686 & 0.6944 & -0.1940 \\ -0.2448 & -0.3413 & -0.4078 & -0.0596 & 0.8086 \end{bmatrix} \\
\gg b & \\
b &= \begin{bmatrix} 47 \\ 26 \\ 24 \\ 23 \\ 39 \end{bmatrix} \\
\gg Q_h & \\
Q_h &= \begin{bmatrix} -0.5715 & -0.6532 & -0.0816 & 0 & -0.4899 \\ 0.0304 & -0.2836 & 0.5975 & 0.7089 & 0.2431 \\ 0.7795 & -0.5901 & -0.1516 & -0.1083 & -0.0974 \\ 0.0695 & 0.1682 & -0.6686 & 0.6944 & -0.1940 \\ -0.2448 & -0.3413 & -0.4078 & -0.0596 & 0.8086 \end{bmatrix} \\
\gg z &= Q_h * b
\end{aligned}$$

$$z = \begin{bmatrix} -64.9115 \\ 34.1800 \\ 11.3680 \\ 0.0000 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$c = \begin{bmatrix} -64.9115 \\ 34.1800 \\ 11.3680 \end{bmatrix}$$

$$m = 3;$$

$$\gg x(3) = c(3)/U(3,3)$$

$$x = [0 \quad 0 \quad 3.0000]$$

.....

Geri yerine koyma Matlab kodu:

```

m=3;
x(m)=c(m)/U(m,m);
for j=m-1:-1:1;
tmp=0;
for k=j+1:m;
tmp=tmp+U(j,k)*x(k);
end
x(j)=(1/U(j,j))*(c(j)-tmp);
end

```

.....

yukarıdaki kod kullanılabilir veya manual olarak tek tek şu şekilde hesaplanabilir:

$$\gg x(2) = (1/U(2,2)) * (c(2) - U(2,3) * x(3))$$

$$x =$$

$$0 \quad 2.0000 \quad 3.0000$$

$$\gg x(1) = (1/U(1,1)) * (c(1) - [U(1,2) * x(2) + U(1,3) * x(3)])$$


$$x =$$

$$1.0000 \quad 2.0000 \quad 3.0000$$

Bölüm 5

Bölüm5

5.1 Optimizasyon(En İyileme)



Tanım kümesi $\Omega : \{x : x \geq 0\}$

x_1 : kesin lokal minimum

x_2 : maksimum

x_3 : lokal minimum

$$\frac{\partial f(x)}{\partial x} \Big|_{x=x_1} = 0, \quad \frac{\partial f(x)}{\partial x} \Big|_{x=x_2} = 0, \quad \frac{\partial f(x)}{\partial x} \Big|_{x=x_3} = 0$$

$$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow$$
$$\frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} \Big|_{x=x_1} > 0, \quad \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} \Big|_{x=x_2} < 0, \quad \frac{\partial^2 f(x)}{\partial x^2} \Big|_{x=x_3} > 0$$

Tanım: $f : R^n \rightarrow R$ $\varepsilon > 0$ ve $x \in R$

$|x - x^*| < \varepsilon$ için $f(x) \geq f(x^*)$ sağlayan $x^* \in R$ noktasına lokal minimum noktası denir.

Eğer $f(x) > f(x^*) \forall x$ için x^* noktasına kesin lokal minimum denir.

Tüm $x \in R$ kümesi içinde $f(x) \geq f(x^*)$ sağlayan $x \in R$ noktasına global minimum denir.

Gradyan Operatörü: (∇_x)

$$\bar{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$$\nabla_x f(\bar{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_2} \\ \vdots \\ \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_n} \end{bmatrix}_{n \times 1} \quad f(\bar{x}) : R^n \rightarrow R$$

Hessian Matrisi(H)

$$H = \nabla_x^2 f(\bar{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_2 \partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1} & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_n} \end{bmatrix}_{n \times n}$$

Minumum İçin Gerekli Koşul:

1. Eğer \bar{x}^* f fonksiyonun Ω tanım kümesinde lokal minimum noktası ise ,

$$[\nabla f(\bar{x}^*)]^T \bar{d} \geq 0$$

\bar{d}, \bar{x}^* noktasındaki uygulanabilir yön vektörü.

2. $\nabla f(\bar{x}^*) = \bar{0}$
3. Verilen \bar{x}^* noktası için Hessian matrisi pozitif semidefinite bir matris olmalı

$$\underbrace{< \nabla^2 f(\bar{x}^*) \bar{d}, \bar{d} >}_H = \bar{d}^T \cdot \nabla^2 f(\bar{x}^*) \bar{d} \geq 0$$

Örnek:

$$\bar{x} = [x_1 x_2]^T$$

$$f(\bar{x}) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 + 3x_2^2 - 20x_1 + 4x_2$$

$x_1 \geq 0 \quad x_2 \geq 0$ için minimum noktası?

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} = 6x_1 + 2x_2 - 20 \quad \frac{\partial f}{\partial x_2} = 2x_1 + 6x_2 + 4$$

$$\nabla f(\bar{x}) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6x_1 + 2x_2 - 20 \\ 2x_1 + 6x_2 + 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{Çözüm: } \bar{x}^* = \begin{bmatrix} \bar{x}_1^* \\ \bar{x}_2^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ -2 \end{bmatrix}$$


$$f(\bar{x}^*) = f(4, -2) = -44 \quad \bar{x}^* \geq 0 \text{ koşulunu sağlamıyor.}$$

$\bar{x}_1^* \geq 0 \quad \bar{x}_2^* \geq 0 \rightarrow$ sınırlandırmaları(constraint) gözönüne alırsak :

$$\text{minimum nokta} \rightarrow \begin{bmatrix} \bar{x}_1^* \\ \bar{x}_2^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{10}{3} \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{fonksiyonun lokal minimumu} \rightarrow f\left(\frac{10}{3}, 0\right) = -33,33$$

$$\bar{x}^* = \begin{bmatrix} \frac{10}{3} \\ 0 \end{bmatrix} \text{ için } \rightarrow \nabla f(\bar{x}^*) = \begin{bmatrix} 6 \cdot \frac{10}{3} + 2 \cdot 0 - 20 \\ 2 \cdot \frac{10}{3} + 6 \cdot 0 + 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{32}{3} \end{bmatrix}$$



o:global minimum

x:sınırlandırılmış(constraint)minimum

$$\frac{d}{dx}(f(g(x))) = f'(g(x))g'(x)$$

Örnek:

$$f(x, y) = x^2y$$

$$g(x, y) = 3y^2x$$

$$h(x, y) = x - 2y$$

$$F(x, y) = f(g(x, y), h(x, y)) = (3y^2x)^2(x - 2y)$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = ? \quad \frac{\partial F}{\partial y} = ?$$

$$v = g(x, y), w = h(x, y) \longrightarrow u = f(v, w) = v^2w$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial w} \cdot \frac{\partial w}{\partial x} =$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 2vw = 2g(x, y) \cdot h(x, y) = 2(3y^2x)(x - 2y) = 6x^2y^2 - 12xy^3$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = 3y^2$$

$$\frac{\partial u}{\partial w} = v^2 = (3y^2x)^2 = 9x^2y^4$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 1$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = (6x^2y^2 - 12xy^3)3y^2 + 9x^2y^4 = 18x^2y^4 - 36xy^5 + 9x^2y^4 = 27x^2y^4 - 36xy^5 //$$

Genel olarak x_1, x_2, \dots, x_n bağımsız değişkenler

$$g_1(x_1, x_2, \dots, x_n), g_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, g_m(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(g_1, g_2, \dots, g_n)$$

$$\frac{\partial F}{\partial x_j} = \sum_{i=1}^m D_i f g_i \quad D_i : i. \text{ argümanın türevi}$$

$$= \frac{\partial f}{\partial g_1} \cdot \frac{\partial g_1}{\partial x_j} + \frac{\partial f}{\partial g_2} \cdot \frac{\partial g_2}{\partial x_j} + \dots + \frac{\partial f}{\partial g_m} \cdot \frac{\partial g_m}{\partial x_j}$$


Örnek:

$$f(x_1, x_2) = 3x_1^3x_2^3 - 2x_1^2x_2 + 5 \quad \nabla_x f : ? \quad H = ? \quad x_1 = 1, x_2 = 1$$

$$\nabla_x f = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1} \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6x_1^3x_2^3 - 4x_1x_2 \\ 9x_1^2x_2^2 - 2x_1 \end{bmatrix} \Big|_{x_1=1, x_2=1} = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial x_1} \frac{\partial}{\partial x_1} f & \frac{\partial}{\partial x_1} \frac{\partial}{\partial x_2} f \\ \frac{\partial}{\partial x_2} \frac{\partial}{\partial x_1} f & \frac{\partial}{\partial x_2} \frac{\partial}{\partial x_2} f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6x_2^3 - 4x_2 & 18x_1x_2^2 - 4x_1 \\ 18x_1x_2^2 - 4x_1 & 18x_1^2x_2 \end{bmatrix}_{x_1=1, x_2=1} = \begin{bmatrix} 2 & 14 \\ 14 & 18 \end{bmatrix}$$

Örnek:



Ölçüm değerleri: $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ $y = ax + b$ $a = ?, b = ?$
least-squares çözümü a ve b'yi verir?

model: $y = ax + b$

ölçüm x_i, y_i

1.ölçüm: $e_1 = y - y_1 = (ax_1 + b) - y_1$

2.ölçüm: $e_2 = y - y_2 = (ax_2 + b) - y_2$

\vdots


n.ölçüm: $e_n = y - y_n = (ax_n + b) - y_n$

Amaç: hataların karelerinin ortalamasını minimize eden a ve b değerlerini bulmak .

$J(a, b) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i^2 \rightarrow$ hataların karelerinin ortalaması (mean squared error-MSE)

$\nabla J = \begin{bmatrix} \frac{\partial J}{\partial a} \\ \frac{\partial J}{\partial b} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow$ MSE'yi minimum yapan değer Minimum Mean Squared Error (MMSE) -Least Squares (LS)

Ödev:



$$y = ax + b \longrightarrow J(a, b)$$

$$y = ax^2 + bx + c \longrightarrow J(a, b, c)$$

5.2 Koşullu (Constraint) Optimizasyon

Problem tanımı: $\min f(\bar{x})$

Koşul

$$\left. \begin{array}{l} h_1(\bar{x}) = 0 \\ h_2(\bar{x}) = 0 \\ \vdots \\ h_m(\bar{x}) = 0 \end{array} \right\} \text{eşitlik koşulları}$$

$$\left. \begin{array}{l} g_1(\bar{x}) \leq 0 \\ g_2(\bar{x}) \leq 0 \\ \vdots \\ g_p(\bar{x}) \leq 0 \end{array} \right\} \text{eşitsizlik koşulları}$$

$$\bar{h} = (h_1, h_2, \dots, h_m)$$

$$\bar{g} = (g_1, g_2, \dots, g_p)$$

$$x \in \Omega, \Omega \in R^n$$


Yukarıdaki problem tekrar yazılırsa

$$\min f(\bar{x})$$

$$\bar{h}(\bar{x}) = \bar{0}$$

$$\bar{g}(\bar{x}) \leq 0 \quad \bar{x} \in R^n$$

Eşitlik koşulu:



Teorem: (Eşitlik sınırlaması için gerekli koşul)

\bar{x}^* noktası f fonksiyonunun $\bar{h}(\bar{x}) = 0$ koşulu altında lokal ekstremum noktası için aşağıdaki koşulu sağlaması gerekir.

$$\nabla f(\bar{x}^*) + \nabla \bar{h}(\bar{x}^*) \cdot \Lambda = 0$$

$\Lambda \in R^m$ sayısı lagrange çarpanı olarak adlandırılır.

$$\nabla f(\bar{x}^*) + \sum_{i=1}^m \nabla h_i(\bar{x}^*) \cdot \Lambda_i = 0$$

Lagrange fonksiyonu:

$$L(\bar{x}, \bar{\Lambda}) = f(\bar{x}) + \bar{h}(\bar{x})^T \cdot \bar{\Lambda}$$

$$\nabla_x L(\bar{x}, \bar{\Lambda}) = 0$$

$$\nabla_{\Lambda} L(\bar{x}, \bar{\Lambda})$$

min veya max olduğunu bulmak için 2.derece koşullar:

$$F_{n \times n}(\bar{x}, \bar{\Lambda}) = \sum_{k=1}^m \frac{\partial^2 \bar{h}_k(\bar{x})}{\partial x_i \partial x_j} x_k \leftarrow H \text{ matrisinin (i,j). elemanı}$$

$$H_{n \times n}(\bar{x}) = \frac{\partial^2 f(\bar{x})}{\partial x_i \partial x_j} \leftarrow F \text{ matrisinin (i,j). elemanı}$$

$$L(\bar{x}^*) = H(\bar{x}^*) + F(\bar{x}^*, \Lambda)$$

$L(\bar{x}^*)$ pozitif semidefinite bir matris ise bulunan \bar{x}^* noktası minimum noktasıdır.

Örnek:

$$f(x_1, x_2) = 3x_1^2 + 4x_2^2 + 6x_1x_2 - 8x_2 - 6x_1$$

$$\text{Sınırlama: } h_1(x_1, x_2) = x_1 + x_2 - 9 = 0$$

verilen koşulda f'yi minimize eden değeri($x_1^*=?$, $x_2^*=?$)

çözüm: $\bar{x} = [x_1 \ x_2]^T$, Lagrange çarpanı Λ_1

$$L(\bar{x}, \Lambda_1) = f(\bar{x}) + \Lambda_1 h_1(\bar{x})$$

$$\nabla_x L = \begin{bmatrix} \frac{\partial L}{\partial x_1} \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} \end{bmatrix}$$

$$L(\bar{x}, \Lambda_1) = (3x_1^2 + 4x_2^2 + 6x_1x_2 - 8x_2 - 6x_1) + \Lambda_1(x_1 + x_2 - 9)$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial L}{\partial x_1} = 6x_1 + 6x_2 - 6 + \Lambda_1(*) \\ \frac{\partial L}{\partial x_2} = 8x_2 + 6x_1 - 8 + \Lambda_1(**) \\ \frac{\partial L}{\partial \Lambda_1} = x_1 + x_2 - 9(***) \end{array} \right\} 3 \text{ bilinmeyenli 3 denklem .}$$

$$(**) - (*) \rightarrow 2x_2 - 2 = 0 \Rightarrow \boxed{x_2^* = 1}$$

$$(***) \rightarrow \boxed{x_1^* = 8}$$

$$(*)' \text{de } x_1^* \text{ ve } x_2^* \text{ yerine yazılırsa} \rightarrow \boxed{\Lambda_1 = -48}$$

$$\bar{x}^* = \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Örnek:

Bir önceki örnekte $h_1(\bar{x}) = x_1^2 + x_2^2 - 9 = 0$ verilirse $x_1^*, x_2^* = ?$

Örnek:

üstteki örnekte

$$\left. \begin{array}{l} h_1(x_1, x_2) = x_1^2 + x_2^2 - 9 = 0 \\ h_1(x_1, x_2) = 2x_1 - x_2 - 4 = 0 \end{array} \right\} x_1^* = ? \quad x_2^* = ?$$

$$L(\bar{x}, \bar{\Lambda}) = f(\bar{x}) + \Lambda_1 h_1(\bar{x}) + \Lambda_2 h_2(\bar{x})$$

5.3 Ara Sınav Çözümleri

$$1) a) A = \begin{bmatrix} 10 & 15 & 20 & 30 \\ 9 & 10 & 15 & 20 \\ 20 & 25 & 30 & 40 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \rightarrow \text{elma} \\ \rightarrow \text{portakal} \\ \rightarrow \text{nar} \end{array}$$

$\begin{array}{cccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ MA & MB & MC & MD \end{array}$

$$B = \begin{bmatrix} 20 & 30 & 40 \\ 0.21 & 0.11 & 0.31 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \rightarrow \text{fiyat (KR)} \\ \rightarrow \text{ağırlık (kg)} \end{array}$$

$\begin{array}{ccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ \text{elma} & \text{port.} & \text{nar} \end{array}$

$$C = BA = \begin{bmatrix} 1270 & 1600 & 2050 & 2800 \\ 9.3 & 12 & 15.2 & 20.9 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \rightarrow \text{fiyat} \\ \rightarrow \text{ağırlık} \end{array}$$

$\begin{array}{cccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ MA & MB & MC & MD \end{array}$

b)MATLAB

$$A(2:3,1:2:4) = \begin{bmatrix} 9 & 15 \\ 20 & 30 \end{bmatrix}$$

c)B(1,:)*A(:,1)

d)B(2,:)*A(:,3)

$$2) \quad \bar{x}_1 = \begin{bmatrix} \alpha \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \bar{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$a) \quad \langle \bar{x}_1, \bar{x}_2 \rangle = \bar{x}_1^T \cdot \bar{x}_2 = [\alpha \quad -1 \quad 2] \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \alpha + 1 + 2 = 0 \Rightarrow$$

$$\boxed{\alpha = -3}$$

b) $\bar{x}_1 \perp \bar{x}_2$ olduğundan \bar{e}_1 ve \bar{e}_2 'yi bulurken normlarına bölmemiz yeterli

$$\|\bar{x}_1\| = \sqrt{\bar{x}_1^T \cdot \bar{x}_1} = \left([-3 \quad -1 \quad 2] \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{14}$$

$$\bar{e}_1 = \frac{\bar{x}_1}{\|\bar{x}_1\|} = \frac{1}{\sqrt{14}} \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$


$$\|\bar{x}_2\| = \sqrt{\bar{x}_2^T \cdot \bar{x}_2} = \left([1 \quad -1 \quad 1] \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} \right)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{3}$$

$$\bar{e}_2 = \frac{\bar{x}_2}{\|\bar{x}_2\|} = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$c) \quad \bar{y} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$$
$$\bar{y}_1 \quad \bar{y}_2 = ?$$

$$\langle \bar{y}, \bar{e}_1 \rangle = [3 \quad -2 \quad 1] \begin{bmatrix} \frac{-3}{\sqrt{14}} \\ \frac{-1}{\sqrt{14}} \\ \frac{2}{\sqrt{14}} \end{bmatrix} = \frac{-5}{\sqrt{14}}$$

$$\langle \bar{y}, \bar{e}_2 \rangle = [3 \quad -2 \quad 1] \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{-1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$$



$$\bar{y} = \frac{-5}{\sqrt{14}}\bar{e}_1 + 2\sqrt{3}\bar{e}_2$$

$$3) \ A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 9 \\ 1 & 4 & 7 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

a) without pivoting $\rightarrow L = ?$

$$\frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{1}{2}, \quad \frac{a_{31}}{a_{11}} = \frac{3}{2}$$

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{-1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{-3}{2} & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 9 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{-11}{2} & \frac{-25}{2} \end{bmatrix} \quad \leftarrow \frac{a_{32}}{a_{22}} = \frac{\frac{-11}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{-11}{3}$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{11}{3} & 1 \end{bmatrix} \quad A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 9 \\ 0 & \frac{3}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & \frac{-10}{3} \end{bmatrix} \quad L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & \frac{-11}{3} & 1 \end{bmatrix} \checkmark$$

b) pivoting $\rightarrow E_2 = ?$

$$|a_{31}| > |a_{11}| \rightarrow S_3 \leftrightarrow S_1$$

$$P_{13} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A_1 = P_{13}A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 9 \end{bmatrix} \quad \frac{a_{31}}{a_{11}} = \frac{2}{3} \quad E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{-2}{3} & 0 & 1 \end{bmatrix} \checkmark$$