

学而思物理

高二物理竞赛教程



目录

图例	ix
表例	xi
1 普通物理学概论	1
阅读本书前需要明白的资料...	
1.1 范畴与方法论	1
1.2 编排与客制化	2
1.3 预备知识	3
I 力学	7
2 运动学	9
认识与描述物质的世界...	
2.1 时空与物质	9
2.2 运动的描述	13
2.3 参考系变换	14
2.4 运动的牵连	15
3 动力学	19
从牛顿力学的视角来看世界的规律...	
3.1 牛顿定律	20
3.2 动量定律	21
3.3 角动量定律	22
3.4 能量定律	23
3.5 动力学问题求解	24
3.6 碰撞	25
4 静力学	29
矢量力学的局限, 分析力学的预备...	
4.1 约束	30
4.2 力系的简化	31
4.3 平衡问题求解 I	32
4.4 平衡问题求解 II	33
4.5 * 分析力学基础	34
4.6 稳定性问题	35
5 简谐振动	39
串连几百年物理学发展的谐振子模型的经典力学讨论...	
5.1 谐振子	39
5.2 简谐振动的拓广	41
5.3 简单的多自由度小振动	42
	iii

5.4	* 摄动理论	43
5.5	* 可数无穷自由度情况	44
6	万有引力	47
	探索宇宙与星辰运动的奥妙...	
6.1	万有引力定律	47
6.2	有心力问题	48
6.3	开普勒问题	49
6.4	* 潮汐	50
7	刚体	53
	质点概念修改为质元, 建立新的理想模型: 讨论刚体的动力学...	
7.1	刚体的物理描述	53
7.2	刚体的平面平行运动	54
7.3	* 刚体的空间运动	55
8	* 弹性体	59
	当连续介质的内相互作用力正比于其形变...	
8.1	弹性体的物理描述	59
8.2	弹性模型	61
8.3	弹性波	62
9	流体	65
	当连续介质不再具有恢复形变的能力...	
9.1	流体的物理描述	65
9.2	定常流体动力学	67
9.3	黏滞流体动力学	68
9.4	* 流体中的波	69
9.5	* 波的傅里叶分析	70
II	热学	73
10	热力学第一定律	75
	宏观体系与它的能量守恒...	
10.1	热力学系统的状态	76
10.2	热力学第一定律	77
10.3	理想气体的过程	78
10.4	常见气体模型	79
11	热力学第二定律	83
	破镜难重圆, 自然界写下如是之深刻规律...	
11.1	循环过程	84
11.2	理想气体的熵	85
11.3	热力学第二定律	86
11.4	熵的计算	87
11.5	* 热力学函数及其特性	88

12 固体与液体性质	91
面对复杂多体问题, 我们唯象地描述背后的物理...	
12.1 固体晶格论	92
12.2 * 固体电子论	93
12.3 * 液体的物态性质	94
12.4 液体的表面性质	95
12.5 * 其他物态的性质	96
13 相与相变	99
就像雪山上植被的分壤, 宏观性质迥异的物质可以共存与转化...	
13.1 相平衡	99
13.2 相变	101
13.3 * 朗道相变理论	102
14 统计物理概述	105
好的数学工具让还原论发挥其强大的威力...	
14.1 概率统计, 信息论与随机过程	106
14.2 统计假设	107
14.3 麦克斯韦分布律	108
14.4 麦克斯韦-玻尔兹曼统计	109
14.5 * 其他物理统计模型	110
III 电磁学	113
15 静电学	115
电荷阴阳激荡, 时空激起涟漪, 我们称之为场...	
15.1 电荷与电场	116
15.2 两个定律与电势	117
15.3 静电能	118
15.4 电荷体系	119
16 导体与介质	123
静电学在很大程度上决定物质微观层面的结合, 从而影响宏观属性...	
16.1 导体与静电平衡	124
16.2 电像法	125
16.3 电介质	126
16.4 再论静电能	127
17 稳恒电流	131
当电荷受到驱动力而开始在介质中定向漂移...	
17.1 稳恒电流描述与形成	132
17.2 电路与电路方程	133
17.3 电路分析基础	134
17.4 电路分析方法	135
17.5 电阻等效方法	136
17.6 半导体器件	137

18 静磁场	141
当磁现象逐渐开始用电现象的术语来解释...	
18.1 电流与磁场	142
18.2 两个定律与电势	143
18.3 电流体系	144
18.4 磁介质与磁能	145
19 电磁感应	149
电磁之间的联系隐藏于黑暗中, 电磁感应将光芒照亮于其发展的道路...	
19.1 磁生电	149
19.2 电磁感应与电路	151
19.3 自感与互感	152
19.4 * 再论标势与矢势	153
20 麦克斯韦方程组	157
集齐电磁理论拼图的最后一块, 经典电磁学发展到了其最高峰...	
20.1 电生磁	157
20.2 电磁波解	159
20.3 * 电磁波的辐射与吸收	160
20.4 电磁单位制	161
21 交流电路	165
如果电磁波是河水, 那么导引其能量流动的河道就是交流电路...	
21.1 交流电网	166
21.2 交流元件特性	167
21.3 交流电路解法	168
21.4 常见电路	169
IV 光学	173
22 光波与光线	175
光的确是电磁波, 光线模型是历史遗产, 两者不是不可调和...	
22.1 波动光学引论	176
22.2 界面光学	177
22.3 光线方程	178
22.4 从费马到费曼	179
23 光学成像	183
物光必将经过像, 物理上堪称完美, 数学上也不平凡...	
23.1 傍轴光成像	183
23.3 理想成像系统	186
23.3 理想成像系统	186
24 光学仪器	189
聚焦能量, 还原信息, 成像仪器, 信号处理, 服务于人...	
24.1 光度学	189
24.2 光阑	191
24.3 助视仪器	192
24.4 观像仪器	193

25 光的干涉	197
万千花样, 只源于两相干光之前的巧遇...	
25.1 干涉引论	197
25.2 分波面干涉	199
25.3 分振幅干涉	200
25.4 相干性	201
26 光的衍射	205
波前中蕴藏着光学信息, 傅里叶分析恰能呈现背后规律...	
26.1 多光束干涉	205
26.2 衍射引论	207
26.3 * 傅里叶光学	208
27 物理光学	211
历史螺旋上升, 智慧历久弥新, 真理越辩越明...	
27.1 光的本性	212
27.2 * 光与物质相互作用	213
27.3 发射, 传播与吸收的唯象描述	214
27.4 经典色散理论	215
V 近代物理	219
28 相对论	221
基于对称的理论, 极致简约的理论, 忠于现实的理论...	
28.1 时空与运动	221
28.2 相互作用	223
28.3 连续体	224
28.4 广义相对论简介	225
29 量子论	229
颠覆经典图像, 重建量子对应, 将上下而求索...	
29.1 光的量子性	229
29.2 粒子波动性	231
29.3 * 量子力学初步	232
30 尺度物理学	235
兼备龙象之力, 燕雀之巧, 似一条巨蟒衔住了其尾巴...	
30.1 基本粒子与相互作用	236
30.2 核物理	237
30.3 * 原子与分子	238
30.4 * 介观物理	239
30.5 宇宙学	240
参考文献	243



图例

2.1 三种坐标	10
----------------	----



表例





第 I 部分

力学



2

运动学

认识与描述物质的世界...

章节目录

2.1	时空与物质	9
2.1.1	时空观	9
2.1.2	物质观	11
2.1.3	世界观	11

插图

2.1 时空与物质

物理学, 从刚开始成为实验性的科学的伽利略时期开始, 到近半个世纪年来理论物理学家对额外维度的探讨, 都给予了时空(spacetime) 最核心的地位. 牛顿的理论, 分析力学, 经典场论, 相对论这些理论最基本的图像都是时空与物质(matter) 的分立性. 时空是装备了一个能体现出物理物理意义的度量(metric) 的 3+1 维对象. 数学上有一套严格的说法, 把这种连续, 光滑的四维对象称为伪黎曼流形(pseudo-Riemannian manifold). 而物质则是在每个时空点处的某种结构. 经典理论下, 这种结构不外乎用标量(scalar), 矢量(vector) 或是更高级的张量(tensor) 来描述. 最后, 这些量的变化就体现出了形形色色的运动(motion). 运动学(kinematics) 的主要任务就是描写物质的运动, 而对于物质运动背后体现出来的定律(law), 我们仅做笼统的较浅的讨论, 更加深入地看, 不同物质运动符合的不同定律往往又需要因为时空的结构或相互作用的内禀属性而具有普遍的对称性(symmetry), 对称性是“规律之规律”, 它对物理理论在何种程度上起到决定作用将是超出本书范围的更高层次的课题, 将伴随读者对物理学学习的生涯.

2.1.1 时空观

牛顿力学理论体系基于伽利略时空观(Galilean spacetime picture), 也就是绝对时空观(absolute spacetime picture). 在这里空间是三维的平直空间. 设想一个人站在该空间的某个空间点, 他的胸前, 头顶和右手平举的三个方向就是相互垂直的方向. 如果以自己的臂长为标准长度, 他能够定义空间中每两个点之间的空间间隔. 事实上, 这个人能够以一种正确的方式为每个空间点定义一个坐标, 那么所有三维空间点的集合与任意两个点之间的距离为:

$$A(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \quad ; \quad x, y, z \in \mathbb{R}$$

$$A(x_1, y_1, z_1), B(x_2, y_2, z_2) : l^2 = \overline{AB}^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2$$


因为空间不同于时间, 我们为以上数字赋予特殊的物理含义, 也就是加上**量纲**(dimension). 如果两点坐标为 $(0, 0, 0)$ 和 $(1, 1, 1)$, 那么 $l = \sqrt{3}\text{m}$, 而不是 $l = \sqrt{3}$. 其单位 m 一方面表示了这个物理量的属性, 另一方面指定了某个实际物理体系确定下来的固有长度大小. 现行的 (2018 年 1 月 1 日, 下文同) 国际单位制对 1m 的定义如下¹:

1m 是光在 $\frac{1}{299792458}\text{s}$ 内在真空中行进的距离.

这就是我们的**三维平直空间**(3-dimensional flat space). 注意空间点具有物理实际意义, 它可以脱离坐标系而单独存在. 事实上坐标系的原点可以建立在空间中的任意点处, 朝向也可以是任意方向, 两个空间点之间的距离 l 不会依赖于坐标系的选取, 但两个点的坐标会因坐标系不同而改变. 如果我们选取的坐标系总是下述使得两个相距很近的点之间的微元距离公式成立:

$$dl^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$

那么建立的坐标系就是一个**笛卡尔坐标系**(Cartesian coordinate system), 即**空间直角坐标系**(3D orthogonal coordinate system). 但是以空间直角坐标系为基础, 我们又经常建立**球坐标**(spherical coordinate) 和**柱坐标**(cylindrical coordinate) 系统. 通常取 x 轴为**幅轴**(azimuth axis), 点在 $x-y$ 平面上的投影与原点的连线相对 x 轴转过的角度为 φ , 即**幅角**(azimuth angle). 而 z 轴为**极轴**(polar axis), 而点与原点连线与极轴的夹角 θ 为**极角**(polar angle). 天文观测用球坐标就很方便, 它是以描述的空间点到原点之间的距离 r , 也称**矢径**(radius), 和两个描述角位置的极角幅角来构成三个坐标 (r, θ, φ) 的. 而理论物理里也常用到的柱坐标是以 (ρ, φ, z) 为描述空间点的坐标, ρ 是空间点到 z 轴的距离.



之后经常会说到各种对称性, 在本系列教材中我们采取如下说法: **球对称**(spherical symmetric) 仅代表某个函数 $f(r, \theta, \varphi)$ 与 φ 无关. 而**柱对称**(cylindrical symmetric) 代表的是 $f(\rho, \varphi, z)$ 与 z 无关. 与 φ 和 θ 都无关的 $f(r, \theta, \varphi) = f(r, \forall \theta, \forall \varphi)$ 被称为**各向同性**(isotropic). 最后**中心对称**(centrosymmetric) 是一个很弱的对称性, 它仅代表函数在**中心反演**(space inversion) 下的对称性:

$$f(x, y, z) = f(-x, -y, -z)$$

绝对时空观中的**时间**是**坐标**完全与空间独立的属性. 任意一个坐标点处都有时间轴, 而任意一个时刻都有一个三维空间切片. 事实上, 我们的时空是一个 $3+1$ 维的结构, 合理地选取坐标后, 实际上可以把时空结构写成四维坐标:

$$A(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \quad ; \quad x, y, z, t \in \mathbb{R}$$

时间是一个新的量纲, 其国际单位制对 1s 的定义为:

1s 是 ^{133}Cs 原子基态的两个超精细能级之间跃迁所对应的辐射周期时长的 9192631770 倍.

¹一方面, 它依赖于狭义相对论的正确性, 目前极少理论物理工作者会质疑它. 另一方面, 应该要先定义下文的 1s , 再来定义 1m .

而对于任意两个时空点, 存在绝对的时间间隔, 也就是可以找到两个事件的绝对时间差:

$$\tau = |t_2 - t_1|$$

但空间距离却具有相对性. 故我们要求在同一时刻的空间切片上定义空间的度量:

$$t_1 = t_2 : \quad l = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

这种时空结构被叫做**牛顿-嘉当几何**(Newton-Cartan geometry). 在牛顿-嘉当几何中书写的物理规律应当具有时空平移对称性, 空间旋转对称性和**伽利略变换**(Galilean transformation) 的对称性, 此后我们将进一步阐述. 时空平移是指将原来发生的物理过程随时空坐标进行如下改变:

$$\left\{ \begin{array}{lcl} t & \longrightarrow & t + \Delta t \\ x & \longrightarrow & x + \Delta x \\ y & \longrightarrow & y + \Delta y \\ z & \longrightarrow & z + \Delta z \end{array} \right.$$

不同于绝对时空观中时间与空间成为相互独立的量纲的特点, 狭义相对论改变了对基本物理量的看法. 狭义相对论把时空看成为可以相互转化的不可分割的新的 3+1 维整体, 同时性已然破缺. 两个时空点之间无法定义绝对的时间间隔. 在**相对论时空观**(relativistic spacetime picture) 下, 时间和空间可以用同一把尺子去丈量: 这是由于光速的不变性:

$$c = 299792458\text{m/s}$$

而量出来的长度叫做**时空间隔**(spacetime interval):

$$ds^2 = c^2 dt^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

这赋予时空以截然不同的结构, 最关键的一点是, 时间的绝对性被取消了, 不同事件发生时间先后的比较不总是可行, 相对论的有限速度因果律在这里取代了经典观点的时序因果律. 我们将在电磁学理论的最后介绍相对论理论.

2.1.2 物质观

\nobreak

2.1.3 世界观

第 II 部分

热学



第 III 部分

电磁学





第 IV 部分

光学





第 V 部分

近代物理



参考文献