

Pathfinder

Author: Mathias

Time Limit	2s
Memory Limit	256 MB



Pathfinder sedang bertempur di arena Kings Canyon. Di depannya, terdapat N banyak gedung yang sejajar dinomori 1 sampai N . Untuk setiap gedung i , terdapat *loot* yang dinilai sebesar A_i .

Pathfinder memiliki sebuah alat hebat yaitu *grappling hook* dengan panjang K yang dapat membantunya dalam mobilisasi. Dalam satu gerakan, Pathfinder dapat berpindah dari suatu gedung i ke gedung j di mana, $i + 1 \leq j \leq \min(N, i + K)$.

Jika Pathfinder harus mulai dari gedung 1 dan berakhir di gedung N , berapa jumlah dari nilai *loot* maksimal yang ia bisa ambil?

Format Masukan

Baris pertama terdiri dari satu bilangan bulat T ($1 \leq T \leq 10^4$) – banyaknya uji coba.

Baris pertama untuk setiap uji coba terdiri dari dua bilangan N dan K ($1 \leq N, K \leq 2 \cdot 10^5$).

Baris kedua untuk setiap uji coba terdiri dari N bilangan $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($-10^4 \leq A_i \leq 10^4$).

Dipastikan bahwa jumlah dari N dari semua uji coba tidak melebihi $2 \cdot 10^5$.

Format Keluaran

Untuk setiap uji coba, keluarkanlah jumlah dari nilai *loot* maksimal yang mungkin bisa diambil.

Contoh Masukan

4
6 2
1 -1 -2 4 -7 3
6 3
10 -5 -2 4 0 3
8 2
1 -5 -20 4 -1 3 -6 -3
5 2
1 -2 -3 -2 1

Contoh Keluaran

7
17
0
-1

Penjelasan untuk contoh masukan/keluaran #1

Nomor gedung yang dikunjungi Pathfinder adalah sebagai berikut $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6$. Sehingga jumlah dari nilai lootnya adalah $A_1 + A_2 + A_4 + A_6 = 1 + (-1) + 4 + 3 = 7$.

Penjelasan untuk contoh masukan/keluaran #2

Nomor gedung yang dikunjungi Pathfinder adalah sebagai berikut $1 \rightarrow 4 \rightarrow 6$. Sehingga jumlah dari nilai lootnya adalah $A_1 + A_4 + A_6 = 10 + 4 + 3 = 17$.

Pathfinder

Author: Mathias

Time Limit	2s
Memory Limit	256 MB



Pathfinder is battling in the Kings Canyon arena. In front of him, there are N buildings arranged in a line and numbered from 1 to N . For each building i , there is loot valued A_i .

Pathfinder has a powerful tool called a grappling hook with length K , which helps him move quickly between buildings. In a single move, Pathfinder can move from building i to building j where $i + 1 \leq j \leq \min(N, i + K)$.

If Pathfinder must start from building 1 and end at building N , what is the maximum total loot value he can collect?

Input Format

The first line contains a single integer T ($1 \leq T \leq 10^4$) – the number of test cases.

The first line for each test case contains two integers N and K ($1 \leq N, K \leq 2 \cdot 10^5$).

The second line for each test case contains N bilangan $A_1, A_2, \dots, A_N$ ($-10^4 \leq A_i \leq 10^4$).

It is guaranteed that the sum of all N across all test cases does not exceed $2 \cdot 10^5$.

Output Format

For each test case, output the maximum total loot value Pathfinder can obtain.

Sample Input

4
6 2
1 -1 -2 4 -7 3
6 3
10 -5 -2 4 0 3
8 2
1 -5 -20 4 -1 3 -6 -3
5 2
1 -2 -3 -2 1

Sample Output

7
17
0
-1

Explanation for sample input/output #1

The buildings visited by Pathfinder are $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6$. Thus, the total value is $A_1 + A_2 + A_4 + A_6 = 1 + (-1) + 4 + 3 = 7$.

Explanation for sample input/output #2

The buildings visited by Pathfinder are $1 \rightarrow 4 \rightarrow 6$. Thus, the total value is $A_1 + A_4 + A_6 = 10 + 4 + 3 = 17$.