Если векторы \overline{a} и \overline{b} заданы в ортонормированном базисе, то можно вычислить векторное произведение через координаты этих векторов, используя мнемонический определитель:

$$egin{aligned} [\overline{a},\overline{b}] &= egin{aligned} \overline{i} & \overline{j} & \overline{k} \ a_1 & a_2 & a_3 \ b_1 & b_2 & b_3 \end{aligned} = \ &= \overline{i} egin{aligned} a_2 & a_3 \ b_2 & b_3 \end{aligned} - \overline{j} egin{aligned} a_1 & a_3 \ b_1 & b_3 \end{aligned} + \overline{k} egin{aligned} a_1 & a_2 \ b_1 & b_2 \end{aligned} = \ &= \overline{i} (a_2b_3 - a_3b_2) - \overline{j} (a_1b_3 - a_3b_1) + \overline{k} (a_1b_2 - a_2b_1) = \ &= (a_2b_3 - a_3b_2; a_3b_1 - a_1b_3; a_1b_2 - a_2b_1) \end{aligned}$$

Соответственно, площадь параллелограмма - длина полученного вектора из векторного произведения:

$$|S_{nap} = |[\overline{a}, \overline{b}]| = \sqrt{(a_2b_3 - a_3b_2)^2 + (a_3b_1 - a_1b_3)^2 + (a_1b_2 - a_2b_1)^2}$$

Определитель выше можно считать и методом треугольника, но кажется способ через миноры куда более наглядный.

Заметим, что если векторы даны в двухмерном пространстве (и следовательно $a_3=b_3=0$), то векторное произведение сведется к

$$[\overline{a},\overline{b}]=\overline{k}egin{bmatrix} a_1 & a_2 \ b_1 & b_2 \end{bmatrix}=\overline{k}(a_1b_2-a_2b_1)$$

И площадь параллелограмма, образованного этими двумя векторами будет равна $|a_1b_2-a_2b_1|$ - определителю, состоящего из координат этих двух векторов.

Пример задачи

Условие: найдите площадь параллелограмма, тремя вершинами которого являются точки $A_1(5;3;8), A_2(-2;7;3); A_3(9;2;1).$

Решение: для этого найдем длину результирующего вектора из векторного произведения двух векторов, образованных этими точками.

$$egin{aligned} \overline{a} &= A_2 - A_1 = (-7;4;-5) \ \overline{b} &= A_3 - A_1 = (4;-1;-7) \end{aligned}$$

$$egin{align} [\overline{a},\overline{b}] = egin{array}{ccc} \overline{i} & \overline{j} & \overline{k} \ -7 & 4 & -5 \ 4 & -1 & -7 \ \end{array} = \ \overline{i}(-28-5) - \overline{j}(49+20) + \overline{k}(7-16) = \ & (-33;-69;-9) \end{array}$$

Теперь найдем длину вектора:

$$|[\overline{a},\overline{b}]| = \sqrt{(-33)^2 + (-69)^2 + (-9)^2} = \sqrt{5931} = 3\sqrt{659}$$

Это и будет площадь параллелограмма. Если бы мы хотели найти площадь треугольника образованного этими тремя вершинами, то тогда мы эту площадь просто делим на два.