

2.

$$(x, y) \leftrightarrow (u, v)$$

$$X = \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}, X' = \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} \quad H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & h_{13} \\ h_{21} & h_{22} & h_{23} \\ h_{31} & h_{32} & h_{33} \end{bmatrix}$$

$$X' \sim HX$$

$$X' = \lambda HX$$

Para eliminar λ

$$X'X(HX) = 0$$

Entonces

$$HX = \begin{bmatrix} h_{11}x + h_{12}y + h_{13} \\ h_{21}x + h_{22}y + h_{23} \\ h_{31}x + h_{32}y + h_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} \cdot A_i h = 0$$

La condición

$$X'X \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix} = 0$$

$$xh_{11} + yh_{12} + h_{13} - u(xh_{31} + yh_{32} + h_{33}) = 0$$

$$xh_{21} + yh_{22} + h_{23} - u(xh_{31} + yh_{32} + h_{33}) = 0$$

$$h = [h_{11} \ h_{12} \ h_{13} \ h_{21} \ h_{22} \ h_{23} \ h_{31} \ h_{32} \ h_{33}]^T$$

$$A_i = \begin{bmatrix} x & y & 1 & 0 & 0 & 0 & -ux & -uy & -u \\ 0 & 0 & 0 & x & y & 1 & -vx & -vy & -v \end{bmatrix}$$

En este caso $Ah = 0$
Con $A \in \mathbb{R}^{2n \times 9}$

No se puede invertir porque A no es cuadrada
 $n > 4$, entonces $2n > 9$

No existe A^{-1}

$\lambda Ah \neq 0$

No existe un h que satisfaga el sistema

$$\min_{h \neq 0} \|Ah\|$$

El error mínimo compatible con una homografía bajo ruido

- Mide qué tan consistentes son las correspondencias.
- Cuánto se alejan de un modelo proyectivo perfecto.
- Qué tan bien una sola homografía explica los datos.