

Turma: EM IME-ITA 2 Unidade: Tijuca II Professor: Gabriel Braun Data: Abril de 2023 Instruções: Nota: • Faça sua avaliação à caneta. • Resoluções a lápis não serão corrigidas. • Questões discursivas sem desenvolvimento não serão consideradas. • Não serão fornecidas folhas para rascunho.

QUÍMICA

Dados

- Constante de Avogadro, $N_{\rm A} = 6.02 \cdot 10^{23} \, {\rm mol}^{-1}$
- Carga elementar, $e = 1.6 \cdot 10^{-19} \,\mathrm{C}$
- Constante de Planck, $h = 6.6 \cdot 10^{-34} \,\mathrm{m}^2 \,\mathrm{kg} \,\mathrm{s}^{-1}$
- Constante de autoionização da água, $K_{\rm w}=1\cdot 10^{-14}$
- Constante de Faraday, $F = 96500 \,\mathrm{C} \,\mathrm{mol}^{-1}$
- Constante dos gases, $R = 8.31 \,\mathrm{J \, K^{-1} \, mol^{-1}}$
- Constante de Rydberg, $\mathcal{R} = 1.1 \cdot 10^7 \, \text{m}^{-1}$
- Velocidade da luz no vácuo, $c = 3 \cdot 10^8 \,\mathrm{m\,s^{-1}}$

Definições

- Composição do ar atmosférico: 79% N_2 e 21% O_2

Aproximações Numéricas

- $\sqrt{2} = 1.4$

- $\sqrt{3} = 1.7$ $\sqrt{5} = 2.2$ $\log 2 = 0.3$ $\log 3 = 0.5$ $\ln 10 = 2.3$

Tabela Periódica

1	6	7	8	11	12	16	17
Н	С	N	0	Na	Mg	S	Cl
1,01	12,01	14,01	16,00	22,99	24,31	32,06	35,45



Quando $0.36\,\mathrm{g}$ de pentano, C_5H_{12} , queimam em excesso de oxigênio em um calorímetro com capacidade calorífica $220\,\mathrm{J\,K^{-1}}$, sob pressão constante, a temperatura do calorímetro aumenta em $80\,\mathrm{^{\circ}C}$.

Determine a entalpia de combustão do pentano.

Questão 2

Considere as reações:

$$\begin{array}{ll} 2\,\mathrm{Al}(\mathrm{s}) + 6\,\mathrm{HBr}(\mathrm{aq}) &\longrightarrow 2\,\mathrm{AlBr}_3(\mathrm{aq}) + 3\,\mathrm{H}_2(\mathrm{g}) & \Delta H_\mathrm{r}^\circ = -1060\,\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}} \\ & \mathrm{HBr}(\mathrm{g}) &\longrightarrow \mathrm{HBr}(\mathrm{aq}) & \Delta H_\mathrm{r}^\circ = -81\,\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}} \\ & \mathrm{H}_2(\mathrm{g}) + \mathrm{Br}_2(\mathrm{l}) &\longrightarrow 2\,\mathrm{HBr}(\mathrm{g}) & \Delta H_\mathrm{r}^\circ = -73\,\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}} \\ & \mathrm{AlBr}_3(\mathrm{s}) &\longrightarrow \mathrm{AlBr}_3(\mathrm{aq}) & \Delta H_\mathrm{r}^\circ = -368\,\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}} \end{array}$$

 $\begin{tabular}{ll} \bf Determine \ a \ entalpia \ de \ formação \ do \ brometo \ de \ alumínio \ anidro, \ AlBr_3. \end{tabular}$



 $\bf Determine$ a entalpia padrão de combustão da ureia, $\rm CO(NH_2)_2, \, em \,\, 25\,^{\circ}C.$

Dados em 25 °C	$\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}\left(\mathrm{l}\right)$	$CO_2(g)$	$CO(NH_2)_2(s)$
Entalpia padrão de formação, $\Delta H_{\mathrm{f}}^{\circ}/\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}}$	-286	-394	-334

Questão 4

Considere as reações.

1.
$$H_2(g) + I_2(s) \longrightarrow 2 HI(g)$$

$$2. \ 2\operatorname{Ag}(s) + \operatorname{Br}_2(l) \longrightarrow 2\operatorname{AgBr}(s)$$

3.
$$O_2(g) \longrightarrow O_2(aq)$$

4.
$$2 \operatorname{NO}_2(g) \longrightarrow \operatorname{N}_2\operatorname{O}_4(g)$$

 ${\bf Determine}$ o sinal da entropia padrão de cada reação.



Considere a reação de decomposição do carbonato de magnésio.

$$MgCO_3(s) \longrightarrow MgO(s) + CO_2(g)$$

Suponha que $\Delta H_{\rm r}^{\circ}$ e $\Delta S_{\rm r}^{\circ}$ são independentes da temperatura.

Determine a faixa de temperatura em que a decomposição do carbonato de magnésio é espontânea.

Dados em $25^{\circ}\mathrm{C}$	$MgCO_3(s)$	$CO_2(g)$	MgO(s)
Entalpia padrão de formação, $\Delta H_{\mathrm{f}}^{\circ}/\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}}$	-1100	-394	-602
Entropia padrão molar, $S_{\rm m}^{\circ}/\frac{\rm J}{\rm Kmol}$	65,7	214	26,9

Questão 6

Considere os compostos:

- $1.\ \ 2,2,4\text{-trimetil pentano}$
- 2. 1,2,3,4-tetrametilcicloeptano
- 3. 1-isopropil-2-metilciclobutano.

Apresente a estrutura de cada composto.



Considere os compostos:

- $1. \ \, 3\hbox{-isopropil-}2, 4\hbox{-dimetil pent-}2\hbox{-eno}$
- 2. 4-etil-2-metilex-2-eno
- 3. 1,2-dimetilciclobuteno

Apresente a estrutura de cada composto.

Questão 8

Considere os compostos.

 ${\bf Identifique}$ as funções orgânicas de cada composto.



O estradiol é o principal hormônio sexual feminino, importante na regulação do ciclo estral e do ciclo menstrual.

Apresente a fórmula molecular do estradiol.

Questão 10

O ácido ascórbico ou vitamina C é uma molécula com papel importante em várias reações bioquímicas celulares.

Classifique todos os átomos de carbono da vitamina C quanto a sua hibridização.