



# CICLO ITA 1 - DISCURSIVO

TURMA IME-ITA

2022



## MATEMÁTICA

### 1ª QUESTÃO

Calcular a soma:

$$\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \cdots + \frac{2n-1}{2^n}.$$

#### Gabarito

Seja  $S$  a soma designada, portanto:

$$2S = 1 + \frac{3}{2} + \frac{5}{2^2} + \cdots + \frac{2n-1}{2^{n-1}}.$$

Ao subtrair a expressão obtida da inicial:

$$2S - S = 1 + \frac{2}{2} + \frac{2}{2^2} + \cdots + \frac{2}{2^{n-1}} - \frac{2n-1}{2^n}$$

$$S = 1 - \frac{2n-1}{2^n} + 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-2}}$$

$$S = 1 - \frac{2n-1}{2^n} + \frac{\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}\right)}{1 - \frac{1}{2}}$$

$$S = 3 - \frac{2n+3}{2^n}.$$

### 2ª QUESTÃO

Dê o conjunto solução da equação:

$$\frac{1 - \operatorname{tg}(x)}{1 + \operatorname{tg}(x)} = 1 + \operatorname{sen}(2x).$$

#### Gabarito

Solução 01:

Inicialmente, observe que o domínio de validade é dado por:

$$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$$

e

$$x \neq -\frac{\pi}{4} + k\pi.$$

Ao substituir as tangentes em função dos senos e cossenos, ao fazer o mmc, obtemos:

$$\operatorname{sen}(x) (3 + \operatorname{sen}(2x) + \cos(2x)) = 0.$$

Como o segundo fator nunca poderá ser nulo, temos que:

$$\operatorname{sen}(x) = 0 \rightarrow \boxed{x = k\pi}.$$

Solução 02:

Parametrizando o seno pela tangente do arco metade:

$$\operatorname{sen}(2x) = \frac{2\tan(x)}{1 + \tan^2(x)}$$

Substituindo na equação do enunciado:

$$\frac{1 - \tan(x)}{1 + \tan(x)} = 1 + \frac{2\tan(x)}{1 + \tan^2(x)}$$

$$\frac{1 - \tan(x)}{1 + \tan(x)} = \frac{1 + 2\tan(x) + \tan^2(x)}{1 + \tan^2(x)}$$

$$\frac{1 - \tan(x)}{1 + \tan(x)} = \frac{(1 + \tan(x))^2}{1 + \tan^2(x)}$$

$$(1 \tan x) (1 + \tan^2 x) = (1 + \tan x)^3$$

$$2 \tan^3 x + 2 \tan^2 x + 4 \tan x = 0$$

$$\tan^3 x + \tan^2 x + 2 \tan x = 0$$

Repare que  $\tan x = 0$  é solução

$$\tan x \cdot (\tan^2 x + \tan x + 2) = 0$$

Discriminante da equação  $\tan^2 x + \tan x + 2$

$$= 1^2 - 4 \cdot 2 \cdot 1 < 0$$

Logo, não haverá equação real para essa equação.

Portanto, a única solução será  $\tan x = 0$

$$\boxed{x = k\pi, \text{ com } k \in \mathbb{Z}}$$

### 3ª QUESTÃO

Determine todos os valores reais de  $x$  que satisfazem:

$$(x - 1)(x - 2)(x - 4)(x - 8) = 10x^2.$$

## Gabarito

Solução 1:

Reagrupando os fatores e efetuando as respectivas distributivas:

$$\begin{aligned}(x-1)(x-8)(x-2)(x-4) &= 10x^2 \\ (x^2-9x+8)(x^2-6x+8) &= 10x^2\end{aligned}$$

Uma vez que 0 não é uma solução da equação, ao dividir por  $x^2$ :

$$\left(x - 9 + \frac{8}{x}\right) \left(x - 6 + \frac{8}{x}\right) = 10.$$

Seja  $\left(x - 9 + \frac{8}{x}\right) = y$ , logo:

$$y(y+3) = 10 \rightarrow y = 2 \text{ ou } y = -5.$$

Ao retornar com a variável  $x$  original, nota-se que para  $y = -5$  não há soluções reais. Portanto:

$$\begin{aligned}x - 9 + \frac{8}{x} &= 2 \\ x^2 - 11x + 8 &= 0 \\ x &= \frac{11 \pm \sqrt{89}}{2}.\end{aligned}$$

Solução 2:

Vamos abrir o produto:

$$\begin{aligned}(x-1)(x-2)(x-4)(x-8) &= 10x^2 \\ (x^2-3x+2)(x^2-12x+32) &= 10x^2 \\ x^4 - 15x^3 + 60x^2 - 120x + 64 &= 0\end{aligned}$$

Lema de Gauss:

$$\begin{aligned}(x^2 + Ax + B)(x^2 + Cx + D) &= 0 \\ x^4 + (A+C)x^3 + (B+D+AC)x^2 + (AD+BC)x + BD &= 0\end{aligned}$$

Logo, teremos o sistema:

$$\begin{aligned}BD &= 64 \\ AD + BC &= -120 \\ B + D + AC &= 60 \\ A + C &= -15\end{aligned}$$

Resolvendo o sistema por tentativa, encontraremos como solução:

$$\boxed{A = -11} \quad \boxed{B = 8} \quad \boxed{C = -4} \quad \boxed{D = 8}$$

$$(x^2 - 11x + 8)(x^2 - 4x + 8)$$

O delta da equação de segundo grau da direita é negativo, então nos sobra analisar as raízes do polinômio da esquerda:

$$x = \frac{11 \pm \sqrt{121 - 32}}{2} \Rightarrow \boxed{x = \frac{11 \pm \sqrt{89}}{2}}$$

#### 4ª QUESTÃO

Seja  $P$  um ponto interior a um triângulo equilátero cujas distâncias aos respectivos lados medem  $x$ ,  $y$  e  $z$ . Determine a soma  $x + y + z$  em função do lado  $l$  do triângulo.

##### Gabarito

Considere os segmentos que unem o ponto  $P$  interior a cada um dos três vértices  $A$ ,  $B$  e  $C$  do triângulo equilátero dado. Dessa forma são formados três triângulos interiores, de modo que a soma das áreas dos três equivale à área de  $ABC$ :

$$\frac{lx}{2} + \frac{ly}{2} + \frac{lz}{2} = \frac{lh}{2}, \text{ onde } h \text{ é a altura do triângulo } ABC \text{ dado.}$$

$$\text{Portanto } x + y + z = h \rightarrow \boxed{x + y + z = \frac{l\sqrt{3}}{2}}.$$

#### 5ª QUESTÃO

Sabendo que a reta  $12x + 5y = 60$  forma um triângulo com os eixos coordenados, calcule a soma das alturas de tal triângulo.

##### Gabarito

Determinando as interseções com cada um dos eixos:

$$x = 0 \rightarrow y = 12 \text{ e}$$

$$y = 0 \rightarrow x = 5.$$

Notamos que se trata de um triângulo pitagórico 5, 12 e 13, em que duas das alturas são os próprios catetos.

A outra altura é tal que:  $5 \cdot 12 = 13 \cdot h$

$$h = \frac{60}{13}$$

Logo, a resposta é:

$$\frac{60}{13} + 12 + 5 = \boxed{\frac{281}{13}}$$

#### 6ª QUESTÃO


Quantos pares ordenados  $(x, y)$  de números reais satisfazem simultaneamente as equações:

$$x + 3y = 3 \text{ e}$$

$$||x| - |y|| = 1 ?$$

## Gabarito

Sabendo que a expressão  $||x| - |y|| = 1$  assume os valores representados por  $x + y = 1$ ,  $x - y = 1$ ,  $-x + y = 1$ ,  $-x - y = 1$  e  $x + y = -1$ ,  $x - y = -1$ ,  $-x + y = -1$ ,  $-x - y = -1$ , com suas respectivas restrições, podemos determinar as interseções entre essas retas e  $x + 3y = 3$ . Obtemos, de acordo com as condições e restrições de cada uma, apenas  $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ ,  $(0, 1)$ ,  $(-3, 2)$ . São, portanto, 3 possíveis pares ordenados. Graficamente:



## 7ª QUESTÃO

Considere um triângulo  $ABC$ , acutângulo, cujos lados medem  $AB = x - 7$ ,  $BC = x$  e  $AC = x + 2$ . Se  $x \in \mathbb{N} / 0 < x < 20$ , determine todos os possíveis valores de  $x$ .

## Gabarito

Sendo o triângulo acutângulo e  $x$  um valor inteiro, basta garantir que:

$$(x + 2)^2 < x^2 + (x - 7)^2 \rightarrow x^2 - 18x + 45 > 0.$$

O intervalo exterior às raízes é dado por:  $x < 3$  ou  $x > 15$ . De acordo com as restrições do enunciado, a interseção dos possíveis valores para  $x$  é dada por: 1, 2, 16, 17, 18 e 19. No entanto, além disso, os lados devem possuir medidas positivas e as condições de existência do triângulo (desigualdades triangulares) devem ser satisfeitas. Após tais verificações, os únicos valores possíveis restantes são: 16, 17, 18 e 19.

## 8ª QUESTÃO

Quantos inteiros não-negativos podem ser escritos da forma:

$$a_7 3^7 + a_6 3^6 + \cdots + a_1 3^1 + a_0 3^0,$$

com  $a_i \in \{-1, 0, 1\}$  para  $0 \leq i \leq 7$ ?

## Gabarito

Solução 1: Observe que, se  $a_7 = -1$ , então o resultado da soma será negativo independente dos outros coeficientes. Portanto, temos que  $a_7 = 1$  ou  $a_7 = 0$ . Para  $a_7 = 1$ , os outros coeficientes podem assumir quaisquer valores que a soma será positiva, havendo portanto  $3^7$  possibilidades. Já para  $a_7 = 0$ , de forma análoga, o coeficiente  $a_6$  passará a ser o predominante e terá apenas 1 ou 0 como possíveis valores. Dessa forma, o total de possibilidades para se obter um natural positivo é dado pela soma da PG:

$$3^7 + 3^6 + \dots + 3^1 + 3^0 = \frac{3^8 - 1}{2}.$$

Além disso, há o caso para todos os coeficientes nulos, resultando em:

$$\frac{3^8 - 1}{2} + 1 = \frac{3^8 + 1}{2} = \boxed{3281}.$$

Solução 2: Pela simetria do problema ( $-1$  e  $1$ ), a quantidade de números escritos dessa forma que são positivos é igual a quantidade de números negativos. Como temos 3 possibilidades para cada número, há  $3^8$  números, sendo 1 deles o número 0. Logo o pedido da questão é:

$$\frac{3^8 - 1}{2} + 1 = \frac{3^8 + 1}{2} = \boxed{3281}.$$

## 9ª QUESTÃO

Os comprimentos dos lados de um triângulo são os inteiros  $x - 1$ ,  $x$  e  $x + 1$ . Se o seu maior ângulo é o dobro do menor, calcule o valor de  $x$ .

## Gabarito

Solução 01:

Considere o triângulo  $ABC$  cujos lados são  $AB = x + 1$ ,  $BC = x$  e  $AC = x - 1$ . Dessa forma, como o maior ângulo está oposto ao maior lado, assim como o menor ao menor lado, temos que  $\hat{B} = \theta \rightarrow \hat{C} = 2\theta$ . Ao traçar a bissetriz  $CD$ , obtemos o triângulo  $BCD$  isósceles e o triângulo  $ACD$  semelhante ao  $ABC$ .

(i) Pela semelhança:

$$\frac{AD}{x - 1} = \frac{x - 1}{x + 1}$$
$$AD = \frac{(x - 1)^2}{x + 1}$$

(ii) Pelo TBI:

$$\frac{AD}{x - 1} = \frac{x + 1 - AD}{x}$$
$$AD = \frac{(x + 1)(x - 1)}{2x - 1}$$

Igualando, obtemos:

$$\frac{(x - 1)^2}{x + 1} = \frac{(x + 1)(x - 1)}{2x - 1} \rightarrow \boxed{x = 5}.$$

Solução 02:

Lei dos senos:

$$\frac{(x+1)}{\sin(2\theta)} = \frac{(x1)}{\sin(\theta)}$$

Lei dos cossenos:

$$(x1)^2 = (x+1)^2 + x^2 2x (x+1) \cos \theta$$

Substituindo o valor de  $\cos \theta$  :

$$(x1)^2 = (x+1)^2 + x^2 x (x+1) \frac{x+1}{x1}$$

$$x^2 + 12x = x^2 + 2x + 1 + x^2 \frac{x(x+1)(x+1)}{x1}$$

$$\frac{(x+1)^2 x}{x1} = 4x + x^2$$

Como  $x \neq 0$  :

$$x^2 + 1 + 2x = 4x + x^2 4x$$

Logo:

$$\boxed{x = 5}$$

### 10ª QUESTÃO

Considere  $A$  um conjunto não vazio tal que  $n(A) = x$ . Se  $P(A)$  é o conjunto das partes de  $A$ , responda:

- Qual a expressão para  $n(P(A))$  em função de  $x$ ? Explique.
- Considere, agora,  $n(A) = 2$ . Ao definir:

$$P^1(A) = P(A) \text{ e}$$

$$P^k(A) = P(P^{k-1}(A)) ,$$

qual o menor valor de  $k$  para o qual  $P^k(A) > 64000$ ?

### Gabarito

Em (a), tem-se o total de subconjuntos de  $A$ . Uma vez que cada elemento de  $A$  pode ou não estar em um determinado subconjunto, o total de subconjuntos é dado pelo Princípio Multiplicativo:

$$\underbrace{2 \cdot 2 \cdot 2 \cdots 2}_{x \text{ vezes}} ,$$

resultando em  $\boxed{2^x}$ .

Na letra (b), usando que  $n(A) = 2$ , de acordo com a definição dada e com o resultado demonstrado anteriormente:

$$n(P(A)) = 2^2 = 4$$

$$n(P^2(A)) = 2^4 = 16$$

$$n(P^3(A)) = 2^{16} = 65536$$

Logo:  $k = 3$ .

Comentário geral:

O simulado de matemática do ciclo 1 priorizou manter a estrutura da prova do ITA com um nível de dificuldade fácil para médio dado o curto tempo de prova. Desse modo, destacamos 5 questões como as mais diretas da prova (04, 06, 07, 09 e 10), 3 questões de nível médio (01, 02 e 05) e 2 questões mais trabalhosas (03 e 08). Assim, o grande objetivo dessa prova é saber escolher bem as questões que devem ser feitas e não errar besteira a fim de conquistar uma boa nota.



## QUÍMICA

### Dados

### Constantes

- Constante de Planck  $h = 6,6 \times 10^{-34} \text{ J s}$
- Constante de Rydberg  $R_\infty = 1,1 \times 10^7 \text{ m}^{-1}$
- Massa do elétron  $m_e = 9,1 \times 10^{-31} \text{ kg}$

### Elementos

Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar ( $\text{g mol}^{-1}$ )	Elemento Químico	Número Atômico	Massa Molar ( $\text{g mol}^{-1}$ )
H	1	1,01	O	8	16,00
He	2	4,00	Ne	10	20,18
C	6	12,01	Ar	18	39,95
N	7	14,01	Mo	42	95,95

## 11ª QUESTÃO

A série de Lyman é o conjunto de raios que resultam da emissão do átomo do hidrogênio quando um elétron transita de  $n \geq 2$  a  $n = 1$ , onde  $n$  representa o número quântico principal referente ao nível de energia do elétron.

- a) **Determine** a faixa de comprimentos de onda referente à série de Lyman.
- b) **Determine** o comprimento de onda associado a um elétron emitido de um átomo de cobre pela incidência de um fóton da segunda linha da série de Lyman.

### Dados

- Função trabalho do cobre  $\Phi(\text{Cu}) = 7,44 \times 10^{-19} \text{ J}$

### Gabarito

(a) Para Calcularmos todos os possíveis comprimentos de onda referentes à série de emissão Lyman, devemos substituir todos os valores de  $n$  na equação:

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty \left( \frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_0^2} \right)$$

Dessa forma, como o problema pede o intervalo de valores, basta analisarmos os casos limites. que são  $n_0 = 2$  e  $n_0 = \infty$ . Logo: Primeiro caso:

$$\lambda = \frac{1}{R_\infty \left( 1 - \frac{1}{2^2} \right)} = \frac{1}{1,1 \cdot 10^7 \cdot \frac{3}{4}} \approx 121 \text{ nm}$$

Segundo caso:

$$\lambda = \frac{1}{R_\infty \left( 1 - \frac{1}{\infty^2} \right)} = \frac{1}{1,1 \cdot 10^7} \approx 91 \text{ nm}$$

Dessa forma, o intervalo de valores para  $\lambda$  é:

$$91 \text{ nm} < \lambda < 121 \text{ nm}$$

(b) Primeiramente devemos calcular o comprimento de onda associado ao fóton da segunda série de Lyman:

$$\lambda = \frac{1}{R_{\infty} \left(1 - \frac{1}{3^2}\right)} = \frac{1}{1,1 \cdot 10^7 \cdot \frac{8}{9}} \approx 102 \text{ nm}$$

A partir disso, podemos estudar o efeito fotoelétrico a partir da seguinte equação:

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \Phi + E_{cin}$$

substituindo os valores, temos:

$$\frac{6,6 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^8}{102 \cdot 10^{-9}} = 7,44 \cdot 10^{-19} + E_{cin}$$

$$\Rightarrow E_{cin} \approx 12 \cdot 10^{-19}$$

Porém

$$E_{cin} = m_e \cdot v^2$$

$$\Rightarrow v = \sqrt{\frac{12 \cdot 10^{-19}}{9,1 \cdot 10^{-31}}} = 1,15 \cdot 10^6$$

Pela fórmula de De Broglie, temos:

$$\lambda = \frac{h}{m_e v} = \boxed{0,63 \text{ nm}}$$

## 12ª QUESTÃO

Considere o elemento **X**, de número atômico  $Z = 42$ .


- Determine** a configuração eletrônica do estado fundamental de **X**.
- Determine** os números quânticos do elétron mais energético de **X**.
- Esboce** a probabilidade de encontrar o elétron em função da distância radial do núcleo para o orbital mais energético de **X**.

### Gabarito

a)  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^1 4d^5$

A terminação  $5s^1 4d^5$  tem como explicação a maior estabilidade do orbital *d* semipreenchido.

b)  $n = 4, l = 2, m_l = +2, m_s = -\frac{1}{2}$



### 13ª QUESTÃO

Considere a combustão de 12 g de magnésio com excesso de oxigênio formando óxido de magnésio.

- Determine** a variação de entropia do sistema.
- Determine** a variação de entropia da vizinhança.
- Classifique** o processo quanto à sua espontaneidade.

#### Dados


- Entalpia de formação do MgO  $\Delta H_f^\circ(\text{MgO}, \text{s}) = -600,0 \text{ kJ mol}^{-1}$
- Entropia do MgO  $S^\circ(\text{MgO}, \text{s}) = 27,0 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- Entropia do Mg  $S^\circ(\text{Mg}, \text{s}) = 33,0 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- Entropia do O<sub>2</sub>  $S^\circ(\text{O}_2, \text{g}) = 210,0 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

#### Gabarito

Temos 12 gramas de Magnésio. O primeiro passo é encontrar o número de mols de Mg:

$$n_{\text{Mg}} = \frac{12}{24} = 0,5 \text{ mol}$$

A reação é:



a) Calculando a variação de entropia:

$$\Delta S = 0,5 \cdot (27 - 33 - 105) = \boxed{-55,5 \text{ J/K}}$$

b) Calculando a variação de entalpia:

$$\Delta H = 0,5 \cdot (-600) = -300 \text{ kJ}$$

Mas a variação de entalpia da vizinhança tem o valor contrário da variação de entalpia do sistema, portanto

$$\Delta H_{\text{viz}} = \boxed{300 \text{ kJ}}$$

c) Para avaliar a espontaneidade do processo é necessário calcular variação da energia livre de Gibbs. Sabemos que a energia livre de Gibbs é dada por :

$$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$$

Sabemos que para  $\Delta G < 0$  a reação é espontânea.

$$\Delta G = -300000 - T \cdot (-55,5)$$

Queremos achar o valor de T em que a reação deixa de ser espontânea, então igualaremos  $\Delta G$  a zero.

$$T = \frac{300000}{55,5} = 5405,4 \text{ K}$$

Então para  $\boxed{T < 5405,4 \text{ K}}$  a reação é espontânea.

## 14ª QUESTÃO

Uma amostra de 50 g de uma solução 4% em massa de hidróxido de sódio é misturada com uma amostra de 50 g de uma solução 1,825% de ácido clorídrico em um calorímetro adiabático a 20 °C. Verifica-se que a temperatura da solução aumentou para 23,4 °C. Em seguida, 70 g de uma solução 3,5% de ácido sulfúrico a 20 °C foi adicionada à solução.

**Determine** a temperatura final da solução resultante.

### Dados

- Capacidade calorífica do H<sub>2</sub>O  $C_P(\text{H}_2\text{O}, l) = 75,0 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$

### Gabarito


Começaremos calculando o número de mols de NaOH e de HCl.

$$50g \cdot 4\% \frac{m}{m} NaOH \Rightarrow 0,05 \text{ mol } NaOH$$

$$50g \cdot 1,825\% \frac{m}{m} HCl \Rightarrow 0,025 \text{ mol } HCl$$

Inicialmente temos :  $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$

Porém, é sabido que NaOH é base forte e HCl é ácido forte, e além disso NaCl é solúvel em água. Assim, observamos que  $Na^+$  e  $Cl^-$  são íons espectadores. Portanto a reação que nos interessa é




Serão consumidos 0,025 mol de  $H^+$  e  $OH^-$ , sobrando 0,025 mol de  $OH^-$ . Calculando  $\Delta H_{neut}$ :

$$0,025 \cdot \Delta H_{neut} = \left( \frac{0,96 \cdot 50 + 0,98175 \cdot 50}{18} + 0,025 \right) \cdot 75 \cdot 3,4 \Rightarrow$$

$$\Delta H_{neut} = -55271 J$$

Agora a reação com  $H_2SO_4$  :

Veja que  $SO_4^{2-}$  também é íon espectador.



Logo:

$$70g \cdot 3,5\% \frac{m}{m} H_2SO_4 \Rightarrow 0,025 \text{ mol } H_2SO_4 \Rightarrow 0,05 \text{ mol } H^+$$

Serão consumidos 0,025 mol de  $H^+$  e  $OH^-$ , sobrando 0,025 mol de  $H^+$

Agora encontraremos a temperatura de equilíbrio quando a solução de  $H_2SO_4$  é adicionada. Teremos 23,4 °C 97,0875 g de água da primeira mistura e 20 °C 67,55 g de água da segunda mistura.

$$(23,4 - T) \cdot 97,0875 = (T - 20) \cdot 67,55 \Rightarrow T = 22,4^\circ C$$


A energia liberada na nova neutralização será:  $\Delta H = 0,025 \cdot 55271 = 1381,78 J$

Calculando a temperatura final:  $\frac{164,68}{18} \cdot 75 \cdot \Delta T = 0,025 \cdot 55271$

A temperatura final será 24 °C.

## 15ª QUESTÃO

Considere a estrutura do explosivo RDX, a seguir.



Uma amostra de 11,1 g de RDX foi adicionada a um cilindro juntamente com 1,845 L de ar a 27 °C e 1 atm. Após a reação, os gases no interior do cilindro são resfriados novamente a 27 °C.


- Apresente** a reação balanceada de combustão do RDX.
- Determine** a entalpia de combustão do RDX.
- Determine** a energia interna de combustão do RDX.
- Determine** a pressão parcial de dióxido de carbono no cilindro após a reação.

### Dados

- Entalpia de formação do RDX  $\Delta H_c(RDX) = 2100 \text{ kJ/mol}$
- Entalpia de formação do  $\text{CO}_2$   $\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2, \text{g}) = -390,0 \text{ kJ mol}^{-1}$
- Entalpia de formação do  $\text{H}_2\text{O}$   $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}, \text{l}) = -290,0 \text{ kJ mol}^{-1}$

### Gabarito

Composto RDX:  $\text{C}_3\text{H}_6\text{N}_6\text{O}_6$ . Massa molar: 222 g/mol. a) Reação de combustão



b)

$$\Delta H_{\text{reação}}^\circ = \Delta H_{\text{Prod}}^\circ - \Delta H_{\text{Reag}}^\circ$$

$$\Delta H_{\text{reação}}^\circ = 3 \cdot (-390) + 3 \cdot (-290) - 1 \cdot (2100) = \boxed{-4140 \text{ kJ/mol}}$$

c)

$$\Delta U = \Delta H - \Delta nRT$$

$$\Delta U = -4140 \cdot 10^3 - \left(\frac{9}{2}\right) \cdot 8,31 \cdot 300 = \boxed{-4151,2 \text{ kJ/mol}}$$

d)  $n_{RDX} = \frac{\text{massa}}{\text{MM}} = \frac{11,1}{222} = 0,05 \text{ mols}$  Calculando o número de mols de ar:  $PV = nRT \rightarrow 1 \cdot 1,845 = n \cdot 0,082 \cdot 300 \rightarrow n_{\text{ar}} = 0,075$  Então:  $n_{\text{O}_2} = 0,015 \text{ mols}$  e  $n_{\text{N}_2} = 0,06 \text{ mols}$  Perceba que o ar será, portanto, reagente limitante. Logo, pela estequiometria da reação,  $n_{\text{CO}_2} = 0,03$  e  $n_{\text{N}_2} = 0,09$  Para acharmos a pressão parcial usaremos que:  $P_{\text{CO}_2} = x_{\text{CO}_2} \cdot P_{\text{total}} \rightarrow P_{\text{CO}_2} = 1 \text{ atm} \cdot \frac{0,03}{0,03+0,09} \rightarrow P_{\text{CO}_2} = \boxed{0,25 \text{ atm}}$

## 16ª QUESTÃO

Um cilindro contém 30 g de uma mistura equimolar de hidrogênio e monóxido de carbono com o dobro da quantidade estequiométrica de ar necessária para a combustão completa.



- a) **Determine** a massa de ar no cilindro.
- b) **Determine** o calor liberado na combustão da mistura.
- c) **Determine** a temperatura adiabática da chama.

### Dados

- Capacidade calorífica do  $\text{CO}_2$   $C_P(\text{CO}_2, \text{g}) = 37,0 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- Capacidade calorífica do  $\text{H}_2\text{O}$   $C_P(\text{H}_2\text{O}, \text{g}) = 34,0 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- Capacidade calorífica do  $\text{N}_2$   $C_P(\text{N}_2, \text{g}) = 29,0 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- Capacidade calorífica do  $\text{O}_2$   $C_P(\text{O}_2, \text{g}) = 29,0 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
- Entalpia de formação do  $\text{CO}_2$   $\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2, \text{g}) = -390,0 \text{ kJ mol}^{-1}$
- Entalpia de formação do  $\text{CO}$   $\Delta H_f^\circ(\text{CO}, \text{g}) = -110,0 \text{ kJ mol}^{-1}$
- Entalpia de formação do  $\text{H}_2\text{O}$   $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}, \text{g}) = -240,0 \text{ kJ mol}^{-1}$

### Gabarito

a) Combustão completa da reação



Seja  $x$  o número de mols de  $\text{H}_2$ , como se trata de uma mistura equimolar, o número de mols de  $\text{CO}$  também será  $x$ . Pela estequiometria da reação e usando que a quantidade de ar usada é o dobro da necessária para a combustão, temos que:

$$n_{\text{O}_{2(g)}} = 2x$$

$$n_{\text{N}_{2(g)}} = 8x$$

Assim:

$$30 = 2x + 28x + 64x + 224x$$

$$x = 0,0943$$

Logo, a massa de ar será:

$$m_{\text{ar}} = 2x \cdot 32 + 8x \cdot 28 = 288x = \boxed{27,1584 \text{ g}}$$

b)

$$\Delta H_I = -240 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_{II} = -390 - (-110) = -280 \text{ kJ/mol}$$

Assim, a energia liberada será dada por:

$$E_{\text{liberada}} = (-240 - 280) \cdot x = \boxed{-49,036 \text{ kJ}}$$

c)

$$\Delta H = c_p \cdot \Delta T$$

$$520 \cdot 10^3 = (4 \cdot 29 + 1 \cdot 34 + 1 \cdot 37 + 4 \cdot 29 + 1 \cdot 29) \cdot \Delta T$$

$$\boxed{\Delta T = 1566,3 \text{ K}}$$

### 17ª QUESTÃO

Um composto orgânico **X** contendo apenas carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio foi analisado. O resultado das análises é apresentado a seguir.

1. Uma amostra de 58 mg do composto sofreu combustão completa formando 88 mg de dióxido de carbono e 36 mg de água.
2. Todo nitrogênio de uma amostra de 87 mg do composto foi convertido em 33,6 mL de amônia em CNTP.
3. A taxa de efusão desse composto em um experimento foi de 30 mL/min. A taxa de efusão do argônio em condições idênticas foi de 17,6 mL/min.

- a) **Determine** a fórmula mínima de **X**.
- b) **Determine** a fórmula molecular de **X**.

#### Gabarito

a) 1. Para o primeiro experimento temos que:

$$n_{\text{carbono}} = n_{\text{CO}_2} = \frac{88 \text{ mg}}{44} = 2 \text{ mmol}$$

Logo:

$$n_{\text{hidrogênio}} = 2 \cdot n_{\text{H}_2\text{O}} = 2 \cdot \frac{36 \text{ mg}}{18} = 4 \text{ mmol}$$

Assim, em 58 mg de composto:

$$m_{\text{carbono}} = 2 \cdot 12 = 24 \text{ mg}$$

$$m_{\text{hidrogênio}} = 1 \cdot 4 = 4 \text{ mg}$$

Para o segundo experimento: 2. Em 33,6 mL de amônia temos  $\frac{33,6 \text{ mL}}{22,4 \text{ L}} = 1,5 \text{ mmol}$  de nitrôgenio, dado que o gás se encontra em CNTP. Para acharmos a massa de nitrogênio em 58 mg de composto:

$$\begin{array}{ccc} 1,5 \text{ mmol} & - & 87 \text{ mg} \\ x & - & 58 \text{ mg} \\ x = 1 \text{ mmol} \end{array}$$

Assim:

$$58 = 24 + 4 + 14 + m_{\text{oxigênio}}$$

$$m_{\text{oxigênio}} = 16 \text{ mg}$$

$$n_{\text{oxigênio}} = 1 \text{ mmol}$$

Daí, a fórmula mínima do composto será:



b) Para acharmos a fórmula molecular do composto precisamos, primeiro, calcular sua massa molar. Assim:


$$\frac{30}{17,6} = \sqrt{\frac{m_{\text{molar}}}{40}}$$

$$m_{\text{molar}} = 116 \text{ g/mol}$$

Como a massa molar da fórmula mínima é  $58 \text{ g/mol}$

$$58 \cdot n = 116 \rightarrow n = 2$$

Logo, a fórmula do composto será:



### 18ª QUESTÃO

Considere que  $V$  é o volume do recipiente que contém  $n$  mols um gás. O volume total ocupado pelas moléculas de gás é  $bn$  e, próximo às paredes, as moléculas de gás são atraídas com força proporcional ao quadrado da concentração do gás, levando a uma diferença de pressão de  $an^2/V^2$ .

- a) **Apresente** a equação de estado para esse gás.
- b) **Ordene** os gases nobres He, Ne e Ar em função do parâmetro  $b$ .
- c) **Ordene** as moléculas  $H_2$ ,  $H_2O$  e  $NO$ , em função do parâmetro  $a$ .

#### Gabarito

- a) A equação de estado para esse gás será dada por:

$$\boxed{\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right) \cdot (V - bn) = nRT}$$

- b) O parâmetro  $b$  está relacionado ao tamanho das moléculas de gás, quanto maior o tamanho da molécula, maior o  $b$ , portanto:

$$R_{Ar} > R_{Ne} > R_{He} \Rightarrow \boxed{b_{Ar} > b_{Ne} > b_{He}}$$


- c) O parâmetro  $a$  está relacionado às interações intermoleculares das moléculas, quanto mais forte a interação maior o valor de  $a$ , portanto:  $H_2 \rightarrow$  dipolo induzido  $H_2O \rightarrow$  ligação de hidrogênio  $NO \rightarrow$  dipolo dipolo sendo  $F$  a força de cada interação, temos:

$$F_{H_2O} > F_{NO} > F_{H_2} \Rightarrow \boxed{a_{H_2O} > a_{NO} > a_{H_2}}$$



### 19ª QUESTÃO

O composto **B** pode ser preparado por uma síntese de múltiplas etapas partindo do composto **A1** ou de seu enantiômero, **A2**.




Dependendo da série de reações empregadas, a configuração dos carbonos 2, 3 e 5 pode ser seletivamente mantida ou invertida. Esse protocolo não leva à inversões no carbono 4. De todos os possíveis estereoisômeros de **B**, apenas quatro são efetivamente formados nessa síntese.


- Apresente** a estrutura do composto **A2**.
- Determine** o número de estereoisômeros de **A1** e **A2**.
- Determine** o número de estereoisômeros de **B**.
- Apresente** a estrutura dos estereoisômeros de **B** que são efetivamente formados na reação.

#### Gabarito


- Para encontrar a estrutura do composto **A2** basta espelhar **A1**, portanto:




- Para determinar o número de estereoisômeros de **A1** basta contar o número de carbonos quirais:



5 carbonos quirais portanto  $2^5 = 32$  estereoisômeros tanto para **A1** quanto para **A2** \* Para determinar o número de estereoisômeros de **B**, primeiro percebemos que há uma certa simetria, portanto faremos os casos 1 a 1 pois são poucos e não podemos esquecer de nenhum:




Contando, temos 10 estereoisômeros \* As estruturas efetivamente formadas são as que apresentam o carbono 4 na mesma configuração vista no composto A1, portanto temos as seguintes estruturas:



Em amarelo temos o carbono que foi seletivamente escolhido para mudar sua configuração.

## 20ª QUESTÃO

A bupropiona é um fármaco utilizado principalmente para o tratamento da depressão e do tabagismo.




Este composto é opticamente ativo, sendo que um dos estereoisômeros possui maior efeito farmacológico. Mesmo que seja possível isolar o isômero mais potente, a bupropiona é comercializada como uma mistura racêmica, pois sofre racemização *in vivo*, ou seja, uma solução opticamente ativa desse composto perde sua atividade com o tempo no corpo humano.

- a) **Identifique** as funções orgânicas na bupropiona.
- b) **Apresente** o equilíbrio tautomérico da bupropiona com a sua forma enólica.
- c) **Explique** porque uma mistura ópticamente ativa de bupropiona perde sua atividade óptica em meio ácido no corpo humano.

### Gabarito

- a) Observando o fármaco verificamos as funções amina, cetona e haleto de arila



- c) A mistura perde sua atividade óptica pela sua condição de tautomeria. Isso acontece pois quando a bupropiona passa para o seu isômero enólico, a molécula deixa de ser opticamente ativa, pois deixa de ter carbono quiral. Sendo assim, quando a molécula retorna à bupropiona, a escolha de R ou S é feita de maneira aleatória, o que faz com que a mistura fique racêmica