

# **GABARITO QUÍMICA**

#### Questão 1

Quando  $0.36\,\mathrm{g}$  de pentano,  $\mathrm{C_5H_{12}}$ , queimam em excesso de oxigênio em um calorímetro com capacidade calorífica  $220\,\mathrm{J\,K^{-1}}$ , sob pressão constante, a temperatura do calorímetro aumenta em  $80\,\mathrm{^{\circ}C}$ .

Determine a entalpia de combustão do pentano.

## Questão 2

Considere as reações:

$$\begin{array}{ccc} 2\,\mathrm{Al}(\mathrm{s}) + 6\,\mathrm{HBr}(\mathrm{aq}) &\longrightarrow 2\,\mathrm{AlBr_3}(\mathrm{aq}) + 3\,\mathrm{H_2}(\mathrm{g}) & \Delta H_\mathrm{r}^\circ = -1060\,\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}} \\ & \mathrm{HBr}(\mathrm{g}) &\longrightarrow \mathrm{HBr}(\mathrm{aq}) & \Delta H_\mathrm{r}^\circ = -81\,\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}} \\ & \mathrm{H_2}(\mathrm{g}) + \mathrm{Br_2}(\mathrm{l}) &\longrightarrow 2\,\mathrm{HBr}(\mathrm{g}) & \Delta H_\mathrm{r}^\circ = -73\,\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}} \\ & \mathrm{AlBr_3}(\mathrm{s}) &\longrightarrow \mathrm{AlBr_3}(\mathrm{aq}) & \Delta H_\mathrm{r}^\circ = -368\,\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}} \end{array}$$

Determine a entalpia de formação do brometo de alumínio anidro, AlBr<sub>3</sub>.

#### Questão 3

**Determine** a entalpia padrão de combustão da ureia, CO(NH<sub>2</sub>)<sub>2</sub>, em 25 °C.

Dados em $25^{\circ}\mathrm{C}$	$\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}\left(\mathrm{l}\right)$	$CO_2(g)$	$\mathrm{CO}(\mathrm{NH_2})_2(\mathrm{s})$
Entalpia padrão de formação, $\Delta H_{\mathrm{f}}^{\circ}/\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}}$	-286	-394	-334

#### Questão 4

Considere as reações.

1. 
$$H_2(g) + I_2(s) \longrightarrow 2 HI(g)$$

$$2. \ 2\operatorname{Ag}(s) + \operatorname{Br}_2(l) \longrightarrow 2\operatorname{AgBr}(s)$$

3. 
$$O_2(g) \longrightarrow O_2(aq)$$

4. 
$$2 NO_2(g) \longrightarrow N_2O_4(g)$$

Determine o sinal da entropia padrão de cada reação.



## Questão 5

Considere a reação de decomposição do carbonato de magnésio.

$$MgCO_3(s) \longrightarrow MgO(s) + CO_2(g)$$

Suponha que  $\Delta H_{\rm r}^{\circ}$  e  $\Delta S_{\rm r}^{\circ}$  são independentes da temperatura.

Determine a faixa de temperatura em que a decomposição do carbonato de magnésio é espontânea.

Dados em $25^{\circ}\mathrm{C}$	$MgCO_3(s)$	$CO_2(g)$	MgO(s)
Entalpia padrão de formação, $\Delta H_{\mathrm{f}}^{\circ}/\frac{\mathrm{kJ}}{\mathrm{mol}}$	-1100	-394	-602
Entropia padrão molar, $S_{\mathrm{m}}^{\circ}/\frac{\mathrm{J}}{\mathrm{K}\mathrm{mol}}$	65,7	214	26,9

# Questão 6

Considere os compostos:

- 1. 2,2,4-trimetilpentano
- 2. 1,2,3,4-tetrametilcicloeptano
- $3. \ 1\hbox{-isopropil-}2\hbox{-metilciclobutano}.$

Apresente a estrutura de cada composto.

#### Questão 7

Considere os compostos:

- $1. \ \, 3\text{-isopropil-}2, 4\text{-dimetil pent-}2\text{-eno}$
- 2. 4-etil-2-metilex-2-eno
- 3. 1,2-dimetilciclobuteno

 ${\bf Apresente}$ a estrutura de cada composto.

#### **Questão 8**

Considere os compostos.

 ${\bf Identifique}$  as funções orgânicas de cada composto.



# Questão 9

O estradiol é o principal hormônio sexual feminino, importante na regulação do ciclo estral e do ciclo menstrual.

Apresente a fórmula molecular do estradiol.

## Questão 10

O ácido ascórbico ou vitamina C é uma molécula com papel importante em várias reações bioquímicas celulares.

 ${\bf Classifique}$ todos os átomos de carbono da vitamina C<br/> quanto a sua hibridização.