

Função	Primitiva	Função	Primitiva	Função	Primitiva
$\frac{u^r u'}{r \neq -1}$	$\frac{u^{r+1}}{r+1}$	$\frac{u'}{u}$	$\ln u $	$u' e^u$	e^u
$u' a^u$	$\frac{a^u}{\ln a}$	$u' \cos u$	$\sin u$	$u' \sin u$	$-\cos u$
$u' \sec^2 u$	$\operatorname{tg} u$	$u' \operatorname{cosec}^2 u$	$-\cotg u$	$u' \sec u$	$\ln \sec u + \operatorname{tg} u $
$u' \operatorname{cosec} u$	$-\ln \operatorname{cosec} u + \cotg u $	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	$-\arccos u$ ou $\arcsen u$	$\frac{u'}{1+u^2}$	$\operatorname{arctg} u$ ou $-\operatorname{arccotg} u$

$\sec x = \frac{1}{\cos x}$ $\operatorname{cosec} x = \frac{1}{\sin x}$	$\sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y$ $\cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y$ $\sin(2x) = 2 \sin x \cos x$ $\cos(2x) = \cos^2 x - \sin^2 x$	$\cos^2 x = \frac{1 + \cos(2x)}{2}$ $\sin^2 x = \frac{1 - \cos(2x)}{2}$	$1 + \operatorname{tg}^2 x = \sec^2 x$ $1 + \cotg^2 x = \operatorname{cosec}^2 x$
--	--	--	--

Função	Transformada	Função	Transformada	Função	Transformada
t^n ($n \in \mathbb{N}_0$)	$\frac{n!}{s^{n+1}}$ ($s > 0$)	e^{at} ($a \in \mathbb{R}$)	$\frac{1}{s-a}$ ($s > a$)	$\sin(at)$ ($a \in \mathbb{R}$)	$\frac{a}{s^2 + a^2}$ ($s > 0$)
$\cos(at)$ ($a \in \mathbb{R}$)	$\frac{s}{s^2 + a^2}$ ($s > 0$)	$\sinh(at)$ ($a \in \mathbb{R}$)	$\frac{a}{s^2 - a^2}$ ($s > a $)	$\cosh(at)$ ($a \in \mathbb{R}$)	$\frac{s}{s^2 - a^2}$ $s > a $

Propriedades da transformada de Laplace	
$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}(s)$, com $s > s_f$ e $G(s) = \mathcal{L}\{g(t)\}(s)$, com $s > s_g$	
$\mathcal{L}\{f(t) + g(t)\}(s) = F(s) + G(s)$, $s > \max\{s_f, s_g\}$	$\mathcal{L}\{\alpha f(t)\}(s) = \alpha F(s)$, $s > s_f$ e $\alpha \in \mathbb{R}$
$\mathcal{L}\{e^{\lambda t} f(t)\}(s) = F(s - \lambda)$, $s > s_f + \lambda$ e $\lambda \in \mathbb{R}$	$\mathcal{L}\{t^n f(t)\}(s) = (-1)^n F^{(n)}(s)$, $s > s_f$ e $n \in \mathbb{N}$
$\mathcal{L}\{H_a(t) \cdot f(t - a)\}(s) = e^{-as} F(s)$, $s > s_f$ e $a > 0$	$\mathcal{L}\{f(at)\}(s) = \frac{1}{a} F\left(\frac{s}{a}\right)$, $s > a s_f$ e $a > 0$
$\mathcal{L}\{f^{(n)}(t)\}(s) = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} f'(0) - \dots - s f^{(n-2)}(0) - f^{(n-1)}(0)$ <p>com $s > \max\{s_f, s_{f'}, s_{f''}, \dots, s_{f^{(n-1)}}\}$, $n \in \mathbb{N}$</p>	
$\mathcal{L}\{(f * g)(t)\}(s) = F(s) \cdot G(s)$, onde $(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau) g(t - \tau) d\tau$, $t \geq 0$	