

Actividad 3 de la Unidad 2

Tema longitud de arco

Nombre: Brayan Ramirez Benítez

Fecha: 07/05/2020

Instrucciones: Resuelve los tres ejercicios que aparecen, recuerda revisar qué método emplearás para integrar.

1. Usa la fórmula de longitud de arco para hallar la longitud de la curva $y = 2x - 5$, $1 \leq x \leq 3$. Compruebe su respuesta observando que la curva es un segmento de recta y calcule su longitud mediante la fórmula de la distancia.

Debemos trabajar con X, así que utilizando

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

Donde $a = 1$ y $b = 3$

Además, tenemos que

$$\frac{dy}{dx} = 2$$

Por lo tanto

$$L = \int_1^3 \sqrt{1 + (2)^2} dx$$

$$L = \int_1^3 \sqrt{5} dx$$

$$L = (\sqrt{5}x) \Big|_1^3$$

$$L = (\sqrt{5}(3)) - (\sqrt{5}(1))$$

$$L = 2\sqrt{5}$$

Ahora para utilizar la formula de la distancia necesitamos dos puntos, asi que evaluaremos la función en el intervalo

Para $x = 3$

$$y = 2(3) - 5$$

$$y = 6 - 5$$

$$y = 1$$

Para $x = 1$

$$y = 2(1) - 5$$

$$y = 2 - 5$$

$$y = -3$$

Entonces tenemos los puntos

P (3,1) y Q (1,-3)

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

$$d = \sqrt{(3 - 1)^2 + (1 - (-3))^2}$$

$$d = \sqrt{(2)^2 + (4)^2}$$

$$d = \sqrt{20}$$

$$d = \sqrt{(5)(4)}$$

$$d = 2\sqrt{5}$$

2. Calcular la longitud de arco de la función dada en el intervalo señalado

$$y = 3x^{\frac{2}{3}} - 10 \text{ de } A(8,2) \text{ a } B(27,17)$$

Primero comprobaremos si la función esta definida en el intervalo $8 < x < 27$

$$\frac{dy}{dx} = 2x^{-\frac{1}{3}}$$

$$f'(8) = \frac{2}{\sqrt[3]{8}}$$

$$f'(8) = 1$$

$$f'(27) = \frac{2}{\sqrt[3]{27}}$$

$$f'(27) = \frac{2}{3}$$

Debemos trabajar con X, así que utilizando

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

Donde $a = 8$ y $b = 27$

Además, tenemos que

$$\frac{dy}{dx} = 2x^{-\frac{1}{3}}$$

Por lo tanto

$$L = \int_8^{27} \sqrt{1 + \left(\frac{2}{x^{\frac{1}{3}}}\right)^2} dx$$

$$L = \int_8^{27} \sqrt{\frac{x^{\frac{2}{3}} + 4}{x^{\frac{2}{3}}}} dx$$

$$u = x^{\frac{2}{3}} + 4 \quad du = \frac{2}{3} x^{-\frac{1}{3}} dx$$

Sustituyendo en la integral

$$L = \int \sqrt{\frac{u}{x^{\frac{2}{3}}}} \frac{3}{2} x^{\frac{1}{3}} du$$

$$L = \frac{3}{2} \int \sqrt{u} du$$

$$L = \frac{3}{2} \left(\frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} \right)$$

Simplificando y regresando el cambio de variable

$$L = (x^{\frac{2}{3}} + 4)^{\frac{3}{2}} \Big|_8^{27}$$

Evaluando de 8 a 27

$$L = ((27)^{\frac{2}{3}} + 4)^{\frac{3}{2}} - ((8)^{\frac{2}{3}} + 4)^{\frac{3}{2}}$$

$$L = (9 + 4)^{\frac{3}{2}} - (4 + 4)^{\frac{3}{2}}$$

$$L = 13(13)^{\frac{1}{2}} - 16(2)^{\frac{1}{2}}$$

$$3. y = \frac{x^3}{3} + \frac{1}{4x}, \quad 1 \leq x \leq 2$$

Primero comprobaremos si la función está definida en el intervalo

$$\frac{dy}{dx} = x^2 - \frac{1}{4x^2}$$

$$f'(1) = 1 - \frac{1}{4}$$

$$f'(1) = \frac{3}{4}$$

$$f'(2) = 4 - \frac{1}{16}$$

$$f'(2) = \frac{63}{16}$$

Debemos trabajar con X, así que utilizando

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

Donde a = 1 y b = 2

Además, tenemos que

$$\frac{dy}{dx} = x^2 - \frac{1}{4x^2}$$

Por lo tanto

$$L = \int_1^2 \sqrt{1 + \left(x^2 - \frac{1}{4x^2}\right)^2} dx$$

$$L = \int_1^2 \sqrt{x^4 + \frac{1}{16x^4} + \frac{1}{2}} dx$$

Simplificando

$$L = \int_1^2 \sqrt{\frac{8x^4 + 16x^8 + 1}{16x^4}} dx$$

$$L = \int_1^2 \frac{\sqrt{(2x^2 + 2x + 1)^2(2x^2 - 2x + 1)^2}}{\sqrt{16x^4}} dx$$

$$L = \frac{1}{4} \int_1^2 \frac{(2x^2 + 2x + 1)(2x^2 - 2x + 1)}{x^2} dx$$

$$L = \frac{1}{4} \int_1^2 \frac{4x^4 + 1}{x^2} dx$$

$$L = \frac{1}{4} \int_1^2 4x^2 + \frac{1}{x^2} dx$$

Integrando

$$L = \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{4}{3}x^3 - \frac{1}{x}\right) \Big|_1^2$$

$$L = \left(\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{4x}\right) \Big|_1^2$$

Evaluando en el intervalo

$$L = \left(\frac{1}{3}(2)^3 - \frac{1}{4(2)}\right) - \left(\frac{1}{3}(1)^3 - \frac{1}{4(1)}\right)$$

$$L = \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{8}\right) - \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right)$$

$$L = \frac{7}{3} + \frac{1}{8}$$

$$L = \frac{59}{24}$$