

信息学院本科生 2012——2013 学年第一学期线性代数课程期末考试试卷 (A 卷)

专业: 年级: 学号: 姓名: 成绩:

说明: A^T 表示矩阵 A 的转置矩阵, A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵, E 是单位矩阵, O 是零矩阵,
 A^{-1} 表示可逆矩阵 A 的逆矩阵, $|A|$ 表示方阵 A 的行列式, $\langle \alpha, \beta \rangle$ 表示向量 α, β 的内积。

草稿区

得分

一. 客观题: 1-3 小题为判断题, 在对的后面括号中填“√”, 错的后面括号中填“×”,

4-8 为单选题, 将正确选项前的字母填在括号中. (每小题 2 分, 共 16 分)。

1. 若两个 n 维非零列向量 α 与 β 正交, 则它们线性无关. ()

2. n 阶矩阵 A 满足 $A^2 - 3A - 2E = O$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵, 则 A 不可逆. ()

3. 若 T 为线性空间 V 中的正交变换, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m > 1$) 为 V 中一个正交向量组, 则 $T\alpha_1, T\alpha_2, \dots, T\alpha_m$ 一定是一个正交向量组. ()

4. 下列行列式的值可能不为 0 的是 ()

- (A) 行列式 D 中有两列对应元素之和都为 0 (B) 行列式 D 中某行元素全为 0
 (C) 行列式 D 中有两行含有相同的公因子 (D) 行列式 D 中有一行与另一行元素对应成比例

5. 如果一个非齐次方程组有解, 则有惟一解的充要条件是它的导出组 ()

- (A) 有解 (B) 无解 (C) 只有零解 (D) 有非零解

6. 设 n 阶矩阵 A, B 和 C , 则下列说法正确的是 ()

- (A) $AB = AC$, 则 $B = C$ (B) $AB = O$, 则 $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$
 (C) $(AB)^T = A^T B^T$ (D) $(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$

7. 设 $\lambda = \frac{1}{2}$ 是可逆矩阵 A 的一个特征值, 则矩阵 $(3A^2)^{-1}$ 有一个特征值等于 ()

- (A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{4}$

8. 设 A, B 为 n 阶方阵, A^*, B^* 分别为 A, B 对应的伴随矩阵, 分块矩阵

$C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$, 则 C 的伴随矩阵 C^* 等于 ()

- (A) $\begin{pmatrix} |A|B^* & O \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} |B|A^* & O \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} |A|A^* & O \\ O & |B|B^* \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} |B|B^* & O \\ O & |A|A^* \end{pmatrix}$

得 分

二 、行列式计算 （第 1 小题 6 分，第 2 小题 8 分，共 14 分）

草 稿 区

1. 计算四阶行列式

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 0 & 3 & -1 \\ 4 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & -3 & 3 & -1 \end{vmatrix}.$$

2. 计算 n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 & 1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_{n-1} & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix} \quad a_i \neq 0 \quad i=1,2\cdots n.$$

得 分

三、求矩阵 X ，使下式成立：

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} X \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

（本题 8 分）

草 稿 区

得 分

--

四、对于线性方程组：

（本题 13 分）

草 稿 区

一般将第三行放到第一行（未知数在最右边的）

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = \lambda - 3 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = -2 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = -2 \end{cases}, \lambda \text{ 为何值时，方程组无解、有惟一解和有无穷多解？}$$

并在方程组有无穷多解时，试用其导出组的基础解系表示全部解。

得 分

五、已知三维向量空间 R^3 的两组基：

(本题 12 分)

草 稿 区

I: $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T, \alpha_2 = (0, 1, 0)^T, \alpha_3 = (0, 0, 1)^T ;$

II: $\beta_1 = (3, -5, 4)^T, \beta_2 = (2, -1, 2)^T, \beta_3 = (-2, 5, -3)^T ;$

1) 求由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵；

2) 求在两组基下有相同坐标的向量。

得 分

六、已知二次型： $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3$ (本题 15 分)

用正交变换化 $f(x_1, x_2, x_3)$ 为标准形，并求出其正交变换矩阵 P ；

同时说明该二次型的类型(正定、负定、半正定、半负定、不定)。

草 稿 区

得 分

七、设 A 是 n 阶方阵，且 $AA^T = E$ ， $|A| = -1$ ，证明 $|A + E| = 0$
(其中 E 是 n 阶单位矩阵)。(本题 9 分)

草 稿 区

(A+E)的转置=A的转置+E的转置=A的转置+E
单位矩阵经常带有隐含条件
单位矩阵是正交的、是自身的转置、是对角的、是实对称的

得 分

八、设 X^* 是非齐次线性方程组 $AX = \beta(\beta \neq O)$ 的一个解， $X_1, X_2, \cdots, X_{n-r}$ 是它导出组的基础解系，证明： $X^*, X^* - X_1, X^* - X_2, \cdots, X^* - X_{n-r}$ 线性无关。（本题 9 分）

草 稿 区

得 分

九、设 A 是 $m \times n$ 的实矩阵，已知矩阵 $B = \lambda E + A^T A$ ，其中 E 是 n 阶单位矩阵，
证明：当 $\lambda > 0$ 时，矩阵 B 为正定矩阵。 (本题 4 分)

草 稿 区

E是实对称矩阵，ATA也是实对称矩阵

XTBX=XT&EX+XTATAX=&+(AX)T(AX);AX为行向量，其与自身转置相乘得到的数为各元素的平方和大于等于0，&>0,所以只要X不为0向量，B都大于0