

Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого

Физико-механический институт

Высшая школа прикладной математики и вычислительной  
физики

**Отчет по лабораторной работе №3  
“Интервальный анализ”**

Выполнили студент группы 5030102/10201:

Шкуропат Павел Константинович

Преподаватель:

Баженов Александр Николаевич

Санкт-Петербург  
2024

# Содержание

<b>1</b>	<b>Постановка задачи</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Теория</b>	<b>2</b>
2.1	Интервальная мода . . . . .	2
2.2	Интервальная медиана Крейновича . . . . .	3
2.3	Интервальная медиана Пролубникова . . . . .	3
2.4	Коэффициент Жаккара . . . . .	3
<b>3</b>	<b>Реализация</b>	<b>3</b>
3.1	Алгоритм . . . . .	3
<b>4</b>	<b>Результаты</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>Выводы</b>	<b>4</b>

# 1 Постановка задачи

Даны 2 интервальных выборки

$$\mathbf{X} = \{\mathbf{x}_i\}, \quad (1)$$

$$\mathbf{Y} = \{\mathbf{y}_i\}. \quad (2)$$

Взять  $\mathbf{X}, \mathbf{Y}$  из файлов данных, задав  $\text{rad}\mathbf{x} = \text{rad}\mathbf{y} = \frac{1}{2^N}B$ ,  $N = 14$ .

Файлы данных:

- *-0.205\_lvl\_side\_a\_fast\_data.bin*
- *0.225\_lvl\_side\_a\_fast\_data.bin*

Связь кодов данных и  $B$ :

$$V = N/16384 - 0.5$$

Сделать оценки констант  $a, t$  в уравнениях:

$$\mathbf{X} + a = \mathbf{Y}, \quad (3)$$

$$t\mathbf{X} = \mathbf{Y}, \quad (4)$$

Метод решения:

$$\hat{a} = \operatorname{argmax} F(a, \mathbf{X}, \mathbf{Y}), \quad (5)$$

где  $F$  — функционал.

В качестве функционала взять варианты:

$$J_i(a, \mathbf{X}, \mathbf{Y}), \quad (6)$$

$$J_i(a, \text{mode}\mathbf{X}, \text{mode}\mathbf{Y}), \quad (7)$$

$$J_i(a, \text{med}_K\mathbf{X}, \text{med}_K\mathbf{Y}), \quad (8)$$

$$J_i(a, \text{med}_P\mathbf{X}, \text{med}_P\mathbf{Y}), \quad (9)$$

где  $J_i$  — коэффициент Жаккара,  $\text{mode}$  — интервальная мода,  $\text{med}_K, \text{med}_P$  — интервальные медианы Крейновича и Пролубникова.

Сделать точечные и интервальные оценки, задавшись уровнем  $\alpha$ .

## 2 Теория

### 2.1 Интервальная мода

Пусть имеется интервальная выборка

$$\mathbf{X} = \{\mathbf{x}_i\}.$$

Сформируем массив интервалов  $\mathbf{z}$  из концов интервалов  $\mathbf{X}$ .

Для каждого интервала  $\mathbf{z}_i$  подсчитываем число  $\mu_i$  интервалов из выборки  $\mathbf{X}_i$ , включающих  $\mathbf{z}_i$ . Максимальные  $\mu_i = \max \mu$  достигаются для индексного множества  $K$ . Тогда можно найти интервальную моду как мультиинтервал.

$$\text{mode}\mathbf{X} = \bigcup_{k \in K} \mathbf{z}_k. \quad (10)$$

## 2.2 Интервальная медиана Крейновича

Пусть дана выборка  $\mathbf{X} = \{\mathbf{x}_i\}$ .

Пусть  $\underline{c} = \{\underline{x}_i\}$ ,  $\bar{c} = \{\bar{x}_i\}$  — конфигурация точек, составленных, соответственно, из левых и правых концов интервалов из  $\mathbf{X}$ .

Тогда медианой Крейновича  $\text{med}_K \mathbf{X}$  интервальной выборки  $\mathbf{X}$  — это интервал

$$\text{med}_K = [\text{med}_c, \text{med}\bar{c}]. \quad (11)$$

## 2.3 Интервальная медиана Пролубникова

Медиана Пролубникова  $\text{med}_P \mathbf{X}$  выборки  $\mathbf{X}$  — это интервал  $\mathbf{x}_m$ , для которого половина интервалов из  $\mathbf{X}$  лежит слева, а половина — справа.

В ситуации, когда имеются два элемента подинтервала  $\mathbf{x}_m$  и  $\mathbf{x}_{m+1}$ , расположенных посередине вариационного ряда,  $\mathbf{x}_m \neq \mathbf{x}_{m+1}$  медиана может быть определена естественным обобщением взятия полусуммы точечных значений, расположенных посередине ряда из точечных значений, в случае интервальной выборки взятие полусуммы интервалов  $\mathbf{x}_m$  и  $\mathbf{x}_{m+1}$ :

$$\text{med}_P \mathbf{X} = (\mathbf{x}_m + \mathbf{x}_{m+1})/2. \quad (12)$$

## 2.4 Коэффициент Жаккара

Коэффициент Жаккара для двух интервалов  $\mathbf{x} \in \mathbb{IR}$  и  $\mathbf{y} \in \mathbb{IR}$ :

$$\text{Ji}(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \frac{\text{wid}(x \wedge y)}{\text{wid}(x \vee y)} = \frac{\min\{\bar{x}, \bar{y}\} - \max\{\underline{x}, \underline{y}\}}{\max\{\bar{x}, \bar{y}\} - \min\{\underline{x}, \underline{y}\}}. \quad (13)$$

Коэффициент Жаккара для множества интервалов  $\mathbf{X} \in \mathbb{IR}^n$ :

$$\text{Ji}(\mathbf{X}) = \frac{\min \bar{x}_i - \max \underline{x}_i}{\max \bar{x}_i - \min \underline{x}_i}. \quad (14)$$

Коэффициент Жаккара для двух множеств интервалов  $\mathbf{X} \in \mathbb{IR}^n$  и  $\mathbf{Y} \in \mathbb{IR}^n$ :

$$\text{Ji}_k(\mathbf{X}, \mathbf{Y}) = \frac{\min\{\bar{x}_k, \bar{y}_k\} - \max\{\underline{x}_k, \underline{y}_k\}}{\max\{\bar{x}_k, \bar{y}_k\} - \min\{\underline{x}_k, \underline{y}_k\}}, \quad k \in 1, 2, \dots, |\mathbf{X}|. \quad (15)$$

## 3 Реализация

Лабораторная работа выполнена на языке программирования Python. В ходе работы были также использованы библиотеки `numpy` и `intvalpy`

Ссылка на GitHub репозиторий: <https://github.com/Brendow271/IntervalAnalyze/tree/main/Lab3>

### 3.1 Алгоритм

Для поиска параметров, при которых функционал достигал наибольших значений, был использован алгоритм тройного поиска с заданной точностью  $\varepsilon = 10^{-3}$  на участках, где функции вели себя как унимодальные.

Его же будем использовать для расчёта интервальной оценки параметров  $a, t$  с уровнем значимости  $\alpha = 0.05$

## 4 Результаты

Для функционала со стандартными интервальными выборками (6):

$$\begin{aligned}\hat{a} &= 0.34278 \pm 0.0005, \quad F_1(\hat{a}) = -0.94918, \\ \hat{t} &= -1.01467 \pm 0.0005, \quad F_1(\hat{t}) = -0.92734.\end{aligned}$$

Для функционала с интервальными модами (7):

$$\begin{aligned}\hat{a} &= 0.34023 \pm 0.0005, \quad F_2(\hat{a}) = -0.25437, \\ \hat{t} &= -0.99871 \pm 0.0005, \quad F_2(\hat{t}) = -0.92750.\end{aligned}$$

Для функционала с интервальными медианами Крейновича (8):

$$\begin{aligned}\hat{a} &= 0.34415 \pm 0.0005, \quad F_3(\hat{a}) = -0.00184, \\ \hat{t} &= -1.00607 \pm 0.0005, \quad F_3(\hat{t}) = 0.63020.\end{aligned}$$

Для функционала с интервальными медианами Пролубникова (9):

$$\begin{aligned}\hat{a} &= 0.34366 \pm 0.0005, \quad F_4(\hat{a}) = -0.12457, \\ \hat{t} &= -1.00607 \pm 0.0005, \quad F_4(\hat{t}) = 0.63021.\end{aligned}$$

## 5 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы были рассмотрены подходы к оценке параметров в уравнениях, содержащих интервальные данные. На основе использования различных функционалов, включая коэффициент Жаккара, были определены оптимальные значения параметров  $\hat{a}$  и  $\hat{t}$  для уравнений вида  $\mathbf{X} + a = \mathbf{Y}$  и  $t\mathbf{X} = \mathbf{Y}$ .

На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:

1. Значения параметров  $\hat{a}$  и  $\hat{t}$  зависят от выбранного функционала. Это подчеркивает необходимость тщательного подхода к выбору критерия оптимальности при решении задач интервального анализа.
2. Наиболее устойчивые значения были получены при использовании функционала с интервальными медианами Крейновича (8). Оптимальное значение параметра  $\hat{t}$  в этом случае демонстрирует положительное значение коэффициента Жаккара, что свидетельствует о хорошем уровне совпадения интервалов.
3. Использование интервальной моды и медиан (в интерпретации Крейновича и Пролубникова) в качестве статистических характеристик позволило повысить точность оценок параметров, что подчеркивает их значимость для анализа данных с интервальной природой.

Таким образом, выполненная работа показала практическую применимость и эффективность методов интервального анализа для задач параметрической оценки, а также акцентировала внимание на важности выбора адекватных инструментов и методов для обработки данных.