习题 1. 设G为一个有k个支的平面图。如果G的顶点数、边数、面数分别为p, q和f, 试证:

$$p - q + f = k + 1$$

证明. 设G的的k个支分别为 G_1 , G_2 , ..., G_k , 其中 G_i 有 p_i 个顶点, q_i 条边, f_i 个面($1 \le i \le k$)。 由欧拉公式知,

$$p_1 - q_1 + f_1 = 2$$

 $p_2 - q_2 + f_2 = 2$
...
 $p_k - q_k + f_k = 2$

以上各式相加得:

 $(p_1+p_2+\ldots+p_k)-(q_1+q_2+\ldots+q_k)+(f_1+f_2+\ldots+f_k)=2k$ 由G只有一个外部面知

$$f_1 + f_2 + \ldots + f_k = f + (k-1)$$

从而

$$p - q + f + (k - 1) = 2k$$

即

$$p - q + f = k + 1$$

习题 2. 如果G为顶点数p > 11的可平面图,试证 G^c 不是可平面图。

证明. 用反证法,假设 G^c 也是可平面图。设G有q条边,由G为可平面图知

$$q \leq 3p - 6$$

设 G^c 有 q_1 条边,由 G^c 为有p个顶点的可平面图知

$$q_1 \le 3p - 6$$

于是

$$q + q_1 \le 6p - 12$$

即

$$\frac{p(p-1)}{2} \le 6p - 12$$

$$p^2 - p \le 12p - 24$$

$$p^2 - 13p + 24 \le 0$$

当 $p \ge 11$ 时,

$$p^{2} - 13p + 24$$

$$= (p - \frac{13}{2})^{2} - \frac{169}{4} + 24$$

$$\geq (11 - \frac{13}{2})^{2} - \frac{169}{4} + 24$$

$$= \frac{81}{4} - \frac{169}{4} + 24$$

$$= 2 \geq 0$$

矛盾。

习题 3. 不存在7条棱的凸多面体。

证明. 用反证法, 假设存在7条棱的凸多面体, 其对应的平面图有p个顶点, 则

$$7 \ge 3p - 6$$

于是

$$p \ge \frac{13}{3}$$

又由每个顶点的度大于等于3知

$$3p \le 2*7$$

于是

$$p \le \frac{14}{3}$$

由于不存在正整数p使得 $\frac{13}{3} \le p \le \frac{14}{3}$ 结论得证。

习题 4. 设G为一个没有三角形的可平面图。证明G中存在一个顶点v使得 $\deg v \leq 3$ 。

证明. 当图G的顶点数p=1,2时,结论显然成立。 当 $p\geq 3$ 时,用反证法证明结论也成立。假设 $\delta(G)\geq 4$,设G有q条边,则

$$2q \ge 4p$$

于是

$$q \ge 2p$$

由G为可平面图知

$$q \le 2p - 4$$

矛盾。

习题 5. 设G为一个没有三角形的可平面图。应用数学归纳法证明G为4-可着色的。

证明. 用数学归纳法证明, 施归纳于顶点数p。

- (1) 当p=1时,结论显然成立。
- (2) 假设当 $p=k(k\geq 1)$ 时结论成立,往证当p=k+1时结论也成立。设G为包含k+1个顶点,没有三角形的可平面图知,G中存在一个顶点v, $\deg v\leq 3$ 。显然,G-v为包含k个顶点,没有三角形的可平面图,由归纳假设,G-v为4可着色的。假设已经用至S4种颜色对G-v进行了顶点着色,使得任意相邻的顶点着不同的颜色,那么此时在S0中与V0邻接的顶点用了至S3种颜色,用另外一种不同的颜色对顶点V进行着色,从而用至S4种颜色就可以对S6的顶点进行着色使得相邻的顶点着不同的颜色,即S5为4可着色的。