
AD, Bellenguez (SlopeHunter)
AD, Uffelmann new cohorts (independent)
AD, Uffelmann clinical only
KATP (KCNJ11/ABCC8), all variants
KATP without rs113264182
KATP, rs5215 (E23K proxy) alone
Glucokinase (GCK)
Beta cell, genome−wide
Beta cell −PI
Beta cell +PI
All primary T2D instruments
1.52 (1.15, 2.02) n=7
1.37 (1.01, 1.85) n=6
1.61 (0.98, 2.63) n=1
1.08 (0.96, 1.21) n=11
1.12 (0.98, 1.29) n=53
1.18 (0.94, 1.47) n=25
1.10 (0.92, 1.32) n=28
1.06 (0.93, 1.20) n=271
1.58 (1.11, 2.25) n=5
1.58 (1.11, 2.25) n=5
1.22 (0.73, 2.04) n=1
1.25 (1.09, 1.44) n=8
1.22 (1.02, 1.45) n=52
1.08 (0.81, 1.45) n=22
1.26 (1.01, 1.57) n=30
1.12 (0.98, 1.29) n=250
1.20 (0.98, 1.47) n=5
1.20 (0.98, 1.47) n=5
1.21 (0.88, 1.66) n=1
1.06 (0.98, 1.16) n=8
1.14 (1.03, 1.27) n=60
1.14 (0.98, 1.33) n=28
1.15 (1.00, 1.32) n=32
1.14 (1.04, 1.25) n=289
1
2
3
AD odds ratio per mmol/L of genetically raised 2 h glucose