
log−OR per unit
SD per SD
Type 2 diabetes
Uncorrected
SlopeHunter−corrected
−0.00 −0.00 +0.00 +0.00 −0.01 +0.02 +0.02
+0.02 +0.03 +0.03 +0.03 +0.00 +0.02 +0.02
+0.00 +0.01 −0.00
+0.04 +0.03 +0.02
BMI
Uncorrected
SlopeHunter−corrected
−0.12 −0.11 −0.11 −0.11 −0.19 −0.22 −0.15
+0.01 +0.02 +0.03 +0.03 −0.06 −0.14 −0.06
−0.02 −0.03 −0.01
+0.01 +0.00 +0.00
Lean mass
Uncorrected
SlopeHunter−corrected
−0.10 −0.10 −0.09 −0.10 −0.08 −0.06 −0.13
−0.11 −0.10 −0.10 −0.11 −0.13 −0.14 −0.14
−0.02 −0.02 −0.01
−0.02 −0.02 −0.01
Fasting glucose
Uncorrected
SlopeHunter−corrected
+0.06 +0.06 +0.07 +0.06 +0.10 +0.10 +0.32
+0.05 +0.05 +0.06 +0.05 +0.14 +0.15 +0.27
−0.01 −0.01 −0.00 −0.01
−0.01 −0.01 −0.00 −0.01
2 h glucose
Uncorrected
SlopeHunter−corrected
+0.10 +0.10 +0.11 +0.10 +0.13 +0.13 +0.13
+0.13 +0.13 +0.13 +0.15 +0.10 +0.11 +0.09
+0.01 +0.05 +0.02 +0.03
+0.03 +0.07 +0.02 +0.04
IVW−MRE
MR−PRESSO
MR−RAPS
MRBEE
Weighted median
Weighted mode
MR−Egger
MR−APSS
MR−APSS (p<5e−8)
CAUSE
MRAID
Lower risk, interval excludes 0
Higher risk, n.s.
Lower risk, n.s.
Higher risk, interval excludes 0