# **Grafos**

Grafos de sucessores

**Prof. Edson Alves** 

Faculdade UnB Gama



#### Grafos de sucessores

Um grafo G(V,E) é um grafo de sucessores se, para qualquer  $u\in V$ , o grau de saída de u é igual a 1.

#### Grafos de sucessores

Um grafo G(V,E) é um grafo de sucessores se, para qualquer  $u\in V$ , o grau de saída de u é igual a 1.

Um grafo de sucessores também é denominado grafo funcional, pois está associado a uma função succ :  $V \to V$  que define o conjunto de arestas

$$E = \{ (u, \mathsf{succ}(u)) \mid u \in V \}$$

 $\star$  Um grafo de sucessores G tem exatamente |V| arestas

 $\star$  Um grafo de sucessores G tem exatamente |V| arestas

 $\star$  Há, no mínimo, um ciclo em G

- $\star$  Um grafo de sucessores G tem exatamente |V| arestas
- $\star$  Há, no mínimo, um ciclo em G
- $\star$  De fato, G é composto por k componentes, cada um deles com ao menos um ciclo e um ou mais caminhos que levam a estes ciclos

- $\star$  Um grafo de sucessores G tem exatamente |V| arestas
- $\star$  Há, no mínimo, um ciclo em G
- $\star$  De fato, G é composto por k componentes, cada um deles com ao menos um ciclo e um ou mais caminhos que levam a estes ciclos
  - $\star$  Cada nó u tem um sucessor  $\operatorname{succ}(u)$  único


		2								
succ[u] =	4	5	3	7	2	8	1	9	6	8

							7			
succ[u] =	4	5	3	7	2	8	1	9	6	8




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
succ[u] =	4	5	3	7	2	8	1	9	6	8

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
succ[u] =	4	15	3	7	2	8	1	9	6	8




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
succ[u] =	4	5	3	7	2	8	1	9	6	8


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
succ[u] =	4	5	3	7	2	8	1	9	6	8



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
succ[u] =	4	5	3	7	2	8	1	9	6	8




	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
succ[u] =	4	15	3	7	2	8	1	9	6	8






		2								
succ[u] =	4	15	3	7	2	8	1	9	6	8






	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
succ[u] =	4	5	3	7	2	8	1	9	6	8






		2	_	•	_	_	•	_	_	
succ[u] =	4	15	3	7	2	8	1	9	6	8






		2								
succ[u] =	4	15	3	7	2	8	1	9	6	8






		2								
succ[u] =	4	15	3	7	2	8	1	9	6	8





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
succ[u] =	4	5	3	7	2	8	1	9	6	8





							7			10
succ[u] =	4	15	3	7	2	8	1	9	6	8

# *k*-ésimo sucessor

#### *k*-ésimo sucessor

Seja G um grafo de sucessores. O k-ésimo sucessor de um vértice u é definido como

$$succ(u, k) = succ^k(u) = succ(succ(...succ(u)))$$

#### k-ésimo sucessor

Seja G um grafo de sucessores. O k-ésimo sucessor de um vértice u é definido como

$$\operatorname{succ}(u,k) = \operatorname{succ}^k(u) = \underbrace{\operatorname{succ}(\operatorname{succ}(\ldots\operatorname{succ}(u)))}_{k \text{ VPZPS}}$$

# Cálculo de $\operatorname{succ}(u,k)$ em $O(\log k)$

 $\star$  A função  $\operatorname{succ}(u,k)$  pode ser computada, trivialmente, em O(k)

- $\star$  A função  $\operatorname{succ}(u,k)$  pode ser computada, trivialmente, em O(k)
- $\star$  Contudo, é possível computar  $\operatorname{succ}(u,v)$  em  $O(\log k)$

- $\star$  A função  $\operatorname{succ}(u,k)$  pode ser computada, trivialmente, em O(k)
- $\star$  Contudo, é possível computar  $\operatorname{succ}(u,v)$  em  $O(\log k)$
- $\star$  Basta pré-computar, para cada  $u\in V$ , os valores de  $\mathrm{succ}(u,2^i)$ , para cada  $i=0,1,\ldots,M$  tal que  $2^M\le k$ , por meio da recursão:

- $\star$  A função  $\operatorname{succ}(u,k)$  pode ser computada, trivialmente, em O(k)
- $\star$  Contudo, é possível computar  $\operatorname{succ}(u,v)$  em  $O(\log k)$
- $\star$  Basta pré-computar, para cada  $u\in V$ , os valores de  $\mathrm{succ}(u,2^i)$ , para cada  $i=0,1,\ldots,M$  tal que  $2^M\leq k$ , por meio da recursão:


$$\operatorname{succ}(u,2^i) = \left\{ \begin{array}{ll} \operatorname{succ}(u), & \text{se i = 0} \\ \operatorname{succ}(\operatorname{succ}(u,2^{i-1}),2^{i-1}), & \operatorname{caso contrário} \end{array} \right.$$


 $\star$  Estes valores podem ser pré-computados em  $O(|V| \log k)$ 


- $\star$  Estes valores podem ser pré-computados em  $O(|V|\log k)$
- $\star$  De posse destes valores,  $\operatorname{succ}(u,k)$  é dado por


$$\operatorname{succ}(u,k) = \operatorname{succ}(\operatorname{succ}(\operatorname{succ}(u,2^{\alpha}),2^{\beta}),\ldots),2^{\omega}),$$


onde 
$$k=2^{\alpha}2^{\beta}\dots 2^{\omega}$$














succ(u, k)






succ(u, k)







succ(u, k)




1 2 3 5 6


succ(u, k)







succ(u, k)







succ(u, k)






succ(u, k)






succ(u, k)






succ(u, k)






succ(u, k)





succ(u, k)





succ(u, k)





1 2 3 5 6

succ(u, k)



succ(u, k)







succ(u, k)





succ(u, k)







succ(u, k)







succ(u, k)







succ(u, k)







succ(u, k)







succ(u, k)







succ(u, k)





succ(u, k)








succ(u, k)















succ(u, k)







succ(u, k)





succ(u, k)






succ(u, k)



1 2 3 5 6


succ(u, k)







succ(u, k)





succ(u, k)








succ(u, k)



succ(u, k)









succ(u, k)






















succ(u, k)







succ(u, k)

























succ(u, k)







succ(u, k)















succ(u, k)







succ(u, k)







succ(u, k)







succ(u, k)





 $\mathsf{succ}(u,k)$ 














succ(u, k)










succ(u, k)























succ(u, k)

















succ(u, k)





succ(u, k)















succ(u, k)







succ(u, k)







succ(u, k)







succ(u, k)







succ(u, k)















succ(u, k)

























succ(u, k)





succ(u, k)







succ(u, k)










succ(u, k)







 $\mathsf{succ}(4,14) = \mathsf{succ}(\mathsf{succ}(4,2),4),8)$ 






 $\mathsf{succ}(4,14) = \mathsf{succ}(\mathsf{succ}(5,4),8)$ 






 $\mathrm{succ}(4,14)=\mathrm{succ}(3,8)$ 

succ(u, k)





 $\mathsf{succ}(4,14) = 1$ 

```
void precomp(int N, int M, const vector<int>& s)
    for (int u = 1; u \le N; ++u)
        S[u][0] = s[u]:
    for (int i = 1; i <= M; ++i)
        for (int u = 1; u \le N; ++u)
            S[u][i] = S[S[u][i - 1]][i - 1];
int succ(int u, int k)
{
    for (int i = 0; (1 << i) <= k; ++i)
        if (k & (1 << i))
            u = S[u][i];
    return u;
```

## Problemas sugeridos

- 1. CSES 1750 Planet Queries I
- 2. CSES 1160 Planty Queries II
- 3. USACO 2017 December Contest, Silver Problem 3: The Bovine Shuffle

## Referências

- 1. HALIM, Felix; HALIM, Steve. Competitive Programming 3, 2010.
- 2. LAAKSONEN, Antti. Competitive Programmer's Handbook, 2018.
- 2. USACO, Guide. Introduction to Functional Graphs, acesso em 21/09/2021.