Hoja para la consulta

Relevo · 25 – 31 de octubre de 2026 · preparada por Ana García el 31/10/2026

Carmen Hernández · 78 años

Condiciones: Hipertensión, Diabetes tipo 2 · Alergias: Penicilina · Sangre: O+ · Médico: Dr. Luis Pérez

PARA COMENTAR CON EL MÉDICO

- 1 caída en el periodo
- Presión promedio 134/88 mmHg (meta en casa menor de 135/85)
- Losartán: adherencia 67 % (2 dosis omitidas, 2 de 2 a las 08:00)
- Pregunta de la familia: ¿Conviene juntar la Metformina en una sola toma? Se le olvida la de la noche.
- Pregunta de la familia: ¿Le hace falta fisioterapia para la rodilla?

MEDICAMENTOS VIGENTES

Medicamento	Dosis y horario	Tomas del periodo	Omitidas
Losartán	50 mg · 08:00	4 de 6 (67 %)	2 · 2 de 2 a las 08:00
Metformina	850 mg · 08:00, 20:00	4 de 5 (80 %)	1

SIGNOS VITALES DEL PERIODO

Medición	Resumen	Fuera de rango
Presión arterial	Promedio de la última semana con lecturas: 134/88 mmHg (2 lecturas, 30 oct a 31 oct)	promedio por arriba de 135/85
Glucosa	Promedio 135 mg/dL (2 lecturas): en ayunas 135 (2)	—
Peso	68.2 kg (un solo registro; con dos se ve la tendencia)	—
Temperatura	Máxima 36.6 °C, promedio 36.6 (1)	—

CAÍDAS, INCIDENTES Y SÍNTOMAS

1 caída · 1 incidente · 1 síntoma · detalle en el anexo

INDICACIONES MÉDICAS PREVIAS

- 30/10/2026 · Dr. Luis Pérez: Si la presión sigue arriba de 140/90 toda la semana, subir Losartán a 100 mg. Glucosa en ayunas a diario; avisarme si pasa de 180.

Comentar en la consulta si se cumplieron y cómo le fue.

ANEXO: SÍNTOMAS E INCIDENTES

Fecha	Tipo	Descripción	Registró
29/10 23:05	Caída	Se resbaló en el baño; sin golpe. Revisar tapete antiderrapante.	Marta López
30/10 22:15	Síntoma	Se quejó de dolor en la rodilla derecha al caminar. Se aplicó compresa tibia.	Marta López