



离散数学


Discrete Mathematics

第2讲 命题逻辑 Propositional Logic (3)

■■■■■

我的命题仅仅是‘如果…那么…’，
并且我的成功仅在于用漂亮的链，
把两个疑虑连接：因为问也徒劳。
如果我的假设是成立的，
或者我所证明的是具有事实的根据，
桥还是存在的，人不必在两侧都爬行，
这样就取得了胜利。
这个摆弄微弱阴影的游戏，
并不需要多少力气，
多么脆弱的魔棍，
却又具有多么深厚的魅力。

——C. R. Wylie, Jr



Histories make men wise; poets, witty; the
mathematics, subtle; natural philosophy,
deep; moral, grave; logic and rhetoric, able
to contend.

——*Bacon Francis*

2.5 推理演算

► 演绎推理

数理逻辑中，应用公认的推理规则 (Rules of Inference) 从一些前提 (Premise) 中推导出结论来时，这种推导过程称之为演绎推理 (Deduction) 或形式证明 (Formal Proof)。

Deductive Reasoning vs. Inductive Reasoning

2.5 推理演算

1 推理形式

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$ 都是命题公式。称由前提 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 推出 β 的推理是**有效的**或**正确的**，并称 β 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的**有效结论**或**逻辑结果** (Logical Consequence)，

当且仅当

$(\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n) \rightarrow \beta$ 是永真式

记为 $\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \dots \wedge \alpha_n \Rightarrow \beta$ 或 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \Rightarrow \beta$ (称为**重言蕴含**或**推理形式**)

2.5 推理演算

示例：教材例1.18 写出下述推理关系的推理形式：“下午小王或去看电影或去游泳。他没去看电影。所以，他去游泳了。”

解 设 P ：小王下午去看电影； Q ：小王下午去游泳。于是得到如下推理形式：

前提： $P \vee Q, \neg P$

结论： Q

推理形式为： $(P \vee Q) \wedge \neg P \Rightarrow Q$

2.5 推理演算

讨论



- ▶ 符号 \Rightarrow 与 \rightarrow 是两个完全不同的符号？
- ▶ 推理有效，则所得结论就真实吗？推理是有效的话，那么不可能有：它的前提都为真时而它的结论为假，对吗？
- ▶ 可以用真值表在有限步内判定一个结论是否是前提的有效逻辑结论吗？
- ▶ 推理方法还有那些？
 - 动态推理方法：
公理+推理规则：演绎推理

等值公式（用于等价变换或蕴含推理）以及以下蕴含推理定律构成了演绎推理基本公理

2 推理定律——公理

有如下蕴含推理式（ α 、 β 、 γ 均为任意命题公式）：

I_1 合取引入规则 $\alpha, \beta \Rightarrow \alpha \wedge \beta$

I_2 简化规则 $\alpha \wedge \beta \Rightarrow \alpha, \quad \alpha \wedge \beta \Rightarrow \beta$

I_5 $\neg(\alpha \rightarrow \beta) \Rightarrow \alpha, \quad \neg(\alpha \rightarrow \beta) \Rightarrow \neg \beta$

I_3 附加规则 $\alpha \Rightarrow \alpha \vee \beta, \quad \beta \Rightarrow \alpha \vee \beta$

I_4 $\neg \alpha \Rightarrow \alpha \rightarrow \beta, \quad \beta \Rightarrow \alpha \rightarrow \beta$

I_6 $\alpha \rightarrow \beta \Rightarrow (\alpha \vee \gamma) \rightarrow (\beta \vee \gamma),$
 $\alpha \rightarrow \beta \Rightarrow (\alpha \wedge \gamma) \rightarrow (\beta \wedge \gamma)$

2.5 推理演算

I₇ **假言推理** (又称分离规则) $a \wedge (a \rightarrow \beta) \Rightarrow \beta$

I₈ **拒取式** (否定后件式) $\neg \beta \wedge (a \rightarrow \beta) \Rightarrow \neg a$

I₉ **析取三段论** $(a \vee \beta) \wedge \neg \beta \Rightarrow a$

I₁₁ **二难推理** $(a \rightarrow \gamma) \wedge (\beta \rightarrow \gamma) \wedge (a \vee \beta) \Rightarrow \gamma$

I₁₀ **假言三段论** $(a \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \gamma) \Rightarrow (a \rightarrow \gamma)$

I₁₂ **等价三段论** $(a \leftrightarrow \beta) \wedge (\beta \leftrightarrow \gamma) \Rightarrow (a \leftrightarrow \gamma)$

I₁₃ $(a \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow a) \Rightarrow (a \leftrightarrow \beta)$

$a \leftrightarrow \beta \Rightarrow a \rightarrow \beta, \quad a \leftrightarrow \beta \Rightarrow \beta \rightarrow a$

3 推理规则

- 前提引入 (P)
- 结论引用 (T)
- 置换规则 (R)
- 代入规则 (S)

2.5 推理演算

4 动态推理方法

- 直接证明

2.5 推理演算

4 动态推理方法

● 直接证明

示例 证明 $(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow S) \Rightarrow S \vee R$

证明

(1)	$P \vee Q$	P
(2)	$\neg P \rightarrow Q$	R, E, (1)
(3)	$Q \rightarrow S$	P
(4)	$\neg P \rightarrow S$	T, I, (2), (3)
(5)	$\neg S \rightarrow P$	R, E, (4)
(6)	$P \rightarrow R$	P
(7)	$\neg S \rightarrow R$	T, I, (5), (6)
(8)	$S \vee R$	R, E, (7)

2.5 推理演算

练习：构造下列推理的证明

前提： $A \vee B$, $B \rightarrow C$, $A \rightarrow D$, $\neg D$, 结论： $C \wedge (A \vee B)$

解 根据合取引入规则，因为已经有前提 $A \vee B$ ，所以只要推出结论 C 即可

:

- | | | |
|-------|-------------------|--------------|
| (1) | $A \rightarrow D$ | P |
| (2) | $\neg D$ | P |
| (3) | $\neg A$ | T, I (1) (2) |
| ((4)) | $A \vee B$ | P |
| (5) | B | T, I (3) (4) |
| (6) | $B \rightarrow C$ | P |
| (7) | C | T, I (5) (6) |



2.5 推理演算

- 间接证明

2.5 推理演算

●间接证明

反证法?

矛盾法/(Proof by Contradiction)

设 α , β 是命题公式, 则 $\alpha \Rightarrow \beta$ 的充要条件是 $\alpha \wedge \neg \beta$ 是矛盾式。

2.5 推理演算

示例 证明 $P \rightarrow \neg Q$, $Q \vee \neg R$, $R \wedge \neg S \Rightarrow \neg P$

证明 用反证法。

(1)	$\neg(\neg P)$	P(附加)
(2)	P	R, E, (1)
(3)	$P \rightarrow \neg Q$	P
(4)	$\neg Q$	T, I, (2), (3)
(5)	$Q \vee \neg R$	P
(6)	$\neg R$	T, I, (4), (5)
(7)	$R \wedge \neg S$	P
(8)	R	T, I, (7)
(9)	$R \wedge \neg R$	T, I, (6), (8), 矛盾

因此，假设不成立，原推理形式正确。

2.5 推理演算

▶ CP规则 (Rule of Condition Proof)

演绎定理

$$\begin{aligned} & (\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \cdots \wedge \alpha_k \wedge \alpha) \Rightarrow \beta \quad \text{当且仅当} \\ & (\alpha_1 \wedge \alpha_2 \wedge \cdots \wedge \alpha_k) \Rightarrow \alpha \rightarrow \beta. \end{aligned}$$

利用演绎定理，许多命题公式，特别是蕴涵式的证明可得到简化，可将蕴涵式的前件作为前提引入来进行证明。

2.5 推理演算

示例 验证下述推理是否正确。

或者逻辑学难学，或者有多数学生喜欢它；如果数学容易学，那么逻辑学并不难学。因此如果许多学生不喜欢逻辑，那么数学并不容易学。

解 先将命题符号化，首先抽取的基本命题包括：P：逻辑学难学； Q：有多数学生喜欢逻辑学； R：数学容易学。

则上述推理形式化为：

前提： $P \vee Q, R \rightarrow \neg P$

结论： $\neg Q \rightarrow \neg R$

2.5 推理演算

证明: $P \vee Q, R \rightarrow \neg P \Rightarrow \neg Q \rightarrow \neg R$

(1) $\neg Q$

P (附加)

(2) $P \vee Q$

P

(3) P

T, I, (1), (2)

(4) $R \rightarrow \neg P$

P

(5) $\neg R$

T, I, (3), (4)

(6) $\neg Q \rightarrow \neg R$

CP

根据CP规则, 整个推理正确。

练习

在某一次足球比赛中，四支球队进行了比赛，已知情况如下，问结论是否有效？

前提：若A队得第一，则B队或C队获亚军；

若C队获亚军，则A队不能获冠军；

若D队获亚军，则B队不能获亚军；

A 队获第一。

结论： D队不是亚军。

首先符号化

令 P: A 队获冠军； Q: B 队获亚军； R: C 队获亚军； S: D 队获亚军，则

前提： $P \rightarrow (Q \vee R)$, $R \rightarrow \neg P$, $S \rightarrow \neg Q$, P

结论： $\neg S$

推理形式： $P \rightarrow (Q \vee R)$, $R \rightarrow \neg P$, $S \rightarrow \neg Q$, $P \Rightarrow \neg S$

首先符号化

令 P : A 队获冠军; Q : B 队获亚军; R : C 队获亚军; S : D 队获亚军, 则

前提: $P \rightarrow (Q \vee R)$, $R \rightarrow \neg P$, $S \rightarrow \neg Q$, P

结论: $\neg S$

推理形式: $P \rightarrow (Q \vee R)$, $R \rightarrow \neg P$, $S \rightarrow \neg Q$, $P \Rightarrow \neg S$

证明: (1) P	P
(2) $P \rightarrow (Q \vee R)$	P
(3) $Q \vee R$	$T, I, (1), (2)$
(4) $R \rightarrow \neg P$	P
(5) $P \rightarrow \neg R$	$R, E, , (4)$
(6) $\neg R$	$T, I, (1), (5) $
(7) Q	$T, I, (3), (6)$
(8) $S \rightarrow \neg Q$	P
(9) $Q \rightarrow \neg S$	$R, E, , (8)$
(10) $\neg S$	$T, I, (7), (9)$

因此, 该结论是有效的。

命题逻辑 小结

▶ 知识要点

- 命题、联接词
- 命题公式、命题公式的类型
- 等值公式、等值演算
- 范式
- 推理演算

- ✓ 运算表与真值表：析取、蕴含
- ✓ 等值式
- ✓ 代入定理
- ✓ 置换定理
- ✓ 对偶定理
- ✓ 演绎定理

- ✓ 主范式
- ✓ 演绎推理
- ✓ 推理规则
- ✓ 推理定律
- ✓ 推理方法