



# 工程硕士生“概率论与随机过程”考试大纲

## 第一部分：概率论

1. 理解条件概率的定义，会灵活运用乘法公式；
2. 了解两个事件相互独立与互不相容的概念，能推广到 $n$ 维的情形；
3. 理解二维离散型随机变量的联合分布和边缘分布，联合分布函数和边缘分布函数的概念。就离散型、连续型情形理解条件分布函数的定义，就连续型情形会求其条件概率密度函数；
4. 掌握随机变量函数的分布函数的计算方法，就连续型情形会求随机变量函数的分布密度函数；
5. 深刻理解条件数学期望的定义，掌握其求法。了解随机变量函数的条件数学期望和条件方差的计算方法；
6. 理解特征函数的定义，熟练掌握两点分布、二项分布、泊松分布、均匀分布及正态分布特征函数的计算，了解特征函数的性质；
7. 理解母函数的定义，掌握二项分布、泊松分布及几何分布的母函数的计算，了解母函数的性质。



## 工程硕士生“概率论与随机过程”考试大纲（续）

### 第二部分：随机过程

#### 第一章：随机过程的概念及统计特征

- 1.** 理解随机过程的基本概念，知道样本函数、状态空间的定义；
- 2.** 了解随机过程一维分布函数、分布密度的定义，知道推广到 $n$ 维的情形；
- 3.** 掌握随机过程的数字特征：均值函数、方差函数、自相关函数、自协方差函数、互相关函数、互协方差函数。熟练掌握均值函数和相关函数的求法；
- 4.** 了解二阶矩过程、正交增量过程、马尔可夫过程、独立增量过程、平稳增量过程、正态随机过程、泊松过程、维纳过程、平稳过程的定义及性质；
- 5.** 知道两随机过程互不相关和相互正交的概念。

### 第三章：泊松过程

- 1.** 理解计数过程的概念，深刻理解泊松过程的两种定义，理解其等价的基本思想；
- 2.** 掌握泊松过程的数字特征；
- 3.** 掌握泊松过程的时间间隔与等待时间的分布，掌握泊松过程的到达时间的条件分布，会简单地用于解决实际问题。
- 4.** 了解非齐次泊松过程和复合泊松过程的基本概念。



## 工程硕士生“概率论与随机过程”考试大纲（续）

### 第二章：马尔可夫链

1. 深入理解马氏链、一步转移概率的概念，掌握随机矩阵的定义，会就实际问题求出一步转移概率矩阵；
2. 理解初始概率和绝对概率（初始概率向量和绝对概率向量）的概念，能利用**C-K**方程求 $n$ 步转移概率矩阵和绝对概率向量；
3. 理解马氏链的状态常返（正常返、零常返）、非常返及遍历状态的概念，了解闭集的定义和不可约马氏链的性质，掌握其判别法。已知状态空间和一步转移概率矩阵能熟练地判别状态的常返、非常返性，并能将状态空间进行分解；
4. 理解马氏链的遍历性，掌握 $n$ 步转移概率的渐进性质及平稳分布的求法，知道平稳分布与各状态平均返回时间的关系。

### 第五章：连续时间的马氏过程

1. 深刻理解连续时间马尔可夫链的定义；
2. 理解 $Q$ 矩阵的定义，了解向前向后方程的思想，了解连续时间马氏链转移概率的极限性质及其与平稳分布的关系，会运用其解决简单的实际问题；
3. 了解生灭过程的概念。

### 第六章：平稳随机过程

- 1.** 理解宽平稳过程（以下简称平稳过程）的概念，了解其与严平稳过程的差别；就各种情形能熟练地判断已知随机过程是否为平稳过程；
- 2.** 了解两随机过程联合平稳的概念，会求互相关函数；
- 3.** 了解随机序列几乎处处收敛、依概率收敛、依 $r$ 阶矩收敛及依分布收敛的定义，知道这四种收敛性之间的关系。了解均方收敛、均方连续、均方可导、均方可积的概念及判别准则；
- 4.** 理解平稳过程的各态历经性，根据均值和相关函数的各态历经性，能判别平稳过程是否具有各态历经性。



## 工程硕士生“概率论与随机过程”考试大纲（续）

### 第五章：平稳过程的谱分析

- 1.** 了解平稳过程的平均功率和功率谱密度的概念，会求平均功率；
- 2.** 理解功率谱密度的性质，知道功率谱密度和相关函数构成一对付氏变换函数，并能利用此关系相互求解；
- 3.** 了解窄带随机过程和白噪声过程，知道 $\delta$ 函数的性质。




**例1** 设系统 $L$ 由两个相互独立的子系统 $L_1$ 、 $L_2$ 联接而成，联接的方式分别是(1)串联，(2)并联，(3)备用（当系统 $L_1$ 损坏时，系统 $L_2$ 开始工作），如右图所示。设 $L_1$ 、 $L_2$ 的寿命分别为 $X$ 、 $Y$ ，已知它们的概率密度分别为：

$$f_X(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \beta e^{-\beta y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$

其中 $\alpha > 0$ ， $\beta > 0$ 且 $\alpha \neq \beta$ ，试分别以上述三种联接方式写出 $L$ 的寿命 $Z$ 的概率密度。





解：(1) 串联，当  $L_1$ 、 $L_2$  中有一个损坏时，系统  $L$  就停止工作，因此寿命  $Z = \min(X, Y)$ 。

$$F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-\beta y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$

由  $X$ 、 $Y$  彼此相互独立，则  $Z = \min(X, Y)$  的分布函数  $F_Z(z)$  为：

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = 1 - P\{Z > z\} = 1 - P\{X > z, Y > z\} \\ &= 1 - P\{X > z\} \cdot P\{Y > z\} = 1 - [1 - F_X(z)] \cdot [1 - F_Y(z)] \\ &= \begin{cases} 1 - e^{-(\alpha + \beta)z} & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

则  $Z$  的概率密度为： $f_{\min(X, Y)}(z) = f_Z(z) = \begin{cases} (\alpha + \beta)e^{-(\alpha + \beta)z} & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$

解：(2)并联，当且仅当 $L_1$ 、 $L_2$ 都损坏时，系统 $L$ 才停止工作，因此寿命 $Z=\max(X,Y)$ 。

$$\therefore F_X(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\alpha x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad F_Y(y) = \begin{cases} 1 - e^{-\beta y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$

由 $X$ 、 $Y$ 彼此相互独立，则 $Z=\max(X,Y)$ 的分布函数 $F_Z(z)$ 为：

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P\{Z \leq z\} = P\{X \leq z, Y \leq z\} = P\{X \leq z\} \cdot P\{Y \leq z\} \\ &= F_X(z) \cdot F_Y(z) = \begin{cases} (1 - e^{-\alpha z})(1 - e^{-\beta z}) & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

则 $Z$ 的概率密度为：

$$f_{\max(X,Y)}(z) = f_Z(z) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha z} + \beta e^{-\beta z} - (\alpha + \beta)e^{-(\alpha + \beta)z} & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$$

解：(3)备用的情况，当 $L_1$ 损坏时 $L_2$ 才开始工作，因此寿命

$Z=X+Y$ ，因此，当 $z > 0$ 时：

$$\because f_X(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} \beta e^{-\beta y} & y > 0 \\ 0 & y \leq 0 \end{cases}$$

$X$ 、 $Y$ 彼此相互独立，当 $z > 0$ 时 $Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$ 为：

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(z-y) \cdot f_Y(y) dy = \int_0^z \alpha e^{-\alpha(z-y)} \cdot \beta e^{-\beta y} dy \\ &= \alpha \beta e^{-\alpha z} \int_0^z e^{-(\beta-\alpha)y} dy = \frac{\alpha \beta}{\beta - \alpha} [e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}] \end{aligned}$$

当 $z \leq 0$ 时 $Z=X+Y$ 的概率密度 $f_Z(z)=0$ ，则 $Z=X+Y$ 的概率密度为

$$f_Z(z) = \begin{cases} \frac{\alpha \beta}{\beta - \alpha} [e^{-\alpha z} - e^{-\beta z}] & z > 0 \\ 0 & z \leq 0 \end{cases}$$

**例2** 设二维随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为：

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$


定义：  $U = \sqrt{X^2 + Y^2}$  ,  $V = Y$  , 求：

(1)  $(U, V)$  的概率密度  $g(u, v)$ ;

(2) 求  $U$  的边缘概率密度  $g_U(u)$ 。

解：(1): 
$$\begin{cases} U = \sqrt{X^2 + Y^2} \\ V = Y \end{cases}, \text{ 则: } \begin{cases} x = \pm \sqrt{u^2 - v^2} \\ y = v \end{cases} \quad |v| \leq u$$

$$\text{则: } J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \pm \frac{u}{\sqrt{u^2 - v^2}} & \mp \frac{v}{\sqrt{u^2 - v^2}} \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = \pm \frac{u}{\sqrt{u^2 - v^2}}$$




故:  $g(u, v) = f(x, y) |J| = \begin{cases} \frac{1}{\pi\sigma^2} e^{-\frac{u}{2\sigma^2}} \frac{u}{\sqrt{u^2 - v^2}}, & |v| \leq u, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

对  $u > 0$ ,  $g_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} g(u, v) dv$

$$= \int_{-u}^u \frac{1}{\pi\sigma^2} e^{-\frac{u}{2\sigma^2}} \frac{u}{\sqrt{u^2 - v^2}} dv$$

$$= \frac{u}{\pi\sigma^2} e^{-\frac{u}{2\sigma^2}} \int_{-u}^u \frac{1}{\sqrt{u^2 - v^2}} dv = \frac{u}{\sigma^2} e^{-\frac{u}{2\sigma^2}}$$

所以:  $g_U(u) = \begin{cases} \frac{u}{\sigma^2} e^{-\frac{u}{2\sigma^2}}, & u > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$




例3 设二维随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为:

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2(1-\rho^2)}(x^2+y^2-2\rho xy)}, 0 < \rho < 1$$

求  $U = X / Y$  的概率密度  $f_U(u)$ 。

解: 令:  $\begin{cases} U = X / Y \\ V = Y \end{cases}$ , 则:  $\begin{cases} x = uv \\ y = v \end{cases}$ , 则:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} v & u \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = v$$




则:  $\varphi(u, v) = f(x(u, v), y(u, v))|J|$

$$= \frac{1}{2\pi\sigma^2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2(1-\rho^2)}(u^2-2\rho u+1)v^2} |v|, u, v \in R$$

关于  $U$  的边缘概率密度函数  $f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(u, v) dv$

$$\begin{aligned} &= 2 \int_0^{+\infty} \frac{v}{2\pi\sigma^2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2(1-\rho^2)}(u^2-2\rho u+1)v^2} dv \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma^2\sqrt{1-\rho^2}} \cdot \frac{2\sigma^2(1-\rho^2)}{u^2-2\rho u+1} \\ &= \frac{\sqrt{1-\rho^2}}{\pi(u^2-2\rho u+1)}, \quad u \in R \end{aligned}$$





例4 设二维随机变量的概率密度  $f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < x < 1, 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$

求:  $E[E[Y | X]]$


解: 
$$\begin{aligned} E[E[Y | X]] &= E(Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} y f_Y(y) dy = \int_{-\infty}^{+\infty} y \left( \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \right) dy \\ &= \int_0^x y \left( \int_0^1 f(x, y) dx \right) dy = \int_0^1 \left( \int_0^x y f(x, y) dy \right) dx = \int_0^1 \left( \int_0^x 2y dy \right) dx = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

**例5** 设 $X \sim U(0,1)$ ,  $Y$ 服从参数为1的指数分布,  $X$ 与 $Y$ 相互独立, 求 $E[X+Y|X]$ 。

**解法1:** 由 $X$ 与 $Y$ 相互独立, 有:  $E[Y|X]=E[Y]$   
 $E[X+Y|X] = E[X|X] + E[Y|X] = X + E[Y] = X + 1$

**解法2:** 令:  $\begin{cases} U = X + Y \\ V = X \end{cases}$ , 则:  $\begin{cases} x = v \\ y = x - v \end{cases}$ , 则:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1$$


$$\text{又: } f(x, y) = \begin{cases} e^{-y} & 0 < x < 1, y > 0 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

$$\text{则: } \varphi(u, v) = \begin{cases} e^{v-u} & 0 < v < 1, u > v \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

当  $0 < v < 1$  时

$$\begin{aligned} \varphi_{U|V}(u|v) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\varphi(u, v)}{\varphi_V(v)} dv \\ &= \begin{cases} e^{v-u} & u > v \\ 0 & \text{其它} \end{cases} \end{aligned}$$

$$\text{则: } E[U|V=v] = \int_{-\infty}^{+\infty} u \varphi_{U|V}(u|v) du = \int_v^{+\infty} u e^{v-u} du = v + 1$$

$$\text{所以: } E[X+Y|X] = X + 1$$



例6 设  $(U, V)$  的概率密度为:

$$g(u, v) = \begin{cases} e^{-u}, & u - v > 0, v > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求  $E(I_{\{V>1\}} | U = 10)$ , 其中  $I_{\{V>1\}}(\omega) = \begin{cases} 1, & \omega \in \{V > 1\} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

(2) 求  $D(V | U)$

解:  $U$  的边缘概率密度为:

$$g_U(u) = \int_0^u g(u, v) dv = \begin{cases} \int_0^u e^{-u} dv, & u > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} = \begin{cases} ue^{-u}, & u > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



所以条件概率:


$$g_{V|U}(v|u) = \frac{g(u,v)}{g_U(u)} = \begin{cases} \frac{1}{u}, & 0 < v < u \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

$$(1) E(I_{\{V>1\}} | U=10) = 1 \cdot P(V > 1 | U=10)$$

$$= \int_1^{10} g_{V|U}(v|u=10)dv = \int_1^{10} \frac{1}{10} dv = \frac{9}{10}$$

$$(2) \text{ 因为 } E(V | U=u) = \frac{u}{2}, \quad E(V^2 | U=u) = \frac{u^2}{3},$$

$$D(V | U=u) = \frac{u^2}{12}, \quad \text{所以: } D(V | U) = \frac{U^2}{12}$$



例7  $X \sim B(n, p)$ ,  $Y \sim \pi(\lambda)$ , 且 $X$ 与 $Y$ 相互独立, 计算  
 $X + Y$ 的特征函数。

解:  $\because X \sim B(n, p)$ , 则:  $\varphi_X(t) = (q + pe^{it})^n$ , 其中  $q = 1 - p$

又  $\because Y \sim \pi(\lambda)$ , 则:  $\varphi_Y(t) = e^{(e^{it}-1)\lambda}$ , 且 $X$ 与 $Y$ 相互独立

则:  $\varphi_{X+Y}(t) = \varphi_X(t) \cdot \varphi_Y(t) = (q + pe^{it})^n \cdot e^{(e^{it}-1)\lambda}$  ?

**例8** 设 $\xi, \eta$ 为离散且相互独立的随机变量，其分布律为：

$\xi$	0	1	2
$P_i$	1/2	3/8	1/8

$\eta$	0	1	
$P_j$	1/3	2/3	

用特征函数的性质求 $\zeta = \xi + 2\eta$ 的分布律以及 $E(\zeta)$ 。

解：设 $\varphi_{\xi}(t) = E[e^{i\xi t}] = e^{i0t} \cdot \frac{1}{2} + e^{i1t} \cdot \frac{3}{8} + e^{i2t} \cdot \frac{1}{8}$

$$= \frac{1}{2} + \frac{3}{8}e^{it} + \frac{1}{8}e^{2it}$$

$$\varphi_{2\eta}(t) = E[e^{i2\eta t}] = e^{i0t} \cdot \frac{1}{3} + e^{i2t} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}e^{2it}$$



由  $\xi, \eta$  独立, 则  $\xi, 2\eta$  也相互独立, 则:

$$\varphi_{\zeta}(t) = \varphi_{\xi}(t) \cdot \varphi_{2\eta}(t) = \frac{1}{6} + \frac{1}{8}e^{it} + \frac{9}{24}e^{2it} + \frac{1}{4}e^{3it} + \frac{1}{12}e^{4it}$$


则:

$\zeta$	0	1	2	3	4
$P$	1/6	1/8	9/24	1/4	1/12

$$\text{于是, } \varphi_{\zeta}'(t) = \left( \frac{1}{8}e^{it} + \frac{9}{12}e^{2it} + \frac{3}{4}e^{3it} + \frac{1}{3}e^{4it} \right) i$$

$$\text{则: } \varphi_{\zeta}'(0) = \left( \frac{1}{8} + \frac{9}{12} + \frac{3}{4} + \frac{1}{3} \right) i = \frac{47}{24}i$$

$$\text{所以: } E(\zeta) = (-i)\varphi_{\zeta}'(0) = \frac{47}{24}$$



**例9** 设随机过程 $X(t) = \sin(\omega t + \Theta)$ ,  $t \in \mathbf{R}$ , 其中 $\omega$ 为常数,

$\Theta \sim U\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ , 计算随机过程 $X(t)$ 的分布密度函数 $f(x; 0)$ 。

解: 当 $t = 0$ ,  $X(t) = \sin \Theta$

$$\text{则: } F_X(x) = P\{\sin \Theta \leq x\} = \begin{cases} P\{\Theta \leq \arcsin x\} & -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & x < -1 \\ 1 & x > 1 \end{cases}$$

$$\therefore f(x; 0) = f_X(x) = f(\theta) \left| \frac{d\theta}{dx} \right| = \begin{cases} \frac{1}{\pi} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} & -1 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

**2.14** 设随机过程  $Y_n = \sum_{j=1}^n X_j$  , 其中  $X_j (j=1, 2, \dots, n)$  是相互独立的随机变量, 且:

$P(X_j = 1) = p, P(X_j = 0) = 1 - p = q$  , 求  $Y_n (n=1, 2, \dots)$  的均值和协方差函数。

解:  $Y_n (n=1, 2, \dots)$  的均值函数为:  $E(Y_n) = E\left(\sum_{j=1}^n X_j\right) = \sum_{j=1}^n E(X_j) = \sum_{j=1}^n (1 \cdot p + 0 \cdot q) = np$

而:  $E(X_i X_j) = \begin{cases} p^2, i \neq j \\ p, i = j \end{cases}$  , 则  $Y_n (n=1, 2, \dots)$  的协方差函数为:

$$B_Y(n, m) = E\left[\sum_{j=1}^n X_j - np\right]\left[\sum_{k=1}^m X_k - mp\right] = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m E(X_j X_k) - mnp^2$$

当  $m \leq n$  时,  $\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m E(X_j X_k) = \sum_{j=k} E(X_j X_k) + \sum_{j \neq k} E(X_j X_k) = mp + (mn - m)p^2 = mpq + mnp^2$

同理当  $m > n$  时,  $\sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m E(X_j X_k) = \sum_{j=k} E(X_j X_k) + \sum_{j \neq k} E(X_j X_k) = np + (mn - n)p^2 = npq + mnp^2$

则:  $B_Y(n, m) = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^m E(X_j X_k) - mnp^2 = \min(m, n) pq$

**例11** 设时间区间  $(0, t]$  内到达某商店门口的顾客数  $N(t)$  是强度为  $\lambda (\lambda > 0)$  的泊松过程。每个到达商店门口的顾客以概率  $p$  进入商店，以概率  $1-p$  不进入商店，且假设各个顾客进入商店与否相互独立。以  $N_1(t)$  表示  $(0, t]$  内进入该商店的顾客数，求：

- (1)  $P\{N_1(t) = k\}, k = 0, 1, \dots, t \in (0, T]$ ;
- (2) 若以  $X_i$  表示进入商店的第  $i$  个顾客花费的钱数，并假设  $X_1, X_2, \dots$  相互独立，且服从  $N(0, 100)$  的均匀分布，求该商店在  $(0, T]$  内平均销售额。

解 (1) 对于  $t \in (0, T]$

$$\begin{aligned} P\{N_1(t) = k\} &= \sum_{n=k}^{\infty} P\{N(t) = n\} P\{N_1(t) = k \mid N(t) = n\} \\ &= \sum_{n=k}^{\infty} \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} = \frac{(\lambda p t)^k}{k!} e^{-\lambda p t} \end{aligned}$$

(2) 该商店在 $(0, T]$ 内销售额为 $X_1 + X_2 + \cdots + X_{N_1(T)}$ ,

所以平均销售额为:

$$\begin{aligned} & E[X_1 + X_2 + \cdots + X_{N_1(T)}] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} P(N_1(T) = n) E[X_1 + X_2 + \cdots + X_{N_1(T)} \mid N_1(T) = n] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} P(N_1(T) = n) E[X_1 + X_2 + \cdots + X_n \mid N_1(T) = n] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda p T)^n}{n!} e^{-\lambda p T} E[X_1 + X_2 + \cdots + X_n] \\ &= 50 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda p T)^n}{n!} e^{-\lambda p T} n = 50 \lambda p T \end{aligned}$$

也可由定理3.6  
直接得结论

**例12** 将2个红球4个黑球任意地分别放入甲乙两个盒子中，每个盒子放 3个，现从每个盒子中任取一球，交换后放回盒中，以  $X(n)$  表示经过  $n$  次交换后 甲盒中红球数，则  $\{X_n, n \geq 0\}$  为一齐次马尔可夫链，试求其一步转移 概率矩阵。

**解:** (1) 根据题意,  $I = \{0, 1, 2\}$

$p_{00}$  表示甲盒中原有 0 个红球，经过一次交换后仍然 0 个红球，当且仅当 下次交换从乙盒的 2 红 1 黑中抽到黑球（从甲盒中必然抽中黑球），即：  $p_{00} = \frac{1}{3}$ ;

$p_{01}$  表示甲盒中原有 0 个红球，经过一次交换后有 1 个红球，当且仅当下 次交换从乙盒的 2 红 1 黑中抽中红球（从甲盒中必然抽中黑球），即：  $p_{01} = \frac{2}{3}$

$$p_{02} = 1 - p_{00} - p_{01} = 0$$



**例12** 将2个红球4个黑球任意地分别放入甲乙两个盒子中，每个盒子放 3个，  
现从每个盒子中任取一球，交换后放回盒中，以  $X(n)$  表示经过  $n$  次交换后 甲  
盒中红球数，则  $\{X_n, n \geq 0\}$  为一齐次马尔可夫链，试求其一步转移 概率矩阵。

**续解:**  $p_{10}$  表示甲盒中原来有一个红球，经过一次交换以后无红球，当且仅当：  
下次抽球时从乙盒的 1红 2黑中抽到的是黑球同时从甲盒中抽中了原来的那 1个

红球，因此：
$$p_{10} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9},$$

同理： $p_{11}$  表示甲盒中原来有一个红球，经过一次交换以后仍然只有 1个红球，  
当且仅当两种情况：下次抽球时从乙盒的 1红 2黑中抽中的是黑球同时从甲盒  
中抽中的也是黑球；或者下次抽球时从乙盒的 1红 2黑中抽中的是红球同时 从

甲盒中抽中的也是红球，因此：
$$p_{11} = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{9},$$
 于是：
$$p_{12} = 1 - p_{10} - p_{11} = \frac{2}{9}$$

**例12** 将2个红球4个黑球任意地分别放入甲乙两个盒子中，每个盒子放 3个，  
 现从每个盒子中任取一球，交换后放回盒中，以  $X(n)$  表示经过  $n$  次交换后 甲  
 盒中红球数，则  $\{X_n, n \geq 0\}$  为一齐次马尔可夫链，试求其一步转移 概率矩阵。

**续解：**同第一行，有：  $p_{20}=0$

$p_{21}$  甲盒中原有2个红球，经过一次交换后只有 1个红球，当且仅当下次抽 球  
 从甲盒中抽中1个红球且从乙盒中抽中黑球，即：  $p_{21} = \frac{2}{3}$

$p_{22}$  甲盒中原有2个红球，经过一次交换后仍然有 2个红球，当且仅当下次 抽  
 球从甲盒中抽中1个黑球（乙盒中只能抽中黑球），因此：  $p_{22} = \frac{1}{3}$


则一步转移概率矩阵为：

$$P = \begin{pmatrix} p_{00} & p_{01} & p_{02} \\ p_{10} & p_{11} & p_{12} \\ p_{20} & p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 \\ 2/9 & 5/9 & 2/9 \\ 0 & 2/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

**例13** 设有限齐次马尔可夫链的状态空间为  $I = \{1, 2, 3\}$ , 一

步转移概率矩阵为  $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 1/4 & 1/2 & 1/4 \end{pmatrix}$ , 求  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{23}^{(n)}$ 。

解:



由状态转移图知:  
**1**为常返态, **2、3**为非常返态

则:  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_{23}^{(n)} = 0$

**例14** 设一质点在1,2,3点上作随机游动, 若在时刻  $t$  质点位于这三个点之一, 在  $[t, t+h)$  内, 它以概率  $\frac{1}{2}h + o(h)$

分别转移到其它二点之一, 试求质点随机游动的柯尔莫哥洛夫方程, 转移概率  $p_{ij}(t)$  及平稳分布。

**解:** 由题意有:  $p_{ij}(h) = \frac{1}{2}h + o(h) (j \neq i)$

再由定理5.3, 得:

$$q_{ii} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1 - p_{ii}(\Delta t)}{\Delta t} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{j \neq i} p_{ij}(h)}{h} = 1$$

$$q_{ij} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{p_{ij}(\Delta t)}{\Delta t} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{p_{ij}(h)}{h} = \frac{1}{2}$$

$$Q = \begin{bmatrix} -1 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1 \end{bmatrix}$$

则由 5.11 式，柯尔莫哥洛夫向前方程为：

$$P'(t) = P(t)Q$$

$$\text{即: } \begin{bmatrix} p'_{11}(t) & p'_{12}(t) & p'_{13}(t) \\ p'_{21}(t) & p'_{22}(t) & p'_{23}(t) \\ p'_{31}(t) & p'_{32}(t) & p'_{33}(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p_{11}(t) & p_{12}(t) & p_{13}(t) \\ p_{21}(t) & p_{22}(t) & p_{23}(t) \\ p_{31}(t) & p_{32}(t) & p_{33}(t) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{而: } \sum_{j=1}^3 p_{ij}(t) = 1 (i=1, 2, 3)$$

所以：

$$\begin{aligned} p'_{ij}(t) &= -p_{ij}(t) + \frac{1}{2} [p_{i,j-1}(t) + p_{i,j+1}(t)] \\ &= -p_{ij}(t) + \frac{1}{2} [1 - p_{ij}(t)] = -\frac{3}{2} p_{ij}(t) + \frac{1}{2} (i, j \in I, \text{ 其中 } I = \{1, 2, 3\}) \end{aligned}$$

$$\text{则上述一阶线性微分方程的解为: } p_{ij}(t) = ce^{-\frac{3}{2}t} + \frac{1}{3}$$

由初始条件：

$$p_{ij}(0) = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

则：  $c = \begin{cases} 2/3 & i = j \\ -1/3 & i \neq j \end{cases}$

则：  $p_{ij}(t) = \begin{cases} \frac{1}{3} + \frac{2}{3}e^{-\frac{3}{2}t} & i = j \\ \frac{1}{3} - \frac{1}{3}e^{-\frac{3}{2}t} & i \neq j \end{cases}$


所以，其平稳分布为：  $\pi_j(t) = \lim_{t \rightarrow \infty} p_{ij}(t) = \frac{1}{3}, j = 1, 2, 3。$

**例15** 设 $\{W(t), t \geq 0\}$ 是参数为 $\sigma^2$ 的维纳过程,  $W(0)=0$  令:  
 $X(t)=e^{-\beta t}W(e^{2\beta t}), -\infty < t < +\infty, \beta > 0$ 为常数。证明 $X(t)$   
为平稳过程, 求其谱密度。

**解:**(1)  $\mu_X(t) = E[X(t)] = e^{-\beta t} E[W(e^{2\beta t})] = 0$

(2)  $R_X(s, t) = E[X(s)X(t)]$   
 $= E[e^{-\beta s} e^{-\beta t} W(e^{2\beta s}) W(e^{2\beta t})]$   
 $= e^{-\beta(t+s)} E[W(e^{2\beta s}) W(e^{2\beta t})]$




$$\begin{aligned} & \text{当 } s < t, \quad E[W(e^{2\beta s})W(e^{2\beta t})] \\ &= E\left\{\left[W(e^{2\beta s}) - W(0)\right]\left[W(e^{2\beta t}) - W(e^{2\beta s}) + W(e^{2\beta s})\right]\right\} \\ &= E\left[W(e^{2\beta s}) - W(0)\right]E\left[W(e^{2\beta t}) - W(e^{2\beta s})\right] + E\left[W(e^{2\beta s})\right]^2 \\ &= \sigma^2 e^{2\beta s} \end{aligned}$$

所以：  $R_X(s, t) = \sigma^2 e^{-\beta(t-s)}$

同理，当  $s \geq t$  时，  $R_X(s, t) = \sigma^2 e^{-\beta(s-t)}$

即：  $R_X(s, t) = \sigma^2 e^{-\beta|s-t|}$

综上所述：  $\mu_X(t)$  为常数，  $R_X(s, t)$  只与  $s - t$  有关  
由平稳过程的定义，则  $X(t)$  为平稳过程。

谱密度函数：  $S_X(\omega) = \frac{\sigma^2 \beta}{\pi(\omega^2 + \beta^2)}$

**例16** 设 $X(t)$ 是平稳过程，定义 $Y(t) = X(t)\cos(\omega_0 t + \Theta)$ ， $X(t)$ 与 $\Theta$ 相互独立， $\Theta \sim U(0, 2\pi)$ ， $\omega_0$ 为常数。试证明 $Y(t)$ 是平稳过程。若 $X(t)$ 的功率谱密度为 $s_X(\omega)$ ，求 $Y(t)$ 的功率谱密度。


**解：(1)**  $E[Y(t)] = E[X(t)\cos(\omega_0 t + \Theta)] = E[X(t)] \cdot E[\cos(\omega_0 t + \Theta)]$

而： $E[\cos(\omega_0 t + \Theta)] = \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 t + \theta) \frac{1}{2\pi} d\theta = 0$

则： $E[Y(t)] = 0$ 为常数

$$\begin{aligned} R_Y(s, t) &= E[Y(s)Y(t)] = E[X(s)\cos(\omega_0 s + \Theta)X(t)\cos(\omega_0 t + \Theta)] \\ &= E[X(s)X(t)] \cdot E[\cos(\omega_0 s + \Theta)\cos(\omega_0 t + \Theta)] \\ &= R_X(s - t) \int_0^{2\pi} \cos(\omega_0 s + \theta)\cos(\omega_0 t + \theta) \frac{1}{2\pi} d\theta \\ &= R_X(s - t) \cdot \frac{1}{2} \cos \omega_0(s - t) \text{ 仅与时间间隔有关} \end{aligned}$$

$\therefore Y(t)$ 是平稳过程。



$$(2) \because E[Y(t)] = E[X(t)\cos(\omega_0 t + \Theta)] = E[X(t)] \cdot E[\cos(\omega_0 t + \Theta)] = 0$$

$$R_Y(s, t) = R_X(s - t) \cdot \frac{1}{2} \cos \omega_0(s - t)$$

$$\text{令: } \tau = s - t, \text{ 则 } R_Y(\tau) = R_X(\tau) \cdot \frac{1}{2} \cos \omega_0 \tau$$

$$\therefore s_Y(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_Y(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) \cdot \frac{1}{2} \cos \omega_0 \tau \cdot e^{-i\omega\tau} d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{e^{-i\omega_0\tau} + e^{i\omega_0\tau}}{2} e^{-i\omega\tau} d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) \cdot \frac{1}{4} [e^{-i(\omega+\omega_0)\tau} + e^{-i(\omega-\omega_0)\tau}] d\tau$$

$$= \frac{1}{4} [s_X(\omega + \omega_0) + s_X(\omega - \omega_0)] \left( \because s_X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_X(\tau) e^{-i\omega\tau} d\tau \right)$$