

C3 X

Jack Maguire

Question 1

a

$$y = \frac{x^2 - 6x + 12}{4x - 11}$$

$$v = 4x - 11$$

$$v' = 4$$

$$u = x^2 - 6x + 12$$

$$u' = 2x - 6$$

$$\begin{aligned} \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{vu' - v'u}{v^2} \\ &= \frac{(4x - 11)(2x - 6) - 4(x^2 - 6x + 12)}{(4x - 11)^2} \\ &= \frac{8x^2 - 46x + 66 - 4x^2 + 24x - 48}{(4x - 11)^2} \\ &= \frac{4x^2 - 22x + 18}{(4x - 11)^2} \quad \checkmark \\ &= \frac{4x^2 - 22x + 18}{16x^2 - 88x + 121} \quad \checkmark \end{aligned}$$

b

y is decreasing $\therefore \frac{\Delta y}{\Delta x} < 0$

$$\frac{4x^2 - 22x + 18}{16x^2 - 88x + 121} < 0$$

Since $16x^2 - 88x + 121$ only has one repeated root, and is a positive curve, it will never go below zero, so we can ignore solutions from it.

$$\begin{aligned} \frac{4x^2 - 22x + 18}{16x^2 - 88x + 121} &< 0 \\ 4x^2 - 22x + 18 &< 0 \\ (2x - 1)(4x - 9) &< 0 \\ 1 &< x < 4.5 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Question 2

$$\sin 2\theta = \cot \theta$$

$$2 \sin \theta \cos \theta = \frac{\cos \theta}{\sin \theta}$$

$$2 \sin^2 \theta \cos \theta = \cos \theta$$

$$2 \sin^2 \theta \cos \theta - \cos \theta = 0$$

$$(\cos \theta)(2 \sin^2 \theta - 1) = 0$$

$$\cos \theta = 0$$

$$\theta = 90^\circ$$

$$\text{AKA } \cos 2\theta = 0$$

$$2 \sin^2 \theta - 1 = 0$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2}$$

$$\sin \theta = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\theta = 45^\circ, 135^\circ$$

$$\theta = 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ$$

Question 3

a

$$= f(1 + \sqrt{9})$$

$$= f(4)$$

$$= 1 + \sqrt{4}$$

$$= 3$$

b

$$y = 1 + \sqrt{x}$$


$$x = 1 + \sqrt{y}$$

$$x - 1 = \sqrt{y}$$

$$(x - 1)^2 = y$$

$$f(x) = (x - 1)^2$$

c



d

$$1 + \sqrt{x} = (x - 1)^2$$

$$\sqrt{x} = x^2 - 2x$$

$$x = (x^2 - 2x)^2$$

$$0 = x^4 - 4x^3 + 4x^2 - x$$

We could say that $x = 0$, but we can see it is invalid on the graph and ignore it.

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x - 1$$

$$f(1) = 1 - 4 + 4 - 1 = 0$$

$$0 = (x - 1)(x^2 + bx + 1)$$

$$0 = \dots - x^2 + bx^2 + \dots$$

$$-1 + b = -4$$

$$b = -3$$

$$f(x) = (x - 1)(x^2 - 3x + 1)$$

We could say that $x = 1$, but we can see it is invalid on the graph and ignore it.

$$0 = x^2 - 3x + 1$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$= \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4}}{2}$$

We could say that $x = \frac{3 - \sqrt{5}}{2}$, but we can see it is invalid on the graph and ignore it.

$$x = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$$

est > 1

Question 4

a

$$\frac{\Delta y^*}{\Delta y} = \frac{3y^2 - 4}{y^3 - 4y}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y^3 - 4y}{3y^2 - 4}$$

$$2 = \frac{3y^2 - 4}{y^3 - 4y}$$

$$1 = \frac{3y^2 - 4}{2y^3 - 8y}$$

$$2y^3 - 8y = 3y^2 - 4$$

$$y = \frac{3y^2 - 4}{2y^2 - 8}$$

???

$$y = \frac{6y^2 - 8}{y^2 - 4}$$

b

???

$$y_{n+1} = \frac{6y_n^2 - 8}{y_n^2 - 4}$$

$$\begin{aligned} y_1 &= \frac{13}{2} \\ y_2 &= 6.918 \dots \\ y_3 &= 6.930 \dots \\ &??? \end{aligned}$$

Question 5

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{\Delta x} &= (-1)(4e^{2-x}) - (-2)(e^{4-2x}) \\ &= -4e^{2-x} + 2e^{4-2x} \\ 0 &= -4e^{2-x} + 2e^{4-2x} \\ 2e^{2-x} &= e^{4-2x} \\ 2e^{2-x} &= (e^{4-2x})^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Let } y &= e^{2-x} \\ 2y &= y^2 \\ 0 &= y^2 - 2y \\ y &= 0, 2\end{aligned}$$

$$\mathbb{R} \not\subset \ln 0$$

$$\begin{aligned}e^{2-x} &= 2 \\ x &= 2 - \ln 2 \\ &= 1.307\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y &= 4e^{2-x} - e^{4-2x} \\ &= 4\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{\Delta x}_{1.25} &= 0.49 \\ \frac{\Delta y}{\Delta x}_{1.307} &= 0 \\ \frac{\Delta y}{\Delta x}_{1.35} &= -0.32\end{aligned}$$

- Stationary Point = $(1.307, 4)$
- Kind = Maximum $\because \nabla^2 < 0$

Question 6

a
???

$$\begin{aligned}|QC| + |CR| &= 20 \\ |QC| \sin \theta + |CR| \cos \theta &= 20 \\ 8 \sin \theta + 20 \cos \theta &= 20 \\ 2 \sin \theta + 5 \cos \theta &= 5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}6) \quad 5 \cos \theta + 2 \sin \theta &= 5 \\ \sqrt{29} \cos(\theta - 21.8^\circ) &= 5 \\ \cos(\theta - 21.8^\circ) &= \frac{5}{\sqrt{29}} \\ \cos^{-1}\left(\frac{5}{\sqrt{29}}\right) &= \theta - 21.8^\circ \\ \theta - 21.8^\circ &= 21.8^\circ \pm 360^\circ \\ \theta - 21.8^\circ &= 338.2^\circ \pm 360^\circ \\ \theta &= 43.6^\circ \pm 360^\circ \\ \theta &= 360^\circ + 360^\circ\end{aligned}$$

$$\theta = 73.6^\circ$$

b

$$R \cos(\theta - \alpha) \equiv R \cos \theta \cos \alpha + R \sin \theta \sin \alpha$$

$$R \sin \alpha = 2$$

$$R \cos \alpha = 5$$

$$\tan \alpha = \frac{2}{5}$$

$$\alpha = 21.8^\circ$$

$$R^2 = 5^2 + 2^2$$

$$R = \sqrt{25 + 4}$$

$$R = \sqrt{29}$$

$$5 \cos \theta + 2 \sin \theta \equiv \sqrt{29} \cos(\theta - 21.8^\circ) \quad \checkmark$$

c


???

Question 7

a

1. Take the natural logarithm of x value. *100 - 100*
100 - 100
2. Shift the graph right by 12 units. \checkmark
3. Shrink the graph horizontally by a factor of 4. \checkmark

b



show steps.
also, reflect in y axis

Question 8

a

$$v = x$$

$$v' = 1$$

$$u = \sqrt{x+1}$$

$$u' = \frac{1}{2}(x+1)^{-\frac{1}{2}}$$

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{\Delta x} &= vu' + v'u \\ &= x \frac{1}{2}(x+1)^{-\frac{1}{2}} + (x+1)^{\frac{1}{2}} \\ &= (x+1)^{-\frac{1}{2}} \left(x \frac{1}{2} + (x+1) \right) \\ &= (x+1)^{-\frac{1}{2}} \left(\frac{3}{2}x + 1 \right) \\ &= \frac{1}{2}(3x+2)(x+1)^{-\frac{1}{2}} \quad \checkmark\end{aligned}$$

b

$$v = x\sqrt{x+1}$$

$$v' = \frac{1}{2}(3x+2)(x+1)^{-\frac{1}{2}}$$

$$u = \sin 2x$$

$$u' = 2 \cos 2x$$

$$\begin{aligned}\frac{\Delta y}{\Delta x} &= vu' + v'u \\ &= \left(x\sqrt{x+1} \right) (2 \cos 2x) + \left(\frac{1}{2}(3x+2)(x+1)^{-\frac{1}{2}} \right) (\sin 2x) \\ &= \left(\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2} + 1} \right) (2 \cos \pi) + \left(\frac{1}{2} \left(3 \frac{\pi}{2} + 2 \right) \left(\frac{\pi}{2} + 1 \right)^{-\frac{1}{2}} \right) (\sin \pi) \\ &= -2 \left(\frac{\pi}{2} \sqrt{\frac{\pi}{2} + 1} \right) \\ &= -\pi \sqrt{\frac{\pi}{2} + 1} \quad \checkmark\end{aligned}$$