Guiding Center Equation

reference :: https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2010JA015682

cgs gaussian units

$\frac{\partial f}{\partial t} + \vec{v} \cdot \frac{\partial f}{\partial \vec{x}} = 0$

$\vec{v} = c\frac{\vec{D}}{B^*_{\|}} \times \vec{b}$

$\vec{D} = \vec{E} - \frac{\mu}{q}\nabla\vec{B} - \frac{m}{q}(\frac{\partial \vec{v_E}}{\partial t} + \nabla\frac{v_E^2}{2})$

$\vec{v_E} = \frac{c\vec{E}}{B} \times \vec{b}$

$\vec{B^*} = \vec{B} + \frac{mc}{q}(\nabla \times \vec{v_E})$

$B^*_{\|} = \vec{B^*} \cdot \vec{b}$

$B = |\vec{B}|$

$\vec{B}(\vec{x}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\frac{3(\vec{m_E}\cdot\vec{\hat{x}})\vec{\hat{x}} - \vec{m_E}}{x^3}$

$\vec{\hat{x}} = \frac{\vec{x}}{|x|}$

Below We use cylindrical coordinates

$\vec{x} = (r, \theta, z)$

$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{e_r} + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e_\theta} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{e_z}$

$\nabla \cdot \vec{A} = \frac{1}{r}(\frac{\partial (rA_r)}{\partial r} + \frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + r\frac{\partial A_z}{\partial z})$

$\nabla \times \vec{A} = (\frac{1}{r}\frac{\partial A_z}{\partial \theta} - \frac{\partial A_\theta}{\partial z})\vec{e_r} + (\frac{\partial A_r}{\partial z} + \frac{\partial A_z}{\partial r})\vec{e_\theta} + \frac{1}{r}(\frac{\partial (rA_\theta)}{\partial r} - \frac{\partial A_r}{\partial \theta})\vec{e_z}$

Toroidal mode wave

ULF waves

$\vec{B}_{wave} = \vec{e_\theta} B_A sin(\omega(t - \frac{r\theta}{v_a}))$

$= \vec{e_\theta} B_A sin(m\omega_d(t - \frac{r\theta}{v_a}))$

$= \vec{e_\theta} B_A sin(m2\pi(\frac{t}{T} - \frac{r\theta}{\lambda}))$

$\vec{E}_{wave} = \vec{e_r} E_A sin(m2\pi(\frac{t}{T} - \frac{r\theta}{\lambda}) + \frac{\pi}{2})$

$E_{wave} = E_A sin(m2\pi(\frac{t}{T} - \frac{r\theta}{\lambda}) + \frac{\pi}{2})$

$\vec{E}_{wave} = \vec{e_r} E_{wave}$

$\vec{B_0} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3(\vec{m}\cdot\vec{\hat{x}})\vec{\hat{x}} - \vec{m}}{|\vec{x}|^3}$

$\vec{m} = m\vec{e_z}$

$\vec{B_0} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{3mz\vec{\hat{x}} - m\vec{e_z}}{|\vec{x}|^3}$

$\vec{E_0} = \vec{0}$

$\vec{E} = \vec{E_0} + \vec{E}_{wave} = \vec{E}_{wave}$

$\vec{B} = \vec{B_0} + \vec{B}_{wave}$

Apply to the fomula

$\vec{v_E} = \frac{c\vec{E}}{B} \times \vec{b}$

$= \frac{c\vec{E}_{wave}}{|B|^2} \times \vec{B}$

$\vec{B^*} = \vec{B} + \frac{mc}{q}(\nabla \times \vec{v_E})$

$= \vec{B} + \frac{mc}{q}(\nabla \times (\frac{c\vec{E}_{wave}}{|B|^2} \times \vec{B}))$

$= \vec{B} + \frac{mc}{q}((\nabla \cdot \vec{B})\frac{c\vec{E}_{wave}}{|B|^2} - (\nabla \cdot \frac{c\vec{E}_{wave}}{|B|^2})\vec{B})$

$\vec{D} = \vec{E} - \frac{\mu}{q}\nabla\vec{B} - \frac{m}{q}(\frac{\partial \vec{v_E}}{\partial t} + \nabla\frac{v_E^2}{2})$

$= \vec{E}_{wave} - \frac{\mu}{q}\nabla\vec{B} - \frac{m}{q}(\frac{\partial}{\partial t}(\frac{c\vec{E}_{wave}}{|B|^2} \times \vec{B}) + \frac{1}{2}\nabla|\frac{c\vec{E}_{wave}}{|B|^2} \times \vec{B}|^2)$

Assumption

- $\vec{B}_{wave} << \vec{B_0}$
- $\frac{\partial B_z}{\partial z} = 0$
- $\frac{\partial B_r}{\partial z} = 0$

so,

- $\vec{B} = \vec{B_0}$
- $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}$
- $\vec{B} = (B_r, B_\theta, B_z) = (0, 0, B_z)$
- $\frac{\partial \vec{B}}{\partial r} = (0, 0, \xi_r)$
- $\frac{\partial \vec{B}}{\partial \theta} = (0, 0, 0)$
- $\frac{\partial \vec{B}}{\partial z} = (0, 0, 0)$
- $\vec{b} = \vec{e_z}$

$B^* = \vec{B} + \frac{mc}{q}((\nabla \cdot \vec{B})\frac{c\vec{E}_{wave}}{|B|^2} - (\nabla \cdot \frac{c\vec{E}_{wave}}{|B|^2})\vec{B})$

$= B_z\vec{e_z} + \frac{mc}{q}(-(\nabla \cdot \frac{c\vec{E}_{wave}}{B_z^2})B_z\vec{e_z})$

$= B_z\vec{e_z} + \frac{mc}{q}(-(\frac{\partial}{\partial r}\frac{cE_{wave}}{B_z^2})B_z\vec{e_z})$

$= B_z\vec{e_z} + \frac{mc}{q}(-c(\frac{1}{B_z^2}\frac{\partial E_{wave}}{\partial r} - E_{wave}\frac{2B_z\xi_r}{B_z^4})B_z\vec{e_z})$

$= B_z\vec{e_z} + \frac{mc}{q}(c(-\frac{1}{B_z}\frac{\partial E_{wave}}{\partial r} + E_{wave}\frac{2\xi_r}{B_z^2})\vec{e_z})$

$= (B_z + \frac{mc^2}{q}(-\frac{1}{B_z}\frac{\partial E_{wave}}{\partial r} + E_{wave}\frac{2\xi_r}{B_z^2}))\vec{e_z}$

$B_\parallel^* = B_z + \frac{mc^2}{q}(-\frac{1}{B_z}\frac{\partial E_{wave}}{\partial r} + E_{wave}\frac{2\xi_r}{B_z^2})$

$\vec{D} = \vec{E}_{wave} - \frac{\mu}{q}\nabla\vec{B} - \frac{m}{q}(c\frac{\partial\vec{E}_{wave}}{\partial t} \times \frac{\vec{B}}{|B|^2} + \frac{1}{2}\nabla|c\frac{\vec{E}_{wave}}{|B|^2} \times \vec{B}|^2)$

$= \vec{e_r}E_{wave} - \frac{\mu}{q}\xi_r\vec{e_r} - \frac{mc}{q}(\frac{\partial(\vec{e_r}E_{wave})}{\partial t} \times \frac{\vec{e_z}}{B_z} + \frac{c}{2}\nabla|\frac{\vec{e_r}E_{wave}}{B_z^2} \times B_z\vec{e_z}|^2)$

$= \vec{e_r}E_{wave} - \frac{\mu}{q}\xi_r\vec{e_r} - \frac{mc}{q}(-\frac{\partial E_{wave}}{\partial t}\frac{1}{B_z}\vec{e_\theta} + \frac{c}{2}\nabla|-\frac{E_{wave}}{B_z^2}B_z\vec{e_\theta}|^2)$

$= \vec{e_r}E_{wave} - \frac{\mu}{q}\xi_r\vec{e_r} - \frac{mc}{q}(-\frac{\partial E_{wave}}{\partial t}\frac{1}{B_z}\vec{e_\theta} + \frac{c}{2}\nabla((\frac{E_{wave}}{B_z^2}B_z)^2))$

$= \vec{e_r}E_{wave} - \frac{\mu}{q}\xi_r\vec{e_r} - \frac{mc}{q}(-\frac{\partial E_{wave}}{\partial t}\frac{1}{B_z}\vec{e_\theta} + c\frac{E_{wave}}{B_z}\nabla(\frac{E_{wave}}{B_z}))$

$= \vec{e_r}E_{wave} - \frac{\mu}{q}\xi_r\vec{e_r} - \frac{mc}{q}(-\frac{\partial E_{wave}}{\partial t}\frac{1}{B_z}\vec{e_\theta} + c\frac{E_{wave}}{B_z}\frac{E_{wave}\nabla B_z + B_z\nabla E_{wave}}{B_z^2})$

$= \vec{e_r}E_{wave} - \frac{\mu}{q}\xi_r\vec{e_r} - \frac{mc}{q}(-\frac{\partial E_{wave}}{\partial t}\frac{1}{B_z}\vec{e_\theta} + c\frac{E_{wave}}{B_z}\frac{E_{wave}\xi_r\vec{e_r}}{B_z^2} + c\frac{E_{wave}}{B_z}\frac{\nabla E_{wave}}{B_z})$

$= \vec{e_r}E_{wave} - \frac{\mu}{q}\xi_r\vec{e_r} - \frac{mc}{q}(-\frac{\partial E_{wave}}{\partial t}\frac{1}{B_z}\vec{e_\theta} + c\frac{E_{wave}^2\xi_r}{B_z^3}\vec{e_r} + c\frac{E_{wave}}{B_z^2}\frac{\partial E_{wave}}{\partial\theta}\vec{e_\theta} + c\frac{E_{wave}}{B_z^2}\frac{\partial E_{wave}}{\partial r}\vec{e_r})$
$(E_{wave} = E_{wave}(\theta))$

$= (E_{wave} - \frac{\mu}{q}\xi_r - \frac{mc^2}{q}\frac{E_{wave}^2\xi_r}{B_z^3} - c\frac{E_{wave}}{B_z^2}\frac{\partial E_{wave}}{\partial r})\vec{e_r} + \frac{m}{q}(\frac{\partial E_{wave}}{\partial t}\frac{c}{B_z} - c^2\frac{E_{wave}}{B_z^2}\frac{\partial E_{wave}}{\partial\theta})\vec{e_\theta}$

$$\vec{v} = \frac{\vec{D}}{B_{\parallel}^{*}} \times \vec{b}$$

$$\vec{v} = (B_z + \frac{mc^2}{q}(-\frac{1}{B_z}\frac{\partial E_{wave}}{\partial r} + E_{wave}\frac{2\xi_r}{B_z^2}))^{-1}(-(E_{wave} - \frac{\mu}{q}\xi_r - \frac{mc^2}{q}\frac{E_{wave}^2\xi_r}{B_z^3} - c\frac{E_{wave}}{B_z^2}\frac{\partial E_{wave}}{\partial r})\vec{e_\theta} + \frac{m}{q}(\frac{\partial E_{wave}}{\partial t}\frac{c}{B_z} - c^2\frac{E_{wave}}{B_z^2}\frac{\partial E_{wave}}{\partial \theta})\vec{e_r})$$