

網路小故事

--麻黃篇--

陳小姐體重近百，自覺體重過重，除了體態不好看外，對健康也不利，因而前往減肥門診，醫師決定開給他內含有麻黃的「減肥三麻黃膠囊」，陳小姐在服用後出現胸悶、噁心及心跳加速等症狀，向醫師反映後醫師不但沒有停藥，反而加重了劑量，陳小姐也不疑有他，認為這是燃燒體內脂肪的狀況，直到某日身體不適被送進急診，急救後仍因急性心肌梗塞造成休克死亡。

事後法醫解剖發現陳小姐本身有冠狀動脈硬化的情況但，又服用含有麻黃的藥品，刺激腎上腺素分泌，導致血壓上升、血管痙攣，導致動脈硬化心臟病患者，終因心肌缺血死亡。

麻黃

基原：本品為麻黃科草本狀小灌木草麻黃 (*Ephedra sinica* Stapf.)、木賊麻黃 (*Ephedra equisetina* Bge.) 和中麻黃 (*Ephedra intermedia* Schrenk et CA, Mey.) 的乾燥草質莖。

藥材性狀：

木麻黃一莖細長圓柱形，略扁，少分枝，直徑 1-2mm，有時帶少量棕色木質莖；節時顯，節間長 2-6cm，表面淺綠色或黃綠色，有細縱稜線，

微有粗糙感。節上有膜質鱗葉，長 3-4mm，下部約 1/2 合生成鞘狀，上部 2 裂，裂片銳三角形披針形，先端灰白色，反曲。體輕，質脆，易折斷，斷面略纖維性，外圍黃褐色，髓部圓形，暗紅棕色。氣微香，味微苦、澀。


木賊麻黃一分枝多，直徑 1-1.5mm，無粗糙感。節間長 1.5-3cm。膜質鱗葉長 1-2mm，下部約 2/3 合生成鞘狀，上部裂片 2，短三角形，灰白色，先端多不反曲，基部棕紅色至棕黑色。斷面髓部略呈橢圓形。

中麻黃一分枝較多，直徑 1.5-3mm，有粗糙感。節間通常長 3-6cm。膜質鱗葉長 2-3mm，下部約 1/3 合生成鞘狀，裂片 3，先端銳尖，微反曲。斷面髓部常成三角狀圓形。均以色淡綠或黃綠、內心色紅棕、手拉不脫節、味苦澀者為佳。

性味：辛、微苦，溫

功效：發汗解表，宣肺平喘，利水消腫，通鼻竅，透疹，止癢。

禁忌：本品服過過多會造成頭痛、幻覺、高血壓、心搏過快與失去食慾



參考資料：

行政院衛生署台灣中藥典編修小組 2013 年 臺灣中藥典 第二版 P234 台北 行政院衛生署中醫藥委員會

國家藥典委員會 2010 年 中華人民共和國藥典第一部 2010 年版 P300~P301 北京 中國醫藥科技出版社

醫砭-麻黃 <http://yibian.hopto.org/yao/?yno=48>

本草綱目-麻黃

<https://zh.wikisource.org/wiki/%E6%9C%AC%E8%8D%89%E7%B6%B1%E7%9B%AE/%E8%8D%89%E4%B9%8B%E5%9B%9B>

圖片來源：

中國醫藥大學 中國藥學暨中藥資源學系 郭昭麟教授、林佳欣博士 提供