

Rationale Potenzen

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version *v1.0*
18. April 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Potenzen mit negativen Exponenten	1
2	Die n-te Wurzeln	4
2.1	Anwendungen	5
2.1.1	Lineare Gleichungen mit Wurzelkoeffizienten	5
2.1.2	Quadrierte Gleichungen	6
2.1.3	Wurzelgleichungen	7
3	Potenzen mit rationale Exponenten	9
4	Die Potenzfunktion	11
4.1	Graphen der Potenzfunktionen	11

1 Potenzen mit negativen Exponenten

Im ersten Kanti-Jahr habe wir die folgenden Potenzgesetze kennengelernt.

Satz 1.1. (*Potenzgesetze für natürliche Exponenten*)

Für Potenzen mit reellen Basen $a, b \in \mathbb{R}$ und natürlichen Exponenten $m, n \in \mathbb{N}$ gelten folgende Rechengesetze:

Potenzen mit gleicher Basis	$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$
Potenzen mit gleichem Exponenten	$a^n \cdot b^n = (ab)^n$
Verschachtelte Potenzen	$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$
Potenz eines Bruches mit gleicher Basis	$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$
Potenz eines Bruches mit gleichem Exponent	$\frac{a^n}{b^n} = \left(\frac{a}{b}\right)^n$

Es liegt auf der Hand, dass bei 4. $a \neq 0$ und bei 5. $b \neq 0$ gelten muss.

Wenden wir diese direkt in einer Repetitionsaufgabe an.

Aufgabe 1.1.

Bob, Alice und Carol beschäftigen sich mit Potenzen. Sie sind bei den folgenden Aufgaben jedoch nicht einer Meinung, was die Lösungen angehen. Wer ist jeweils korrekt? Begründe anhand der Potenzgesetze.

a) $2^7 \cdot 2^{10} =$

Alice: 2^{17}

Bob: 2^{70}

Carol: 4^{70}

b) $3^5 \cdot 7^5 =$

Alice: 21^{10}

Bob: 21^{25}

Carol: 21^5

c) $(3^4)^5 =$

Alice: 3^9

Bob: 3^{20}

Carol: $3^{(4^5)}$

d) $\frac{12^5}{3^5} =$

Alice: 9^5

Bob: $\left(\frac{12}{3}\right)^5$


Carol: 4^5

[illegible]



1 POTENZEN MIT NEGATIVEN EXPONENTEN

2



Definition 1.1.

$$a^0 = 1$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}$$

Wir behaupten $\mathbf{a}^n \cdot \mathbf{a}^m = \mathbf{a}^{n+m}$ für eine beliebige reelle Zahl a und zwei negative Exponenten n und m .

Beweis

[illegible]

Aufgabe 1.2.

1. Fasse die folgenden Ausdrücke zu einer Potenz zusammen.

a) $4^9 \cdot 4^7$

b) $3^{n-1} \cdot 3^{n+1}$

c) $5^2 \div 5^8$

d) $8^{n+2} \div 8^{n-4}$

2. Stelle jede der folgenden Zahlen als eine Potenz dar, deren Basis eine möglichst kleine natürliche Zahl und deren Exponent ganzzahlig ist.

a) 25

c) 0.001

e) $\frac{1}{10^{57}}$

g) $\frac{1}{169}$

b) 100'000'000

d) $\frac{1}{625}$

f) 0.008

h) 1024

3. Vereinfache die folgenden Terme so weit wie möglich und markiere bei jedem Umformungsschritt die verwendete Definition oder das verwendete Potenzgesetz.

a) $(a^3 \cdot a \cdot a^0 \cdot a^{-2}) \div (a^4 \cdot a^{-5})$

c) $\frac{a^3 \cdot b^2 \cdot c \cdot d^{-5}}{b \cdot d^2} \cdot \frac{a^{-2} \cdot d^8}{c^2}$

b) $\frac{1}{3^{-7}} \cdot 3^8$

d) $p^{-5} \cdot p^{-4} \cdot p^{-3} \cdot p^{-2} \cdot p^{-1} \cdot p^0 \cdot p^1 \cdot p^2 \cdot p^3 \cdot p^4$

4. Vereinfache dir folgenden Terme so weit wie möglich und markiere bei jedem Umformungsschritt die verwendete Definition oder das verwendete Potenzgesetz.

a) $(18y)^{-4} \div (9y)^{-4}$

c) $\left(\frac{2}{7}\right)^{-13} \cdot \left(\frac{7}{2}\right)^4 \div \left(\frac{2}{7}\right)^{-18}$

b) $\left(\left((a^2)^{-3}\right)^4\right)^{-5}$

d) $\frac{2^{-1}}{1 + \frac{2^{-1}}{1 + \frac{2^{-1}}{2}}}$


Ablauf

1. ausmultiplizieren, falls notwendig
2. alle Unbekannte auf die eine Seite, der Rest auf die andere Seite
3. die Unbekannte ausklammern
4. durch die Klammer vor der Unbekannten dividieren

Starten wir mit einem Beispiel gemeinsam.

Beispiel 2.

$$x\sqrt{8} + 6 = \sqrt{8} - x$$

**Aufgabe 2.3.**

Löse die linearen Gleichungen nach x auf.

a) $x\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5} - x\sqrt{2}$

c) $(x - 4)\sqrt{2} = \sqrt{3}(x - 5)$

b) $4x - 5 = \sqrt{6} \cdot x + 7$

d) $(x + 2 - \sqrt{2})^2 = x^2 + \sqrt{2}$

2.1.2 Quadrierte Gleichungen

Als erste Anwendung betrachten wir eine neue Form von Gleichungen, die wir allerdings mit einem Trick auf die linearen Gleichungen zurückführen können. Das heisst auch, die Unbekannte ist nie unter der Wurzel anzutreffen.

Definition 2.2.

Eine Gleichung heisst quadrierte Gleichung, falls die Unbekannte im Quadrat vorkommt.

Starten wir mit zwei gemeinsamen Beispielen:

Beispiel 3. 1.

$$(x - 3)^2 = 64$$



2.

$$(3x - 16)^2 = (4x - 19)^2$$

**Aufgabe 2.4.**

Löse die folgenden Gleichungen. Überlege dir genau welche beiden Fälle du betrachten musst.

a) $(x - 6)^2 = (2x - 7)^2$

c) $9x^4 = (5x^2 - 2)^2$

b) $(2x + 3)^2 - 9 \cdot (6x - 7)^2 = 16 \cdot (6x - 7)^2$


d) $(x^2 + x - 14)^2 = (x^2 - x + 6)^2$

**2.1.3 Wurzelgleichungen**


Als zweites betrachten wir sogenannte Wurzelgleichungen. Diese zeichnen sich aus, dass die Unbekannte unter der Wurzel zu finden ist. Um die Gleichung lösen zu können, müssen wir es schaffen, die Unbekannte aus der Wurzel herauszunehmen zu können.

Beispiel 4.

$$x + 1 = \sqrt{2x + 5}$$



Wichtig: Durch das _____ einer Gleichung können zusätzliche falsche Lösungen entstehen. Deshalb ist eine Überprüfung der Lösungen unerlässlich.



Aufgabe 2.5.

Löse die folgenden Gleichung nach x auf und überprüfe sie hinsichtlich möglicher Scheinlösungen.

a) $\sqrt{x+5} = \sqrt{4-x}$

d) $\sqrt{x} + \sqrt{x+4} = 4$

b) $\sqrt{x(x-4)} = 2\sqrt{1-x}$

e) $\sqrt{6-x} + \sqrt{2x+1} = \sqrt{x+7}$

c) $\sqrt{3x^2-50} = -x$

f) $\sqrt{x-2} + \sqrt{x-11} = \sqrt{x+13}$



Lasst uns zuerst einige Beispiele gemeinsam betrachten, wie uns dieser Zusammenhang bei der Vereinfachung von Termen helfen wird.

Beispiel 5. 1. $\sqrt[2]{12^3} \cdot \sqrt[3]{12^2} =$

[illegible]

$$2. \left(\sqrt[3]{3^2} \div \sqrt[5]{3^3} \right) \cdot \sqrt[15]{3^2} =$$

[illegible]

Aufgabe 3.2.



1. Vereinfache die folgenden Terme zu einer einzelnen Wurzel, wobei der Radikand eine natürliche Zahl sein soll.

a) $\sqrt[5]{\frac{1}{3125}} \cdot \sqrt[3]{\frac{3^5}{3^6}}$

b) $\frac{\sqrt[23]{51^{46}}}{\sqrt[46]{51^{23}}}$

c) $\sqrt[3]{111^2} \div \sqrt[5]{111^3} \cdot \sqrt[30]{111}$

2. Für die folgende Aufgaben geh wie folgt vor: Wenn ein Term gegeben ist, berechne ihn. Wenn eine Gleichung mit einer Variable gegeben ist, löse sie. Wenn einen Term mit einer Variable gegeben ist, vereinfache ihn. Gib in allen Umformungsschritten jeweils das verwendete Potenz- oder Wurzelgesetz an.

a) $\sqrt[3]{\frac{1}{64}}$

j) $x^{1.5} = 0.001$

b) $\sqrt[7]{\frac{1}{128}}$

k) $\left(\sqrt[5]{\sqrt{32}}\right)^2$

c) $\sqrt[10]{10^{-10}}$

$$1) \left((x^7 y^3 z^2)^{\frac{1}{4}} \cdot (x^3 y^5 z^4)^{\frac{1}{4}} \right) \div (xyz)^2$$

d) $\sqrt[60]{64^{10}}$

$$\text{m) } \left(\frac{2a^2b^3}{2c}\right)^3 \cdot \left(\frac{4c^2}{3a^3b^4}\right)^2$$

e) $a^{-6} \div a^{-2}$

n) $(10^{0.5} \div 10^{-1.5}) \cdot 10^{2.5}$

f) $81^{1.5}$

o) $\left(\sqrt[8]{5^3} \div \sqrt[5]{5^6}\right) \div \sqrt[40]{5^{35}}$

g) $\left(\frac{27}{8}\right)^{-\frac{1}{3}}$

p) $\sqrt[10]{x^2 \cdot \sqrt[9]{x^3 \cdot \sqrt[8]{x}}}$

\left(a^{\frac{1}{4}} \div a^{\frac{1}{5}}\right) \cdot a^{\frac{1}{10}}

q) $x^4 \cdot \sqrt[3]{x^2 \cdot \sqrt{x \cdot \sqrt[4]{x^3}}}$

i) $x^{0.75} = 8$

3. Ordne die folgenden Zahlen nach aufsteigender Grösse.

a) $3^{-3}, 10^{-3}, 2^{-4}, 2^{-10}, 10^{-2}, 3^{-2}$

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^0, \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}, \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}, \left(\frac{1}{2}\right)^2, \left(\frac{1}{2}\right)^3$

4 Die Potenzfunktion

Gerade weil Potenzen und Wurzeln in naturwissenschaftlich-technischen Anwendungen immer wieder vorkommen, lohnt es sich, ihr funktionales Verhalten genauer zu untersuchen. Beginnen wir damit zu definieren, was wir unter einer Potenzfunktion verstehen:

Definition 4.1.

Eine Funktion der Form $f : y = a \cdot x^p$ für einen rationalen Exponenten p heisst **Potenzfunktion**.



Es ist offensichtlich, dass der Definitionsbereich von der Wahl des Exponenten anhängt. Denn für positive Exponenten, wie zum Beispiel x^2 , ist der Definitionsbereich $\mathbb{R}$. Wohingegen bei negative Exponenten, wie zum Beispiel $x^{-1} = \frac{1}{x}$, haben wir eine Definitionslücke bei 0. Weiter sind darin auch alle Wurzelfunktionen enthalten, weil ja $\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$ gilt. Diese haben nochmals eine weitere Einschränkung, weil ja nur Wurzeln von positiven Zahlen, also Definitionsmenge $\mathbb{R}_0^+$, gezogen werden können.

Beispiel 6. In der Physik wimmelt es von Potenzfunktionen. Beispielsweise ordnet die folgende Funktion

$$h : y = \frac{1}{2}g \cdot x^2$$

die Anzahl Sekunden x der zurückgelegte Fallstrecke $h(x)$ in Metern im freien Fall zu.

Die nach dieser Fallstrecke erreichte Endgeschwindigkeit kann ebenfalls als eine Potenzfunktion in der Variable h aufgefasst werden.

$$v : y = \sqrt{2g} \cdot h^{\frac{1}{2}}$$

Aufgabe 4.1.

Entscheide für die folgenden Funktionsgleichungen, ob es sich um eine Potenzfunktion handelt. Begründe deine Antwort.

a) $f(x) = \frac{7}{x^3}$

c) $f(x) = 2 \cdot \sqrt{x} \cdot \sqrt{x}$

e) $1 + x + x^2 + x^3$

b) $f(x) = 7 \cdot 3^x$

d) $f(x) = \frac{5 \cdot x^{\frac{1}{3}} \cdot x^{\frac{1}{4}}}{x^{\frac{1}{5}}}$

f) $\left((\sqrt{3}x)^2\right)^3$





4.1 Graphen der Potenzfunktionen



Die Graphen der Potenzfunktion und ihre charakteristischen Eigenschaften hängen, wie bereits bei der Definitionsmenge, von der Wahl des Exponentens p ab. Betrachten wir also in der Folge alle sechs unterschiedlichen Fälle. Dabei untersuchen wir zuerst die ganzzahligen Exponenten. Benutze dazu das folgende [Geogebra-Applet](https://www.geogebra.org/m/ctbxhang)¹. Skizziere drei dieser Graphen mit unterschiedlichen Exponenten im folgenden Koordinatensystem und notiere daneben die Eigenschaften (Definitionsmenge, Wertemenge, Gemeinsame Punkte, Symmetrien, etc.).

¹<https://www.geogebra.org/m/ctbxhang>



1. Fall: $p \in \{2, 4, 6, 8, \dots\}$, also p als eine positive gerade Zahl.





2. Fall: $p \in \{1, 3, 5, 7, \dots\}$, also p als eine positive ungerade Zahl.



3. Fall: $p \in \{-2, -4, -6, \dots\}$, also p als eine negative gerade Zahl.





4. Fall: $p \in \{-1, -3, -5, -7, \dots\}$, also p als eine negative ungerade Zahl.





Untersuchen wir als nächstes die beiden Fälle mit rationalen Exponenten. Dazu betrachte das folgende [Geogebra-Applet](#)².

5. Fall: $p \in \{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \dots\}$



6. Fall: $p \in \{-\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, -\frac{1}{5}, \dots\}$



²<https://www.geogebra.org/m/dkz88pz7>

Aufgabe 4.2.

1. Ordne die folgenden Graphen ihrer Funktionsgleichung zu.
2. Gib die Funktionsgleichung für die folgenden Graphen an.
3. Die Graphen der beiden Funktionen $f(x) = x^p + 2.5$ und $g(x) = x^q - 5$ schneiden sich im Punkt $(2, 3)$. Bestimme aus diesen Angaben und ohne Einsatz von Technologie (TR oder Geogebra) die beiden Unbekannten p und q ?

History

Version	Datum	Person	Bemerkung
0.1	16.12.2023	Jonas Guler	Kapitel erstellt
0.2	02.10.2024	Jonas Guler	Definition auf n-te Wurzel verallgemeinert
0.3	ToDo	Jonas Guler	Aufgaben hinzufügen und Rationale Exponenten