

Gleichungen

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version 1.0
25. März 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Einstieg	1
1.1	Typen von Gleichungen	2
2	Lösungsmenge	5
3	Lösungsstrategie für lineare Gleichungen	7
3.1	Lineare Gleichungen mit Parameter	8
4	Gleichungen der Form $a \cdot b = 0$	9
5	Textaufgaben	9
6	Bruchtermgleichungen	9

Definition 1.1.

Unter einer **Aussage** versteht man eine Behauptung, der eindeutig einen der beiden Wahrheitswerte (*wahr*) oder (*falsch*) zugeordnet werden kann.

Eine **Gleichung** ist eine Aussage, die eine oder mehrere Variablen enthält. Indem die Variablen mit Zahlen belegt werden, entsteht entweder eine wahre oder eine falsche Aussage.



Wir werden uns zu Beginn vor allem darauf fokussieren, alle Zahlen einer Gleichung zu finden, sodass eine wahre Aussage entsteht. Dabei beschränken wir uns auf maximal eine Variable.

Aufgabe 1.2.

1. Formuliere aus den folgenden Fragestellungen jeweils eine Gleichung.
 - a) Ich denke mir eine Zahl: Ihr 11-Faches ist um 7 grösser als 400. An welche Zahl denke ich?
 - b) Wenn ich eine bestimmte Zahl verdopple, erhalte ich gleich viel, wie wenn ich die von 33 subtrahiere. Welche Zahl ist das?
 - c) Addiere ich 5 zum 5-Fachen einer bestimmten Zahl, so erhalte ich 5. Welche Zahl ist gesucht?
2. Ein Zirkus verkaufte für die Abendvorstellung 60 Karten in der Preiskategorie I, 125 Karten in der Kategorie II und 75 in der Kategorie III. Die Gesamteinnahmen an diesem Abend betrugen 5'140.– CHF. Ein Platz der Kategorie I war 8.– CHF teurer als ein Platz in der Kategorie III. Ein Platz in der Kategorie II war 4.– CHF billiger als ein Platz der Kategorie I. Stelle diesen Sachverhalt in einer einzigen Gleichung mit einer Variable dar. Mache dabei deutlich, was deine Variable bedeutet.



1.1 Typen von Gleichungen

Durch das Gleichsetzen von Termen entstehen also Gleichungen. Aber Gleichungen können sich in ihrer Bedeutung und Behandlung stark unterscheiden. Wir besprechen nun kurz und der Reihe nach die folgenden Typen von Gleichungen: Bestimmungsgleichungen, Identitäten, Axiome, naturwissenschaftliche Gesetze und Definitionsgleichungen.

Bestimmungsgleichungen

Bestimmungsgleichungen sind Gleichungen mit mindestens einer Unbekannten, üblicherweise mit x bezeichnet. Dabei stellt sich jeweils die Frage, ob die Gleichung durch das Belegen der Unbekannten mit einer Zahl in eine **wahre** Aussage übergeht.

Beispiel 1. Die Bestimmungsgleichung

$$x^2 = 2$$

besitzt zwei Lösungen. Wenn wir nämlich für x entweder $+\sqrt{2}$ oder $-\sqrt{2}$ einsetzen, so ergibt sich die wahre Aussage

$$(+\sqrt{2})^2 = 2 \quad \text{oder} \quad (-\sqrt{2})^2 = 2.$$

Bei Bestimmungsgleichungen geht es also überwiegend darum eine Lösung für Unbekannten zu finden. Wir werden uns in Zukunft auch mehrheitlich mit solchen Gleichungen auseinander setzen.

Identitäten

Die Gleichung

$$a^2 - b^2 = (a + b) \cdot (a - b)$$

unterscheidet sich in offensichtlicher Weise von den bisher betrachteten Bestimmungsgleichungen. Dies ist eine sogenannte Identität. Es zeichnet sie aus, dass sie für jede mögliche Belegung von a und b zu einer wahren Aussage wird. Deshalb es ist auch nicht interessant, nach einer der enthaltenen Variablen aufzulösen. Es soll nicht nach einer ganz bestimmten Belegung gesucht werden, sondern es wird ganz allgemein festgestellt, dass die beiden Terme $a^2 - b^2$ und $(a + b) \cdot (a - b)$ generell denselben Wert haben. Eine Identität kann bewiesen werden, indem die eine Seite in die andere umgeformt wird. Unter Verwendung des Distributivgesetzes und des Kommutativgesetzes erhalten wir nämlich:

$$\begin{aligned} (a + b) \cdot (a - b) &= a \cdot (a - b) + b \cdot (a - b) \\ &= a^2 - a \cdot b + b \cdot a - b^2 \\ &= a^2 - b^2 \end{aligned}$$

Naturwissenschaftliche Gesetze

Naturwissenschaftliche Gesetze haben oftmals die Form von Gleichungen, aber sie sind keine Bestimmungsgleichungen und keine Identitäten. Das folgende Beispiel mögen den Unterschied erhellen.

Durch Experimente kann festgestellt werden, dass eine Masse, die sich im freien Fall befindet, in guter Näherung nach t Sekunden Fall die Strecke $5t^2$ in Metern zurückgelegt hat. Das Gesetz lautet also so:

$$s = 5t^2.$$

Nun ist das keine Bestimmungsgleichung, weil es nicht darum geht, nach einer Variablen aufzulösen, und es ist keine Identität, denn es ist nicht möglich, die eine Seite durch formales Umformen in die andere Seite zu überführen. Es ist vielmehr die Feststellung eines Zusammenhangs zweier Grössen, welcher durch Experimente erhärtet, aber nicht formal bewiesen werden kann.

Definitionsgleichungen

Zum Schluss soll noch eine weitere Art von Gleichungen kurz gestreift werden: die Definitionsgleichung. Angenommen, wir sind in längere Berechnungen verstrickt und stellen fest, dass gehäuft die Zahl

$$\frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618 \dots$$

vorkommt. Um diesen Term nicht jedes Mal in voller Länge aufschreiben zu müssen, beschliessen wir, den Term durch einen Buchstaben abzukürzen und wir wählen dazu den griechischen Buchstaben φ (Phi). Von jetzt an soll also immer dieser Buchstabe für die oben erwähnte Zahl stehen. Das nennt man eine Definition; einem neuen Symbol (oder Begriff) wird eine klare Bedeutung zugeordnet. Und dafür verwendet man in der Mathematik nicht das gewöhnliche Gleichheitszeichen, sondern ein Gleichheitszeichen mit vorangestelltem Doppelpunkt:

$$\varphi := \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Übrigens der Buchstabe, der hier gewählt wird, kann vollkommen selbst bestimmt werden. Es gibt absolut keine Einschränkungen, die hier beachtet werden müssen. Wichtig ist lediglich, dass die Buchstaben nicht vertauscht werden.

Aufgabe 1.3.

Nimm zu den folgenden Behauptungen Stellung. Haben die Schülerinnen und Schüler recht? Begründe!

- a) Bob behauptet: «Die Bestimmungsgleichung $x - 7 = 5$ besitzt keine Lösung in der Menge der natürlichen Zahlen.»
- b) Céline behauptet: «Die Gleichung $(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 3$ besitzt überhaupt keine Lösung.»
- c) David behauptet: «Der Ausdruck $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ ist eine Identität.»
- d) Eliane behauptet: «Das Assoziativgesetz $(a + b) + c = a + (b + c)$ könne sie durchaus beweisen.» Sie wählt die drei Zahlen 1, 2 und 3 und rechnet: $(1 + 2) + 3 = 3 + 3 = 6$ und $1 + (2 + 3) = 1 + 5 = 6$. Da beide Ergebnisse gleich seien, hält Eliane das Gesetz für bewiesen.

2 Lösungsmenge

Eine Bestimmungsgleichung kann aus ganz unterschiedlichen Aussagen entstehen und unterschiedliche Zusammenhänge mathematisch beschreiben. In der folgende Aufgabe sind einige Möglichkeiten abgebildet.

Aufgabe 2.1.

Löse die folgenden Aufgaben.

- «Ich denke mir eine Zahl, wenn ich sie verdopple und danach 3 abziehe, so erhalten ich exakt 13. Welche Zahl denke ich mir?»
- «Ich denke mir eine Zahl, die verdoppelt genau dasselbe ergibt, wie wenn ich sie quadriere. An welche Zahl denke ich?»
- «Ich denke mir eine Zahl zwischen 1 und 100. Wenn ich das Quadrat der Zahl um 17 erhöhe, erhalte ich 746. Welche Zahl denke ich mir?»
- «Ich denke mir eine Zahl zwischen 1 und 10. Wenn ich das Quadrat der Zahl um 3 verringere, erhalte ich eine Zahl, die durch 2 teilbar ist. Welche Zahlen denke ich mir?»

Alle obigen Bestimmungsgleichungen haben also eine oder mehrere Lösungen. Eine Zahl ist genau dann eine Lösung einer Gleichung, wenn sich die Gleichung durch Einsetzen der Zahl in eine wahre Aussage verwandelt. Üblicherweise werden alle Lösungen in der **Lösungsmenge** zusammengefasst. Beim Lösen von Gleichungen im Allgemeinen unterscheiden wir folgende 3 Fälle:

Fall 1: Die Gleichung lässt sich eindeutig Lösen

$$6x + (1 - 7x) = 9 - (5x + 5)$$

[illegible]

$$x \cdot (2 + x) = 2 \cdot (2 + x) + x^2$$

[illegible]

Fall 3: Die Gleichung besitzt unendliche viele Lösungen.

$$2 \cdot (x + 2) + 5x - 10 = 2x + 4 + 5 \cdot (x + 2)$$

[illegible]

Aufgabe 2.2.

- a) Finde die Lösungsmenge der folgenden Gleichung.

$$x - (15 - 4 \cdot (2x - 1)) = 3 \cdot (3 \cdot (x + 1) - 5)$$

- b) Verändere nun eine einzige Zahl an der obigen Gleichung, sodass sie jetzt unendliche viele Lösungen besitzt.



3 Lösungsstrategie für lineare Gleichungen

Unser Ziel ist es auf den folgenden Seite eine Strategie zu erarbeiten, mit der sich eine spezielle Gruppe von Bestimmungsgleichungen (sogenannte lineare Gleichungen) lösen lässt. Ihr habt in eurem mathematischen Werkzeugskoffer bereits einige Mittel, um solche Gleichungen zu lösen. Zuerst wollen wir aber die lineare Gleichung korrekt definieren.

Definition 3.1. (lineare Gleichung)

Eine Gleichung in der Variable x , die in die Form

$$a \cdot x + b = 0$$

gebracht werden kann, wobei $a, b \in \mathbb{R}$ gilt, wird als **lineare Gleichung** bezeichnet.



Aufgabe 3.1.

Entscheide, ob die folgenden Gleichungen linear sind. Begründe deine Antwort.

a) $6 - (5x - 4) = 3 - (2x - 1)$

c) $\frac{x}{6} + \frac{3x}{4} - \frac{2x}{3} - \frac{x}{2} = 5$

b) $\frac{x-3}{3} - \frac{x-2}{2} = x + 1$

d) $(x - 3)(x + 3) + 9 = x^2$



Du bringst im Lösen von linearen Gleichungen schon einige Erfahrungen mit. Jedoch wollen wir diese noch ein wenig vertiefen und in Zukunft auch Gleichungen mit nicht nur natürlichen Koeffizienten a, b lösen können. Deshalb brauchen wir eine allgemein durchführbare Lösungsstrategie für lineare Gleichungen. In diesem [Video](#)¹ wird dir eine entsprechende Lösungsstrategie vorgestellt. Beschreibe die wichtigsten Punkte in der Box unten.

Lösungsstrategie

1. _____
2. _____
3. _____



Aufgabe 3.2.

1. Bestimme die Lösungen der folgenden linearen Gleichungen.

a) $(4x - 5) = 4 \cdot (x + 3)$

e) $x\sqrt{2} + \sqrt{3} = \sqrt{5} - x\sqrt{2}$

b) $\frac{1}{6} \cdot (x - 2) + \frac{2}{3}x = \frac{1}{3} \cdot (\frac{5}{2}x - 1)$

f) $4x - 5 = \sqrt{6} \cdot x + 7$

c) $x \cdot (x - 2) - 3x = x^2 + 5$

g) $(x - 4)\sqrt{2} = \sqrt{3}(x - 5)$

d) $(8x - 1)(x + 3) = 8 \cdot (x - 2)^2$

h) $(x + 2 - \sqrt{2})^2 = x^2 + \sqrt{2}$

2. Löse die Aufgaben 121 – 126 aus der Aufgabensammlung.



¹https://www.youtube.com/watch?v=B5PJhPuiKzA&list=PLZDmY1No30Do_z43GEirwmEYslEo8K27G&index=3&t=0s

welches eine zusätzliche Herausforderung beleuchtet.

Beispiel 2. Betrachte die folgende Gleichung mit Parameter. Wir möchten die Gleichung nach der Unbekannten x auflösen:

$$asöldkfjsa$$

4 Gleichungen der Form $a \cdot b = 0$

5 Textaufgaben

6 Bruchtermgleichungen

History

Version	Datum	Person	Bemerkung
0.1	16.12.2023	Jonas Guler	Einführungsaufgaben
0.2	ToDo	Jonas Guler	Alle Theorieinhalte