

# Лекция 3

Теория вероятностей (продолжение). Ковариация и корреляция

---

**Курс:** Введение в DS на УБ и МиРА (весна, 2022)

**Преподаватель:** Владимир Омелюсик

11 апреля

- Примеры задач теории вероятностей, статистики и машинного обучения.
- Генеральная совокупность и выборка.
- Типы переменных.
- Основные понятия ТВ.
- Функция распределения и функция вероятности.

## Функция плотности

Некоторая функция  $f(x)$ , описывающая непрерывную случайную величину  $X$ , для которой верно:

$$F_X(a) = \mathbb{P}(X \leq a) = \int_{-\infty}^a f(x) dx$$

- Сами значения показывают «относительную вероятность», но обычно не интерпретируются.
- Площадь под ней равна 1.
- Самое важное свойство:

$$\mathbb{P}(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

## Плотность как относительная вероятность

	Дискретная	Непрерывная
$\mathbb{P}\{X = a\}$	Ф. вероятности	0, но ф. плотности
$\mathbb{P}\{X \leq a\}$	Ф. распр.	Ф. распр.

## Математическое ожидание

Среднее (средневзвешенное по вероятностям) значение случайной величины.

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{P}(X = x_1)x_1 + \mathbb{P}(X = x_2)x_2 + \dots$$

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

## Квантиль (перцентиль)

Значение, которое случайная величина не превышает с фиксированной вероятностью (если вероятность в процентах, то называется перцентиль).

$$\begin{cases} \mathbb{P}(X \leq a_\alpha) \geq \alpha, \\ \mathbb{P}(X \geq a_\alpha) \geq 1 - \alpha. \end{cases}$$

Для непрерывных распределений:  $F_X(a_\alpha) = \alpha$ .

## Медиана

Квантиль порядка 0.5.

# Меры центральной тенденции

## Мода (неформально)

Наиболее вероятное значение случайной величины.

Пример с ростом собак

## Дисперсия

Среднеквадратичное отклонение случайной величины относительно её математического ожидания.

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))^2] = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2.$$

## Стандартное отклонение

Корень из дисперсии.


$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

## Размах

Разность между наибольшим и наименьшим значением случайной величины.



# Обобщающая картинка (Wikimedia Commons)



## Два примера, которые спрашивают на собеседованиях

---





## Пример: среднее число посетителей

- В магазин ежедневно приходят посетители. Требуется оценить некоторую величину, характеризующую среднее число посетителей за день.
- Для оценки будем записывать число посетителей в течение 100 дней:

$$X_1, X_2, X_3 \dots X_{100}.$$

## Пример: среднее число посетителей (стандартное решение)

- Очевидный вариант – математическое ожидание.
- В качестве оценки математического ожидания рассчитаем среднее арифметическое по всем наблюдениям:

$$\hat{\mathbb{E}}(X) = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_{100}}{100}.$$

- Оценка математического ожидания равна среднему.  
Можно показать, что при некоторых условиях  $\hat{\mathbb{E}}$  является «хорошей» оценкой  $\mathbb{E}$ .

## Пример: среднее число посетителей (нестандартное решение)

- А что если  $X_1, \dots, X_{97}$  все меньше 3, а  $X_{98}, \dots, X_{100}$  все больше 40 (дни распродаж)?
- В качестве оценки средней величины разумнее взять медиану.





$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}[(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))] = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$

$$\text{sCov} = \frac{1}{N-1} \sum_{i=1}^N (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})$$

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

$$\text{scorr} = \frac{s\text{Cov}}{\text{std}_X \text{std}_Y}$$

## Примеры: доходы регионов и цвет



## Пример: задача из экзамена

