PRÁCTICAS · LÓGICA PROPOSICIONAL L0

Guía de prácticas

Sintaxis, formalización, tablas de verdad, deducción natural y tableaux, con el analizador de fórmulas y el comprobador de razonamientos.

Parte 1 · Sintaxis

PARTE 1

El lenguaje L0: sintaxis

Qué se puede escribir y qué no. Es la base de todo lo demás: si una expresión no es fórmula bien formada, no hay nada que calcular ni que demostrar.

Qué es una proposición

La lógica proposicional sólo trabaja con oraciones enunciativas: las que afirman o niegan algo y por tanto se pueden calificar de verdaderas o falsas. Las preguntas, las órdenes y los deseos quedan fuera.

Una proposición es una oración enunciativa que no puede descomponerse en partes que sean, a su vez, proposiciones. Si la puedes partir por un «y», un «o» o un «si… entonces», no es una proposición simple, sino una oración compuesta.

FRASE	¿PROPOSICIÓN?	POR QUÉ
Juan es alto	Sí	Afirma un hecho, es V o F
Llueve	Sí	Simple y con sentido completo
Llueve y hace frío	No	Se descompone en dos proposiciones
¿Qué hora es?	No	Interrogativa: no es ni verdadera ni falsa
Cierra la puerta	No	Exhortativa: no afirma ni niega nada

Regla de oro: las proposiciones se definen en positivo.
Si la frase dice «no vino a la fiesta», la proposición es P: «vino a la fiesta» y tú escribes $\neg P$. La negación la pones con la conectiva, nunca la escondes dentro de la letra. Si la metieras dentro, la fórmula sería sólo P y perderías la estructura: después no podrías aplicarle ninguna regla que hable de ¬, como la doble negación o la reducción al absurdo.

El alfabeto

PIEZA	SÍMBOLOS	PARA QUÉ SIRVE
Constantes	V, F	Los dos valores de verdad
Átomos o letras proposicionales	p, q, r, s…	Uno por cada proposición simple
Conectivas	¬ ∧ ∨ → ↔	Unen o modifican proposiciones
Auxiliares	( ) [ ] { }	Agrupan y deshacen ambigüedades

Fórmula bien formada (fbf)

Una fbf es una expresión que pertenece de verdad al lenguaje. Se construye con cuatro reglas, aplicadas tantas veces como haga falta:

1. Todo átomo es una fbf. También lo son las constantes V y F.
2. Si α es una fbf, entonces `¬α` es una fbf.
3. Si α y β son fbf, entonces `(α ∧ β)`, `(α ∨ β)`, `(α → β)` y `(α ↔ β)` son fbf.
4. Nada más es una fbf.

Para comprobar si algo es fbf se aplica el proceso hacia abajo: miras la conectiva principal, dices qué regla la genera, y esa regla te exige que sus partes sean a su vez fbf. Repites hasta llegar a átomos, que lo son por definición. Así se contesta el ejercicio 1 de la relación.

EXPRESIÓN	¿FBF?	MOTIVO
`p → q ∨ r`	Sí	La prioridad la lee como `p → (q ∨ r)`
`¬¬p`	Sí	La negación se puede encadenar
`p ∧ ∨ q`	No	Dos conectivas binarias seguidas: falta un operando
`p ¬ q`	No	La negación es unaria, no une dos fórmulas
`(p ∧ q`	No	Paréntesis sin cerrar
`p ⊢ q`	No	⊢ no es una conectiva: es metalenguaje

Prioridad de las conectivas

Los paréntesis se pueden ahorrar porque las conectivas tienen un orden fijo. De mayor a menor fuerza, según la guía:

`1 ¬` › `2 ∧` › `3 ∨` › `4 →` › `5 ↔`

«Más fuerte» significa que agarra menos texto a su alrededor. La negación sólo afecta a lo mínimo que tenga a su derecha; el bicondicional parte la fórmula entera en dos mitades.

SIN PARÉNTESIS	SE LEE COMO	CONECTIVA PRINCIPAL
`¬p ∧ q`	`(¬p) ∧ q`	∧
`¬(p ∧ q)`	`¬(p ∧ q)`	¬
`p ∧ q ∨ r`	`(p ∧ q) ∨ r`	∨
`p → q ∧ r`	`p → (q ∧ r)`	→
`p ∨ q ↔ ¬r`	`(p ∨ q) ↔ (¬r)`	↔

Las dos cosas que se llaman «prioridad» y conviene no mezclar. La **prioridad de agarre** es la escalera de arriba: dice dónde van los paréntesis implícitos, y la gana ¬. La **conectiva principal** o dominante es la última en aplicarse, la de agarre más débil dentro de esa fórmula concreta, y es la que da nombre a la fbf («esto es un condicional»). En `¬p ∧ q → r` la primera en calcularse es ¬ y la dominante es →: la fbf es un condicional.

Cuando la misma conectiva se repite. Según la guía, ∧ y ∨ se agrupan por la izquierda y → por la derecha: `p → q → r` es `p → (q → r)`. Los apuntes no fijan este detalle; es el convenio del libro de referencia (Huth y Ryan) y es lo que hace que el ejercicio 1.b tenga sentido. Aun así, cuando escribas tú una fórmula desde cero, pon el paréntesis: no cuesta nada y elimina la duda.

Ojo, dos convenios distintos. Las diapositivas de teoría (y el autotest, los exámenes y la relación de ejercicios de teoría) ponen ∧ y ∨ al mismo nivel, → y ↔ al mismo nivel, y agrupan de izquierda a derecha: `p → q → r` = `(p → q) → r`. La guía de prácticas sigue el convenio de Huth y Ryan. Sólo se notan en fórmulas como `p ∨ q ∧ r` o cadenas de →. En el examen, ante la duda, **pon paréntesis**. El analizador de abajo te deja elegir el convenio.

El árbol sintáctico

El árbol dibuja la estructura: en la raíz va la conectiva principal y en las hojas los átomos. Dos fórmulas representan la misma oración si y sólo si tienen el mismo árbol. Es la herramienta para contestar la segunda parte del ejercicio 1.

HERRAMIENTA

Analizador de fórmulas

Escribe cualquier fórmula: te digo si es fbf, cómo se lee con todos los paréntesis, su conectiva principal, el árbol sintáctico, el orden de aplicación y la tabla de verdad. También vale escribir con el teclado: `~` o `!` para ¬, `&` para ∧, `|` para ∨, `->` para → y `<->` para ↔.

Fórmula

`(¬p ∧ q) → (r ∨ ¬s)`

¬ ∧ ∨ → ↔ ( )


Convenio de prioridad

Guía de prácticas (Huth y Ryan): ¬ › ∧ › ∨ › → › ↔, la → agrupa por la derecha

✔ Es una fbf

Con todos los paréntesis	`(¬p ∧ q) → (r ∨ ¬s)`
Conectiva principal	→ · condicional

Árbol sintáctico



Orden de aplicación

1. Se aplica ¬: `¬p`
2. Se aplica ∧: `¬p ∧ q`
3. Se aplica ¬: `¬s`
4. Se aplica ∨: `r ∨ ¬s`
5. Se aplica →: `(¬p ∧ q) → (r ∨ ¬s)` `define la fbf`

Tabla de verdad

p	q	r	s	¬p	¬p ∧ q	¬s	r ∨ ¬s	(¬p ∧ q) → (r ∨ ¬s)
V	V	V	V	F	F	F	V	V
V	V	V	F	F	F	V	V	V
V	V	F	V	F	F	F	F	V
V	V	F	F	F	F	V	V	V
V	F	V	V	F	F	F	V	V
V	F	V	F	F	F	V	V	V
V	F	F	V	F	F	F	F	V
V	F	F	F	F	F	V	V	V
F	V	V	V	V	V	F	V	V
F	V	V	F	V	V	V	V	V
F	V	F	V	V	V	F	F	F
F	V	F	F	V	V	V	V	V
F	F	V	V	V	F	F	V	V
F	F	V	F	V	F	V	V	V
F	F	F	V	V	F	F	F	V
F	F	F	F	V	F	V	V	V

Contingente: satisfacible pero no válida (15 de 16 filas verdaderas).

Cómo usarlo para el ejercicio 1. Analiza las dos fórmulas por separado y compara los árboles, no el texto. Si los árboles coinciden, representan la misma oración; si no, no. Mira también la línea «conectiva principal»: si una es un condicional y la otra una disyunción, ya está contestado.

Parte 2 · Formalizar

PARTE 2

Formalizar: del castellano a la fórmula

La parte con más trampas de toda la asignatura, porque el lenguaje natural dice lo mismo de muchas maneras y a veces en otro orden.

El método, en cuatro pasos

Formalizar no es traducir palabra por palabra: es analizar qué dice la oración y escribirlo en el lenguaje formal. El orden de los pasos importa.

- ☐ Lee la frase entera y localiza las partes que son proposiciones simples.
- ☐ Identifica el nexo y escribe su patrón general con α y β («No α a menos que β») junto a su forma lógica (`α → β`). Este paso decide la conectiva y, en los condicionales, quién va delante de la flecha.
- ☐ Escribe la signatura: una letra por proposición, siempre en sentido positivo y como oración completa con sujeto y verbo.
- ☐ Sustituye α y β por lo que valgan en esta frase concreta y escribe la fbf.

> **Por qué el nexo va antes que la signatura.** Si escribes las letras primero, es muy fácil colocarlas en el orden en que aparecen en la frase. Pero en «No te vendo el coche ya que no me ofreces el dinero», la causa se dice la segunda y es la que va delante de la flecha. El patrón del nexo te da el orden correcto antes de que puedas equivocarte.

Las tres reglas que ahorran la mayoría de los errores:

- **No añadas nada que la oración no diga.** Ni contexto, ni implicaciones que tú das por supuestas.
- **Mantén un criterio homogéneo:** si decides que «pero» es ∧, lo es en todo el ejercicio.
- **Parafrasea las frases dudosas:** dilas con otras palabras sin cambiar el sentido y verás cuál es la condición y cuál el resultado.

Un ejemplo completo

«Mi coche no tiene tantos caballos como el tuyo, pero corre más.»

PASO	RESULTADO	NOTA
1	P: «mi coche tiene tantos caballos como el tuyo»	proposición en positivo
2	Q: «mi coche corre más que el tuyo»	proposición en positivo

PASO	RESULTADO	NOTA
3	$\neg P \wedge Q$	«no» + «pero»

Fíjate en dos cosas: «pero» se traduce como conjunción, porque lógicamente afirma las dos partes, y la negación se saca fuera del átomo.

El condicional, por dentro

En $P \rightarrow Q$, P es el antecedente (la condición) y Q el consecuente (el resultado). Ese orden no siempre coincide con el orden de las palabras en la frase. Las dos lecturas que hay que memorizar:

EXPRESIÓN	SE FORMALIZA	REGLA PARA RECORDARLO
P es suficiente para Q	$P \rightarrow Q$	Con P basta: lo suficiente va delante
P es necesario para Q	$Q \rightarrow P$	Sin P no hay Q: lo necesario va detrás

Las trampas clásicas

EXPRESIÓN	FORMALIZA	POR QUÉ
P si Q	$Q \rightarrow P$	«si» marca la condición: Q es el antecedente aunque vaya detrás
P sólo si Q	$P \rightarrow Q$	Q es lo imprescindible: si hay P, hay Q
P porque Q	$Q \rightarrow P$	La causa es el antecedente, aunque se diga la segunda
No P a menos que Q	$P \rightarrow Q$	El «no» ya está dentro del patrón: no se escribe otra vez
Ni P ni Q	$\neg P \wedge \neg Q$	Niega las dos cosas a la vez, no una u otra
P pero Q	$P \wedge Q$	El contraste es pragmático; lógicamente afirma las dos
No sólo P sino también Q	$P \wedge Q$	El «no» es parte de la locución, no niega nada
Es necesario Q para P	$P \rightarrow Q$	Sin Q no hay P
Es suficiente P para Q	$P \rightarrow Q$	Con P basta para tener Q

El error que más se repite en toda la relación. Hay nexos que ya llevan el «no» dentro del patrón. «No α a menos que β» equivale a `α → β`, sin ninguna negación en la solución. Si además escribes ¬, estás negando dos veces lo mismo.
Compáralo con «α sólo si β», que también da `α → β` pero donde un «no» que aparezca en la frase sí es una negación real que hay que escribir. En el ejercicio 3.c, «No voy al cine a menos que no llueva», hay dos «no» y sólo uno llega a la fórmula: `p → ¬q`.

Diccionario de nexos

La misma conectiva se esconde tras muchas expresiones. Cuando una expresión cumple la misma función lógica que «no», «y», «o», «si» o «si y sólo si», se formaliza con esa conectiva aunque suene distinta.

Escribe para filtrar (por ejemplo «menos», «porque», «cuando»)

nexo…

¬α	No α · Es falso que α · No es el caso que α · No sucede que α · No es cierto que α · Ni α
α ∧ β	α y (e) β · No sólo α sino también β · α , (;) β · α pero β · α y además β · α aunque β · α además de β · α sin embargo β · α y sobre todo β · α no obstante β · α y también β · α a pesar de β · α junto con β
α ∨ β	α o β · Bien α, bien β · O bien α o bien β · Tan pronto α como β · Ya α, ya β
α → β	Si α entonces β · Si α, (;) β · Siempre que α, β · Puesto que α, β · Es suficiente α para que β · Es necesario β para que α · α sólo si β · Sólo α si β · β porque α · β ya que α · No α a menos que β · A no ser que β no α · α cuando β → ¡ojo! se formaliza β → α
α ↔ β	α si y sólo si β · α equivale a β · α, es decir β · α, o sea β · α cuando y sólo cuando β · α es suficiente y necesaria para que β
α ⊨ β razonamiento	α luego β · α por consiguiente β · α así que β · α así pues β · α por lo tanto β

Razonamiento o condicional

Hay frases que no son un condicional aunque lo parezcan: las que presentan información ya ocurrida y sacan una conclusión de ella. Compara:

FRASE	SE FORMALIZA	MOTIVO
Si cerramos a las 20:00, no podemos venderte nada	`P → Q`	El antecedente es una condición hipotética
Hemos cerrado a las 20:00, por lo tanto no podemos venderte nada	`P ⊢ Q`	El antecedente ya ha ocurrido: es una premisa

Los nexos «luego», «así que», «por lo tanto», «por consiguiente» y «así pues» anuncian una conclusión, no un consecuente. Se marcan con ⊨ (nivel semántico) o con ⊢ (nivel sintáctico).

Para formalizar un razonamiento: separa las premisas de la conclusión, formaliza cada parte por separado y escribe el esquema completo, por ejemplo `{P → Q, ¬P → R} ⊢ (P ∨ ¬P) → S`.

> **Formalizar no es juzgar.** «Voy al cine luego llueve» se formaliza `p ⊨ q` y la formalización es correcta, aunque el razonamiento sea malísimo. Comprobar si un razonamiento es válido es otro trabajo distinto, el de las tablas de verdad y la deducción natural.

> **Los símbolos que nunca van dentro de una fbf.** ⊨, ⊢ y ≡ pertenecen al metalenguaje: hablan *sobre* las fórmulas. No son conectivas, no se pueden negar ni combinar con ∧, y no pueden aparecer dentro de una fórmula. Sólo separan premisas de conclusión, o relacionan dos fórmulas.

Parte 3 · Tablas de verdad

PARTE 3

Semántica: tablas de verdad

Qué significa cada conectiva, cómo se clasifica una fórmula y cómo se comprueba si un razonamiento es válido probando todas las interpretaciones.

Qué hace cada conectiva

SÍMBOLO	NOMBRE	SE LEE	ES VERDADERA CUANDO…
¬	Negación	«no», «no es cierto que»	lo que niega es falso. Invierte el valor
∧	Conjunción	«y», «pero», «aunque»	las dos partes son verdaderas. Basta una falsa para tumbarla
∨	Disyunción	«o», «o bien»	al menos una es verdadera. Es inclusiva: si se cumplen las dos, también
→	Condicional	«si… entonces», «sólo si»	no ocurre que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso. Sólo falla en V → F
↔	Bicondicional	«si y sólo si», «equivale a»	las dos partes tienen el mismo valor

Si te quedas con una sola fila, que sea la segunda (p = V, q = F). El condicional sólo es falso cuando la promesa se rompe: antecedente verdadero y consecuente falso. En los otros tres casos es verdadero, incluso cuando el antecedente es falso. Por eso «si 2+2=5 entonces soy el Papa» es una fórmula verdadera. La tabla completa la tienes en Teoría → Chuletas → Conectivas.

Cómo se construye una tabla

- Con n letras distintas hay 2^n filas: 2 letras dan 4 filas, 3 dan 8, 4 dan 16, 5 dan 32.
- Se pone una columna por cada letra y luego una por cada subfórmula, de dentro hacia fuera, hasta la fórmula completa.
- El orden habitual de las filas es contar en binario con V arriba: la primera fila es todo V y la última todo F.
- La última columna es la de la fórmula completa, y es la que decide el tipo de oración.

TIPO	COLUMNA FINAL	¿SATISFACIBLE?	QUÉ SIGNIFICA
Tautología (válida)	Todo V	Sí	Verdadera en cualquier interpretación
Contingente	Hay V y F	Sí	Verdadera en unas interpretaciones y falsa en otras
Contradicción (insatisfacible)	Todo F	No	Falsa en cualquier interpretación

Satisfacible quiere decir que existe al menos una fila que la hace verdadera. Por tanto las tautologías y las contingentes son satisfacibles, y sólo las contradicciones no lo son. Esto es lo que pregunta el ejercicio 4.

> **Atajo para no hacer la tabla entera.** Para saber si $\alpha \to \beta$ es tautología no hace falta rellenarlo todo: basta con buscar si puede darse el único caso malo, antecedente V y consecuente F. Si demuestras que ese caso es imposible, es tautología. Es la misma idea que está detrás de los tableaux de la parte 5.

Consecuencia lógica y equivalencia

Un razonamiento $\{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\} \models \beta$ es válido cuando no existe ninguna interpretación que haga verdaderas todas las premisas y falsa la conclusión. Para comprobarlo con tablas: construye la tabla de todas las premisas y de la conclusión, quédate sólo con las filas donde todas las premisas son verdaderas y mira la conclusión en esas filas. Si en todas ellas es verdadera, es válido.

Una interpretación que hace verdaderas las premisas y falsa la conclusión es un **contraejemplo**, y basta uno para tumbar el razonamiento.

Dos fórmulas son equivalentes ($\alpha \equiv \beta$) cuando tienen la misma columna final, fila a fila. Equivale a decir que $\alpha \leftrightarrow \beta$ es una tautología, y también a que $\alpha \vdash \beta$ y $\beta \vdash \alpha$.

HERRAMIENTA

Comprobador de razonamientos

Mete tus premisas y la conclusión. Viene cargado el ejercicio 7.

Premisa 1

```
(p → q) ∧ (¬p → r)
```

Premisa 2

```
p ∨ ¬p
```

+ Añadir premisa **− Quitar la última**

Conclusión

```
q ∨ r
```

¬ ∧ ∨ → ↔ ( )

Convenio de prioridad

Guía de prácticas (Huth y Ryan): ¬ › ∧ › ∨ › → › ↔, la → agrupa por la derecha

`{ (p → q) ∧ (¬p → r), p ∨ ¬p } ⊨ q ∨ r`

✔ Válido

No existe ninguna interpretación que haga verdaderas todas las premisas y falsa la conclusión, así que la deducción se puede demostrar.

De las 8 interpretaciones posibles, en 4 se cumplen todas las premisas. En verde, las filas donde además se cumple la conclusión; en rojo, las que son contraejemplo.

p	q	r	(p → q) ∧ (¬p → r)	p ∨ ¬p	q ∨ r
V	V	V	V	V	V
V	V	F	V	V	V
V	F	V	F	V	V
V	F	F	F	V	F
F	V	V	V	V	V
F	V	F	F	V	V
F	F	V	V	V	V
F	F	F	F	V	F

Para qué te sirve de verdad. Antes de pelearte con una demostración, comprueba que el razonamiento es válido. Si el comprobador te da un contraejemplo, no existe ninguna demostración y lo que tienes mal es la formalización, no la deducción. Eso ahorra mucho tiempo perdido.

Parte 4 · Deducción natural

PARTE 4

Deducción natural

Derivar la conclusión a partir de las premisas aplicando reglas, sin mirar valores de verdad. Es lo que más peso tiene en las prácticas.

Los dos niveles

Con tablas compruebas que la conclusión se sigue de las premisas probando todas las interpretaciones: es el nivel semántico, y se escribe $\models$. Con deducción natural la derivas aplicando reglas: es el nivel sintáctico, y se escribe $\vdash$.

En L0 los dos siempre dan la misma respuesta, porque el sistema es correcto (todo lo que se deduce es válido) y completo (todo lo válido se puede deducir). La ventaja de la deducción es el tamaño: con diez letras una tabla tiene 1024 filas, y una demostración suele caber en diez líneas. La desventaja es que hay que buscarla.

El sistema tiene dos piezas: los axiomas, que son las premisas del problema, y 13 reglas básicas. Nada más.

La notación Fitting

Cada línea lleva su número, la fórmula y la justificación, que dice qué regla has aplicado y sobre qué líneas. Las premisas van primero, sin justificar. Cuando haces un supuesto, abres una caja (aquí, la barra vertical): dentro derivas lo que necesites y al cerrarla obtienes una conclusión que ya no depende de él. La última línea, siempre fuera de toda caja, es la conclusión del problema.

Ejemplo: $\{ p \to q, \neg q \} \vdash \neg p$

1	$p \to q$	Premisa
2	$\neg q$	Premisa
3	p	Supuesto (para I¬)
4	q	E→ 1, 3
5	$q \wedge \neg q$	I∧ 4, 2
6	$\neg p$	I¬ 3-5

El alcance de las cajas

> **La regla, tal como la dan los apuntes:** una regla puede usar una o dos fbf que estén por encima suya en la demostración, salvo que estén en una caja ya cerrada.

Todo lo que derivas dentro de una caja depende del supuesto que la abre. Cuando la cierras, ese supuesto deja de estar en vigor y todo lo que dependía de él desaparece con él. Lo único que sobrevive es la línea que genera la propia regla de cierre, justo debajo de la caja. En el ejemplo de arriba, las líneas 3, 4 y 5 ya no pueden citarse después de la línea 6. La línea 6 sí, porque está fuera.

Dentro de una caja sí puedes usar los supuestos de las cajas que la contienen, porque siguen abiertas. Las cajas se cierran en orden inverso al que se abren, igual que los paréntesis.

> **El error típico en el examen:** cerrar una caja y, tres líneas después, citar algo que quedó dentro. Es tentador porque la fórmula sigue escrita en el papel, pero ya no vale. Antes de citar una línea, mira si hay alguna caja cerrada entre ella y donde estás.

Las 13 reglas básicas

Cada conectiva tiene una regla para introducirla (construir una fórmula que la lleve) y otra para eliminarla (aprovechar una que ya la tiene). A eso se añaden la doble negación, la iteración y CONTRA.

I∧

$$\frac{\alpha \quad \beta}{\alpha \wedge \beta}$$

Si tienes las dos por separado, puedes juntarlas.

E∧

$$\frac{\alpha \wedge \beta}{\alpha \cdot \beta}$$

De una conjunción sacas cualquiera de sus partes.

I∨

$$\frac{\alpha}{\alpha \vee \beta \cdot \beta \vee \alpha}$$

Con una parte basta: β puede ser cualquier fbf.

E∨

prueba por casos · dos cajas

$$\frac{\alpha \vee \beta \qquad [\text{supón } \alpha \ldots \gamma] \quad [\text{supón } \beta \ldots \gamma]}{\gamma}$$

Si γ sale en los dos casos, γ es cierta pase lo que pase.

I→

teorema de la deducción · una caja

$$\frac{[\text{supón } \alpha \ldots \text{obtén } \beta]}{\alpha \to \beta}$$

La forma estándar de demostrar un condicional.

E→

modus ponens

$$\frac{\alpha \to \beta \quad \alpha}{\beta}$$

Si se cumple la condición, tienes el resultado.

I¬

reducción al absurdo · una caja

$$\frac{[\text{supón } \alpha \ldots \text{obtén } \beta \wedge \neg\beta]}{\neg\alpha}$$

E¬

reducción al absurdo · una caja

$$\frac{[\text{supón } \neg\alpha \ldots \text{obtén } \beta \wedge \neg\beta]}{\alpha}$$

E¬¬

$$\frac{\neg\neg\alpha}{\alpha}$$

Dos negaciones se cancelan.

Si suponer α rompe el sistema, α era falsa.

La versión para demostrar una fórmula afirmada.

I↔

$$\frac{\alpha \to \beta \quad \beta \to \alpha}{\alpha \leftrightarrow \beta}$$

Necesitas los dos condicionales, uno en cada sentido.

E↔

$$\frac{\alpha \leftrightarrow \beta}{\alpha \to \beta \cdot \beta \to \alpha}$$

Un bicondicional guarda dentro dos condicionales.

IT

iteración

$$\frac{\alpha}{\alpha}$$

Repite una línea para tenerla donde la necesitas.

CONTRA

$$\frac{\alpha \quad \neg\alpha}{\beta}$$

De una contradicción se sigue cualquier fbf.

Sólo cuatro reglas abren caja: E∨ (dos cajas) y I→, I¬, E¬ (una cada una). Las otras nueve trabajan con líneas que ya tienes.

No confundas CONTRA con la reducción al absurdo. En I¬ y E¬ abres una caja con un supuesto y buscas una contradicción dentro; al cerrarla concluyes lo contrario de lo que supusiste. En CONTRA no hay supuesto ni caja: si ya tienes α y ¬α a la vista, de ahí puedes escribir la fórmula que necesites. Lo usarás sobre todo para que las dos cajas de una prueba por casos acaben en la misma fórmula.

Las seis estrategias

Las reglas dicen qué es legal; las estrategias dicen qué conviene. Casi siempre es la forma de la conclusión la que decide por dónde empezar.

SI LA CONCLUSIÓN ES…	ESTRATEGIA	QUÉ HACES
α → β	Teorema de la deducción · I→	Caja con supuesto α hasta obtener β; cerrar con I→
¬α	Reducción al absurdo · I¬	Caja con supuesto α hasta β ∧ ¬β
α (afirmada)	Reducción al absurdo · E¬	Caja con supuesto ¬α hasta β ∧ ¬β

SI LA CONCLUSIÓN ES…	ESTRATEGIA	QUÉ HACES
`α ∧ β`	Conclusiones parciales	Conseguir cada parte por separado y unirlas con I∧
`α ∨ β`	Conclusiones parciales	Basta con una de las dos: I∨ añade la otra
⊢ ϕ (sin premisas)	Demostración de teoremas	Empezar con caja: teorema de la deducción o absurdo
hay una premisa `α ∨ β`	Prueba por casos · E∨	Una caja por rama; las dos acaban en la misma γ

> **Consejo práctico:** empieza siempre por lo que no cuesta nada. Aplica primero las reglas que no necesitan supuestos (E∧, E→, E↔, E¬¬) para desmontar las premisas. Muchas veces, después de eso, la demostración ya está casi hecha. Abre cajas sólo cuando la conclusión te lo pida.

Las cinco situaciones, con un ejemplo de cada una

Deducción directa · sin ningún supuesto. Las premisas ya contienen todo. Aquí E¬¬ limpia la doble negación e I∧ construye el antecedente exacto que E→ necesita, porque tener p y q sueltas no es tener `p ∧ q`.

`{ (p ∧ q) → (r ∧ s), ¬¬p, q } ⊢ s`

1	`(p ∧ q) → (r ∧ s)`	Premisa
2	`¬¬p`	Premisa
3	`q`	Premisa
4	`p`	E¬¬ 2
5	`p ∧ q`	I∧ 4, 3
6	`r ∧ s`	E→ 1, 5
7	`s`	E∧ 6

Teorema de la deducción · conclusión con forma α → β. Dos condicionales anidados, dos cajas. En la línea 4 se usan los supuestos de las dos cajas a la vez, y se puede porque ninguna se ha cerrado todavía.

`{ (p ∧ q) → r } ⊢ p → (q → r)`

1	(p ∧ q) → r	Premisa
2	p	Supuesto (para I→)
3	q	Supuesto (para I→)
4	p ∧ q	I∧ 2, 3
5	r	E→ 1, 4
6	q → r	I→ 3-5
7	p → (q → r)	I→ 2-6

Prueba por casos · hay una premisa disyuntiva. Cada caso da un resultado distinto, r en uno y s en otro, pero E∨ exige que las dos cajas terminen en la misma fórmula. Por eso se da un paso más con I∨ en cada una hasta `r ∨ s`.

`{ p ∨ q, p → r, q → s } ⊢ r ∨ s`

1	p ∨ q	Premisa
2	p → r	Premisa
3	q → s	Premisa
4	p	Supuesto (para E∨)
5	r	E→ 2, 4
6	r ∨ s	I∨ 5
7	q	Supuesto (para E∨)
8	s	E→ 3, 7
9	r ∨ s	I∨ 8
10	r ∨ s	E∨ 1, 4-6, 7-9

Reducción al absurdo · conclusión negada. Se supone lo contrario de la conclusión y se busca una contradicción. La contradicción se escribe con la forma `β ∧ ¬β` en una sola línea, no como dos líneas sueltas.

$\{ (p \land q) \to r,\ r \to s,\ \neg s \land p \} \vdash \neg q$

1	$(p \land q) \to r$	Premisa
2	$r \to s$	Premisa
3	$\neg s \land p$	Premisa
4	$\neg s$	E∧ 3
5	p	E∧ 3
6	q	Supuesto (para I¬)
7	$p \land q$	I∧ 5, 6
8	r	E→ 1, 7
9	s	E→ 2, 8
10	$s \land \neg s$	I∧ 9, 4
11	$\neg q$	I¬ 6-10

CONTRA e IT · las dos reglas que parecen tontas. En el caso q hay p y ¬p a la vista, así que CONTRA permite escribir directamente la r que hace falta, sin abrir caja. En el caso r, el supuesto ya es la fórmula buscada, pero la caja tiene que *terminar* en ella: para eso sirve IT.

$\{ p \to (q \lor r),\ q \to \neg p \} \vdash p \to r$

1	$p \to q \lor r$	Premisa
2	$q \to \neg p$	Premisa
3	p	Supuesto (para I→)
4	$q \lor r$	E→ 1, 3
5	q	Supuesto (para E∨)
6	$\neg p$	E→ 2, 5
7	r	CONTRA 3, 6
8	r	Supuesto (para E∨)
9	r	IT 8
10	r	E∨ 4, 5-7, 8-9
11	$p \to r$	I→ 3-10

Reglas derivadas

Cualquier problema ya demostrado puede convertirse en una regla nueva del sistema. Los apuntes destacan tres:

MT

`modus tollens`

$$\frac{\alpha \to \beta \quad \neg\beta}{\neg\alpha}$$

Si falta el resultado, no se dio la condición.

SD

`silogismo disyuntivo`

$$\frac{\alpha \vee \beta \quad \neg\alpha}{\beta}$$

Descartada una rama, queda la otra.

SH

`silogismo hipotético`

$$\frac{\alpha \to \beta \quad \beta \to \gamma}{\alpha \to \gamma}$$

Los condicionales encadenan.

> **Cuándo puedes usarlas:** sólo si el enunciado no lo prohíbe. Los ejercicios 6 y 11 piden expresamente las 13 reglas básicas, así que allí hay que demostrar el modus tollens entero cada vez. En un ejercicio que no lo prohíba, «MT 2, 4» en una línea te ahorra cuatro.

Equivalencias

Dos fbf son equivalentes ($\alpha \equiv \beta$) cuando se deducen la una de la otra en las dos direcciones. Demostrar una equivalencia son dos demostraciones, una por sentido. Una vez demostrada, también puede usarse como regla derivada.

LEY	EQUIVALENCIAS
De Morgan	$\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv \neg\alpha \vee \neg\beta$ $\neg(\alpha \vee \beta) \equiv \neg\alpha \wedge \neg\beta$
Conmutativas	$\alpha \wedge \beta \equiv \beta \wedge \alpha$ $\alpha \vee \beta \equiv \beta \vee \alpha$
Doble negación	$\alpha \equiv \neg\neg\alpha$
Asociativas	$(\alpha \wedge \beta) \wedge \gamma \equiv \alpha \wedge (\beta \wedge \gamma)$ $(\alpha \vee \beta) \vee \gamma \equiv \alpha \vee (\beta \vee \gamma)$
Distributivas	$\alpha \wedge (\beta \vee \gamma) \equiv (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \gamma)$ $\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) \equiv (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$
Transposición	$\alpha \to \beta \equiv \neg\beta \to \neg\alpha$

Ejemplo: De Morgan demostrada en las dos direcciones. Ida: dos reducciones al absurdo independientes, una por cada mitad de la conjunción.

`{ ¬(p ∨ q) } ⊢ ¬p ∧ ¬q`

1	¬(p ∨ q)	Premisa
2	| p	Supuesto (para I¬)
3	| p ∨ q	I∨ 2
4	| (p ∨ q) ∧ ¬(p ∨ q)	I∧ 3, 1
5	¬p	I¬ 2-4
6	| q	Supuesto (para I¬)
7	| p ∨ q	I∨ 6
8	| (p ∨ q) ∧ ¬(p ∨ q)	I∧ 7, 1
9	¬q	I¬ 6-8
10	¬p ∧ ¬q	I∧ 5, 9

Vuelta: aquí está el truco de CONTRA. En el caso q la contradicción natural sería `q ∧ ¬q`, pero E∨ exige que las dos cajas acaben igual, así que se escribe la misma `p ∧ ¬p` del otro caso.

`{ ¬p ∧ ¬q } ⊢ ¬(p ∨ q)`

1	¬p ∧ ¬q	Premisa
2	¬p	E∧ 1
3	¬q	E∧ 1
4	| p ∨ q	Supuesto (para I¬)
5	| | p	Supuesto (para E∨)
6	| | p ∧ ¬p	I∧ 5, 2
7	| | q	Supuesto (para E∨)
8	| | p ∧ ¬p	CONTRA 7, 3
9	| p ∧ ¬p	E∨ 4, 5-6, 7-8
10	¬(p ∨ q)	I¬ 4-9

Parte 5 · Tableaux

PARTE 5

Tableaux semánticos

Una técnica SAT: en vez de derivar la conclusión, se busca el contraejemplo. Si no existe, el razonamiento es válido.

La idea

Un razonamiento es válido si no existe ninguna interpretación que haga verdaderas todas las premisas y falsa la conclusión. El tableau busca exactamente esa interpretación. Si la encuentra, tienes el contraejemplo; si demuestra que no puede existir, el razonamiento es válido. A diferencia de la deducción natural, es mecánico: no hay que elegir estrategia, sólo aplicar reglas hasta que no queden fórmulas que descomponer.

1. Se escriben las premisas y la negación de la conclusión. Esa es la situación que buscamos: todo verdadero a la vez.
2. Se descomponen las fórmulas con las reglas de abajo, hasta que sólo queden letras, afirmadas o negadas.
3. Una rama que contiene una fórmula y su negación es imposible y se cierra (×).
4. Si todas las ramas se cierran, el contraejemplo no existe y el razonamiento es válido. Si alguna queda abierta, sus letras te dan un contraejemplo concreto.

REGLAS A · NO RAMIFICAN	AÑADEN A LA RAMA	REGLAS B · RAMIFICAN	RAMA IZQ. | RAMA DER.
$\alpha \wedge \beta$	α, β	$\alpha \vee \beta$	$\alpha \mid \beta$
$\neg(\alpha \vee \beta)$	$\neg\alpha$, $\neg\beta$	$\neg(\alpha \wedge \beta)$	$\neg\alpha \mid \neg\beta$
$\neg(\alpha \rightarrow \beta)$	α, $\neg\beta$	$\alpha \rightarrow \beta$	$\neg\alpha \mid \beta$
$\neg\neg\alpha$	α	$\alpha \leftrightarrow \beta$	$\alpha, \beta \mid \neg\alpha, \neg\beta$
		$\neg(\alpha \leftrightarrow \beta)$	$\alpha, \neg\beta \mid \neg\alpha, \beta$

Truco para que el árbol salga pequeño: aplica primero todas las reglas α, que no ramifican, y después las β, empezando por las que cierran alguna rama enseguida. Cada vez que ramificas, el árbol se duplica. En cada línea conviene anotar de qué línea sale.

> **Sobre la notación.** La guía usa la notación estándar (árbol con reglas α y β, líneas numeradas y cierre marcado con ×) y trata `α ↔ β` como β-regla. En las diapositivas de teoría `α ↔ β` aparece como α-fórmula con componentes `α → β` y `β → α`: las dos formas son correctas y llegan al mismo resultado. Si en clase lo dibujáis de otra forma, adapta la presentación; el razonamiento es el mismo.

Un tableau completo

Es el ejercicio 8: el razonamiento de Rosa, el mismo que el 7 pero resuelto por este método. Partimos de las dos premisas y de la conclusión negada, `¬(q ∨ r)`.

1 · `(p → q) ∧ (¬p → r)` — premisa

2 · `p ∨ ¬p` — premisa

3 · `¬(q ∨ r)` — conclusión negada

4 · `p → q` — de 1 (α)

5 · `¬p → r` — de 1 (α)

6 · `¬q` — de 3 (α)

7 · `¬r` — de 3 (α)

Ramificamos la línea 4, `p → q` (β)

Rama: **8 · `¬p` (de 4)**

Ramificamos la línea 5, `¬p → r` (β)

Rama: **9 · `¬¬p` (de 5)**

✘ cierra con 8 y 9

Rama: **10 · `r` (de 5)**

✘ cierra con 7 y 10

Rama: **11 · `q` (de 4)**

✘ cierra con 6 y 11

Líneas 4 a 7: reglas α, sin ramificar. La conjunción de la línea 1 da sus dos condicionales, y la disyunción negada de la 3 da ¬q y ¬r. Después se ramifica la línea 4: o bien ¬p, o bien q. La rama de q cierra enseguida con ¬q. La de ¬p necesita ramificar la línea 5: ¬¬p cierra con ¬p, y r cierra con ¬r. Las tres ramas se cierran: el razonamiento es válido.

Fíjate en que la premisa 2, `p ∨ ¬p`, no ha hecho falta. Es una tautología, verdadera en cualquier interpretación, así que no puede ayudar a descartar nada. En la deducción natural del ejercicio 7, en cambio, era imprescindible: es la disyunción que abre la prueba por casos.

Los tres métodos, comparados

	TABLAS DE VERDAD	DEDUCCIÓN NATURAL	TABLEAU SEMÁNTICO
Qué demuestra	Validez, $\models$	Deducción correcta, $\vdash$	Validez, $\models$
Nivel	Semántico	Sintáctico	Semántico
Cómo se trabaja	Mecánico pero crece 2^n	Hay que elegir estrategia	Mecánico: reglas hasta cerrar
Si NO es válido	Ves la fila del contraejemplo	No encuentras la demostración, sin saber si existe	Queda una rama abierta con el contraejemplo
Tamaño	32 filas con 5 letras	Suele caber en 10 líneas	Depende de cuántas β haya

Por qué los tres coinciden siempre: la deducción natural de L0 es correcta y completa. Todo lo que se deduce es válido, y todo lo válido se puede deducir. Por eso $\vdash$ y $\models$ dan siempre la misma respuesta, y por eso puedes comprobar con una tabla antes de ponerte a demostrar.

Parte 6 · Chuleta y errores

PARTE 6

Chuleta y errores típicos

Lo esencial de un vistazo y la lista de comprobación antes de entregar.

Resumen de un vistazo

SI EL ENUNCIADO DICE…	LO QUE TE PIDE	DÓNDE MIRAR
«¿Es fbf? ¿Representan la misma oración?»	Reglas de formación + árbol sintáctico	Parte 1
«Definir una signatura y construir las fbf»	Nexo → signatura → solución	Parte 2
«Comprobar el tipo de oración por tablas»	Tautología / contingente / contradicción	Parte 3
«¿Qué puedes decir sobre la satisfacibilidad?»	¿Hay alguna fila verdadera?	Parte 3
«Formalizar el razonamiento»	Separar premisas y conclusión; ⊢, no →	Parte 2
«¿Es una deducción correcta?»	Demostrar por deducción natural	Parte 4
«Utilizando las 13 reglas básicas»	Sin MT, SD ni SH	Parte 4
«¿Es un razonamiento válido? Técnica SAT»	Tableau semántico	Parte 5

Los errores que más se repiten

ERROR	POR QUÉ ESTÁ MAL
Meter la negación dentro del átomo	Pierdes la estructura: luego no puedes aplicar ninguna regla que hable de ¬
Escribir ¬ con «no α a menos que β»	El «no» ya forma parte del patrón del nexo: lo estarías contando dos veces
Confundir suficiente con necesario	Lo suficiente va delante de la flecha; lo necesario, detrás
Formalizar «luego» o «por lo tanto» como →	Anuncian una conclusión, no un consecuente: es ⊢
Meter ⊢ o ⊨ dentro de una fórmula	No son conectivas, son metalenguaje

ERROR	POR QUÉ ESTÁ MAL
Citar una línea de una caja ya cerrada	Se dedujo bajo un supuesto que ya has retirado
Cerrar las dos cajas de E∨ en fórmulas distintas	La regla exige la misma γ: ajusta con I∨, IT o CONTRA
Aplicar E→ sin el antecedente exacto	Tener p y q sueltas no es tener p ∧ q: únelas con I∧
Escribir la contradicción en dos líneas sueltas	I¬ y E¬ exigen la forma β ∧ ¬β en una sola línea
Confundir CONTRA con la reducción al absurdo	CONTRA no abre caja ni concluye lo contrario de nada
Terminar la demostración dentro de una caja	La conclusión no puede depender de ningún supuesto
Olvidar negar la conclusión en un tableau	El tableau busca el contraejemplo: parte de la conclusión negada

Antes de entregar

Si has formalizado

- ☐ ¿Todas las letras están definidas en positivo y como oraciones completas con sujeto y verbo?
- ☐ ¿Cada ¬ de la fórmula corresponde a un «no» real de la frase, y no a uno que ya estaba en el patrón del nexo?
- ☐ ¿He parafraseado los condicionales para confirmar quién es el antecedente?
- ☐ ¿He usado el mismo criterio en todos los apartados del ejercicio?
- ☐ ¿He añadido algo que la frase no decía?

Si has demostrado

- ☐ ¿Cada línea cita sólo líneas que están por encima y fuera de cajas cerradas?
- ☐ ¿Cada caja empieza con un supuesto y termina en lo que su regla de cierre necesita?
- ☐ ¿Las dos cajas de cada E∨ acaban en la misma fórmula?
- ☐ ¿La última línea es la conclusión del enunciado y está fuera de toda caja?
- ☐ Si el enunciado pedía las 13 básicas, ¿he evitado MT, SD y SH?

Si has hecho un tableau

- ☐ ¿La raíz son las premisas y la conclusión negada?
- ☐ ¿He aplicado antes las reglas α que las β?

☐ ¿Cada línea indica de qué línea sale?

☐ ¿He marcado con qué par de fórmulas cierra cada rama?

☐ Si alguna rama ha quedado abierta, ¿he escrito el contraejemplo que da?

Material construido a partir de los apuntes «Formalización en lógica proposicional (L0)» y «Sistemas de deducción natural en lógica proposicional (L0)», y de la relación de ejercicios de prácticas (sesiones 1 a 5), Facultad de Informática, Universidad de Murcia. Referencias: Enric Sesa i Nogueras, *Lògica d'enunciats* (UOC, 2003); Michael Huth y Mark Ryan, *Logic in Computer Science* (CUP, 2004). Si algún criterio de tu profesor difiere de lo escrito aquí, manda el suyo.