Indices aedicos antes y despues de la nebulizacion espacial en Chimbote, Peru

Equipo LetXinet de pruebas. Documento sintetico para pruebas automaticas. DOI: 10.5555/letxinet.prueba.2026

Abstract

This synthetic article evaluates house, container and Breteau indices before and after two rounds of ultra-low volume space spraying in Chimbote. The indices fell after each round and rose again within three weeks.

1. Introduccion

El dengue es endemico en la costa norte del Peru. La nebulizacion espacial reduce los mosquitos adultos, pero su efecto sobre los indices larvarios es temporal.

2. Metodos

Se inspeccionaron 400 viviendas por vuelta. El indice de Breteau se calculo como IB = (recipientes positivos / viviendas inspeccionadas) x 100. El indice aedico de vivienda se calculo como IA = (viviendas positivas / viviendas inspeccionadas) x 100.

3. Resultados

La Tabla 1 resume los indices por vuelta.

Vuelta	Viviendas	Indice aedico (%)	Indice de Breteau
Antes	400	4.5	6.0
Primera vuelta	400	1.8	2.3
Segunda vuelta	400	1.2	1.5
Tres semanas despues	400	3.9	5.1

4. Discusion

La caida de los indices tras cada vuelta coincide con estudios previos; el rebote indica que la nebulizacion debe combinarse con eliminacion de criaderos.

Referencias

Bowman LR, Donegan S, McCall PJ. Is dengue vector control deficient in effectiveness or evidence? PLoS Negl Trop Dis. 2016;10(3):e0004551. doi:10.1371/journal.pntd.0004551
Esu E, Lenhart A, Smith L, Horstick O. Effectiveness of peridomestic space spraying with insecticide on dengue transmission. Trop Med Int Health. 2010;15(5):619-31. doi:10.1111/j.1365-3156.2010.02489.x
World Health Organization. Dengue: guidelines for diagnosis, treatment, prevention and control. Geneva: WHO; 2009.