

Estimación Bayesiana de la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en Costa Rica

José Carlos Quintero Paola Espinoza Julián Soto María Paula Jiménez

28 de noviembre de 2025

1 Resumen

Este estudio analiza la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en Costa Rica a partir del Primer Censo Escolar de Peso/Talla 2016 (niños de 6 a 12 años). Se modelan los conteos de casos por cantón mediante un modelo binomial con enlace logit e inferencia bayesiana, incorporando covariables socioeconómicas y demográficas estandarizadas. La estimación se realiza con el algoritmo No-U-Turn Sampler (NUTS), que permite obtener distribuciones posteriores bien mezcladas para las probabilidades de prevalencia en cada unidad territorial. A nivel nacional, la media posterior de obesidad es cercana al 14 % y la de sobrepeso al 20 %, lo que implica un exceso de peso combinado de alrededor del 34 %. Se observa un gradiente centro-periferia: provincias y cantones del Valle Central presentan las prevalencias más elevadas, mientras que zonas costeras y periféricas muestran valores significativamente menores. Los resultados confirman que el exceso de peso infantil constituye un problema estructural de salud pública y muestran que el enfoque bayesiano logit-binomial es útil para cuantificar la prevalencia y su incertidumbre a distintos niveles geográficos.

Palabras clave: Costa Rica, sobrepeso, obesidad, muestreo NUTS.

2 Introducción

El sobrepeso y la obesidad infantil se han consolidado en las últimas décadas como una de las principales problemáticas de salud pública a nivel mundial: entre 1975 y 2016 el número de niños y adolescentes con obesidad se multiplicó por más de diez, y más de 200 millones presentaban sobrepeso (World Health Organization, 2018). Estas condiciones se asocian con complicaciones metabólicas y psicosociales en la niñez y con un mayor riesgo de enfermedad crónica, discapacidad y mortalidad prematura en la adultez (Gamboa-Gamboa et al., 2021).

En Costa Rica, el primer Censo Escolar de Peso/Talla, desarrollado en el año 2016, reveló que más de un tercio de los escolares censados presenta exceso de peso (Gómez et al., 2023). Estudios nacionales han mostrado que la prevalencia de sobrepeso y obesidad es mayor en varones, en escuelas privadas y en distritos urbanos con mayor desarrollo socioeconómico (Gamboa-Gamboa et al., 2021), así como también que las curvas nacionales de índice de masa corporal (IMC) y circunferencia de cintura difieren de los patrones internacionales (Núñez-Rivas et al., 2022). Lo anterior subraya la necesidad de contar con referencias y análisis propios. A nivel regional, investigaciones como Hernández-Vásquez et al. (2016) para Perú, y Gómez et al. (2023) para Costa Rica indican que el sobrepeso y la obesidad infantil tienden a concentrarse en territorios urbanos y costeros, evidenciando un componente territorial y socioeconómico en su distribución.

En este marco teórico, el problema se concibe como un fenómeno de prevalencia territorialmente heterogénea, influido por factores demográficos, económicos y de urbanización. Por esta razón, resulta necesario no solo estimar la magnitud de la prevalencia de sobrepeso y la obesidad, sino también cuantificar rigurosamente la incertidumbre asociada a esas estimaciones y describir su patrón espacial en el país.

Este panorama motiva la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo se distribuye territorialmente la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en Costa Rica, y con qué grado de incertidumbre puede

estimarse a partir de la evidencia disponible? Para responderla, este estudio propone estimar la prevalencia de ambas condiciones en las distintas divisiones territoriales del país mediante un enfoque bayesiano. En particular, se modelan los conteos de casos utilizando un modelo binomial con enlace logit, al que se incorporan covariables sociodemográficas y se ajusta por medio de algoritmos de muestreo tipo HMC/NUTS (Hoffman & Gelman, 2014) para aproximar la distribución posterior. A partir de estas distribuciones posteriores, se comparan provincias y cantones mediante medias e intervalos de credibilidad, y se elaboran mapas y gráficos que permiten interpretar la heterogeneidad territorial y la distribución de la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en Costa Rica.

3 Metodología

3.1 Descripción de los datos

La base de datos empleada en este estudio corresponde al conjunto de datos construido en el marco del trabajo de Gómez et al. (2023). En dicho estudio, los autores integran indicadores socioeconómicos y demográficos desagregados a nivel distrital procedentes del Censo Nacional de Población y Vivienda 2011, así como medidas de prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil recolectadas en el Censo Escolar Peso/Talla 2016. Estos datos fueron obtenidos directamente a través del panel interactivo desarrollado por los autores.

La fuente primaria de información es el Censo Escolar Peso/Talla 2016, un operativo que recolectó datos de 347 379 niños entre 6 y 12 años matriculados en el sistema escolar público y privado de Costa Rica. Del total de población censada, 178 417 fueron hombres y 168 962 mujeres, lo que corresponde a un 51.3% y un 48.7% respectivamente. Asimismo, el censo alcanzó una cobertura cercana al 90.9% de la población objetivo, por lo que sus resultados se consideran estadísticamente representativos a nivel nacional (Censo Escolar Peso-Talla 2016 (2016)).

Las variables sociodemográficas y geográficas consideradas se describen a continuación:

- **distrito:** Nombre del distrito al que corresponde el registro.
- **provincia:** Nombre de la provincia correspondiente.
- **canton:** Nombre del cantón correspondiente.
- **desempleo:** Porcentaje de personas desempleadas dentro del distrito
- **población_urbana:** Porcentaje de la población que reside en áreas urbanas del distrito
- **privación_crítica:** Porcentaje de población en situación de privación crítica.
- **población_menor_14:** Porcentaje de personas menores de 14 años en la población total del distrito
- **hogares_monomarentales:** Porcentaje de hogares encabezados por un solo padre o madre.
- **ocupantes_por_hogar:** Promedio de personas que habitan en cada hogar del distrito
- **años_escolaridad:** Promedio de años de escolaridad alcanzados por la población, indicador del nivel educativo.

Para seleccionar las variables más relevantes para su incorporación en el modelo, se aplicó un criterio de información AIC a partir de una regresión lineal preliminar sobre la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Este procedimiento permitió identificar las covariables con mayor capacidad explicativa antes del ajuste bayesiano. En el caso del sobrepeso, las variables que mostraron mayor importancia fueron el desempleo, la población urbana, la privación crítica y la población menor de 14 años. Por su parte, para la obesidad las variables seleccionadas fueron el desempleo, la privación crítica, la población menor de 14 años y los años de escolaridad. Estas covariables constituyen la base del diseño del modelo logit-binomial empleado posteriormente.

Por otra parte, las variables de medición son las siguientes:

- **condición:** Clasificación de los registros según el estado nutricional de la persona estudiante: sobrepeso, obesidad, o combinada (exceso de peso).
- **total:** Total de personas censadas en cada distrito.
- **subtotal:** Número de casos registrados por distrito dentro de cada categoría específica de condición.
- **prevalencia:** Razón entre el número de casos (subtotal) y el total de personas censadas (total) para cada categoría.

3.2 Análisis exploratorio de la base de datos

En términos generales, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad infantil muestra una media del 34%, con valores que oscilan entre 13% y 56%, lo que refleja una variabilidad importante entre distritos. Al desagregar los datos por condición, la prevalencia de sobrepeso presenta un promedio de 20%, con una desviación estándar del 3% y un rango entre 6% y 33%, mientras que la prevalencia de obesidad registra un promedio de 14%, con desviación estándar del 4% y valores entre 0 y 33%. Estos resultados evidencian que, aunque ambas condiciones están presentes en magnitudes considerables, el sobrepeso es más frecuente que la obesidad, lo cual no es sorprendente al considerar que la obesidad se puede interpretar como un caso extremo de sobrepeso.

Los años de escolaridad promedio por distrito se sitúan en 8.1 años, con una desviación estándar moderada aproximadamente de 1.5 años. La tasa de desempleo es baja en promedio (3%), pero para algunos distritos se alcanzan valores cercanos a 9%. El porcentaje de hogares monomarentales ronda el 20% y la privación crítica promedio de los hogares se ubica en 29%, mostrando casos extremos de hasta 90%. La población urbana evidencia una clara polarización, puesto una cantidad considerable de distritos son predominantemente rurales (0%) o completamente urbanos (100%).

Finalmente, al comparar por provincia, la prevalencia combinada oscila entre 30% en Limón y 37% en Heredia, siendo esta última la más alta. En la Figura 1 se confirma una mayor heterogeneidad en provincias como San José y Alajuela, mientras que Cartago y Guanacaste presentan distribuciones más concentradas.




Figura 1: Distribución posterior de la prevalencia de sobrepeso infantil

3.3 Modelo preliminar Beta-Binomial para la prevalencia

Dada la naturaleza de los datos y con el propósito de obtener una primera estimación de la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil se plantea de forma preliminar un modelo que no incorpora covariables ni estructura territorial. Específicamente, se modela el número total de casos observados en cada categoría

(sobrepeso y obesidad, respectivamente) mediante una distribución $Y \sim \text{Binom}(N, p)$, donde Y es el número total de casos, N el tamaño de la muestra y p representa la probabilidad (prevalencia verdadera) de pertenecer a la categoría de sobrepeso (o bien, obesidad) independientemente de la pertenencia provincial o cantonal.

Desde un enfoque bayesiano, se asigna una distribución previa de tipo Beta débilmente informativa $\pi \sim \text{Beta}(1, 1)$, equivalente a una previa uniforme sobre el intervalo $(0, 1)$. La distribución posterior del parámetro p se aproxima mediante el algoritmo Metropolis-Hastings, respectivamente para cada categoría. De esta forma, se obtiene una estimación bayesiana preliminar de la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil en Costa Rica, que sirve como referencia para contextualizar los resultados del modelo con estructura territorial descrito en la siguiente subsección.

3.3.0.1 Autocorrelación e Histogramas Para el método de Metropolis-Hasting, en ambos casos, se obtuvo una alta autocorrelación entre los elementos de la cadena. Una vez finalizado el proceso, se realizaron histogramas para visualizar la distribución posterior obtenida a partir de esta metodología. Además, se presenta la media y el intervalo de confianza para cada categoría.




Figura 2: Distribución posterior de la prevalencia de sobrepeso infantil




Figura 3: Distribución posterior de la prevalencia de obesidad infantil

3.4 Modelo principal: regresión binomial con enlace logit

Tras la estimación preliminar, se plantea un modelo más flexible que permite estudiar la variación de la prevalencia entre distritos y su relación con covariables sociodemográficas. En este caso, el modelo de regresión

binomial con función de enlace logit describe el conteo de casos observados y_i en el distrito i sobre n_i el total de niños censados en dicho distrito, mediante una verosimilitud binomial y un enlace logit para la prevalencia verdadera p_i según

$$y_i \sim \text{Binomial}(n_i, p_i), \quad \text{logit}(p_i) = \eta_i = \alpha + X_i^\top \beta.$$

donde $X_i = (x_{i,1}, \dots, x_{i,R})$ es el vector de covariables estandarizadas del distrito i , y β es el vector de coeficientes del modelo. Asimismo, la función logit es $\text{logit}(p) = \log(\frac{p}{1-p})$ y su inversa corresponde a

$$p_i = \frac{\exp(\eta_i)}{1 + \exp(\eta_i)}.$$

Condicionalmente en p_i , la media y varianza de y_i son

$$\mathbb{E}[y_i | p_i] = n_i p_i, \quad \text{Var}(y_i | p_i) = n_i p_i (1 - p_i).$$

El intercepto α es el log-odds cuando $X_i = 0$. Al considerar covariables estandarizadas, $X_i = 0$ representa un “individuo medio” y $\text{logit}^{-1}(\alpha)$ es su probabilidad base. Cada coeficiente β_k representa el cambio en log-odds por un incremento correspondiente a una desviación estándar en la covariable k . En términos de odds ratio, $\text{OR}_k = \exp(\beta_k)$, de modo que un aumento de una desviación estándar en X_{ik} multiplica las odds por $\exp(\beta_k)$.

En la escala logit los parámetros son no acotados. Usar $\alpha, \beta_j \sim \mathcal{N}(0, 5)$ coloca un 95 por ciento previo aproximadamente en $[-9.8, 9.8]$ para cada coeficiente, lo que en odds ratio equivale a $[\exp(-9.8), \exp(9.8)]$, abarcando varios órdenes de magnitud. Con X estandarizada, esto constituye una prior débil porque apenas restringe la probabilidad base y los efectos covariables, dejando que la verosimilitud determine la magnitud de p_i y de β . Sin estandarización, la misma $\mathcal{N}(0, 5)$ podría no ser débil si las unidades de X fueran muy grandes.

A partir de muestras posteriores $\{p_i^{(s)}\}$, las réplicas predictivas se generan como $\tilde{y}_i^{(s)} \sim \text{Binomial}(n_i, p_i^{(s)})$. Con ellas se evalúan calibración y ajuste mediante coberturas de intervalos creíbles, MAE o RMSE entre proporciones observadas y_i/n_i y estimadas p_i . La linealidad en la escala logit y la varianza binomial son supuestos centrales; si hubiera sobre-dispersión sistemática no explicada por X , puede ampliarse el modelo con términos jerárquicos o estructuras espaciales que introduzcan correlación, o bien, dependencia parcial entre unidades geográficas.

3.4.1 Explicación del Modelo

El estudio emplea un modelo logit-binomial para estimar la prevalencia p_i a partir de conteos y_i sobre exposiciones n_i , con $\text{logit}(p_i) = \alpha + X_i^\top \beta$ y covariables previamente estandarizadas. Las priors $\alpha, \beta_j \sim \mathcal{N}(0, 5)$ se especifican en la escala log-odds y, al ser muy dispersas, actúan como priors débiles. Antes del ajuste bayesiano se implementó una optimización del conjunto de covariables mediante una búsqueda exhaustiva de subconjuntos en un modelo lineal clásico, seleccionando el que minimiza el criterio de información de Akaike (AIC); este paso reduce la dimensionalidad del diseño X_i , evita modelos innecesariamente complejos y concentra el modelo logit-binomial en aquellas covariables con mayor respaldo empírico según el AIC. La inferencia se realiza con No-U-Turn Sampler (NUTS), un algoritmo HMC que adapta automáticamente el tamaño de paso y la longitud efectiva de la trayectoria, expandiéndola hasta detectar una “no-u-turn”; este procedimiento mejora la exploración del posterior al reducir la autocorrelación y evita fijar manualmente el número de pasos de integración, de acuerdo a Hoffman & Gelman (2014). El resultado son muestras posteriores mezcladas para p_i y para (α, β) , a partir de las cuales se obtienen medias e intervalos de credibilidad por provincia y agregados ponderados por n_i para país.

3.4.2 Significado de los parámetros

α : es el intercepto en escala logit. Como las covariables se estandarizan, α representa el log-odds de la condición cuando todas las covariables estandarizadas valen 0, es decir, en un “distrito promedio” (cada

covariable en su media original). En la escala de probabilidad, la prevalencia basal asociada es

$$p_0 = \text{logit}^{-1}(\alpha) = \frac{1}{1 + e^{-\alpha}}.$$

β_k : es el efecto de la covariable k sobre el logit de la prevalencia. Como X_k está estandarizada, β_k mide el cambio en el log-odds al aumentar la covariable k en +1 desviación estándar, manteniendo las demás covariables fijas. En términos de odds, $\exp(\beta_k)$ es el factor multiplicativo sobre las odds de la condición cuando X_k aumenta en +1 DE; por ejemplo, $\exp(\beta_k) = 1.2$ implica un aumento del 20 % en las odds.

p_i : es la probabilidad (prevalencia) de la condición en la fila i , es decir, la probabilidad de que una persona seleccionada al azar en el distrito i presente la condición, dada la información sociodemográfica capturada el vector de covariables. Es la cantidad central del modelo: determina la distribución binomial $y_i | p_i \sim \text{Binomial}(n_i, p_i)$ y a partir de sus muestras posteriores se obtienen medias, intervalos de credibilidad e indicadores agregados (por provincia o país).

3.4.3 Supuestos y consecuencias

Binomialidad: $y_i | p_i \sim \text{Binomial}(n_i, p_i)$ con $\text{Var}(y_i | p_i) = n_i p_i (1 - p_i)$. Linealidad en logit: la relación entre covariables y p_i es lineal en la escala logit. Priors débiles: $\mathcal{N}(0, 5)$ deja que los datos dominen, salvo en celdas con poca exposición.

3.4.4 Validación empírica reportada

Convergencia: $\hat{R} = 1.00$ en obesidad y sobrepeso; tamaños efectivos mínimos en núcleo/colas superiores a 4700, lo que sugiere exploración homogénea del posterior. Precisión predictiva: obesidad con MAE = 0.023 y RMSE = 0.032; sobrepeso con MAE = 0.021 y RMSE = 0.030. Diferencias promedio entre proporciones observadas y estimadas en el rango 2-3 puntos porcentuales. Cobertura (IC95 %): 77.8 % para obesidad y 89.1 % para sobrepeso. Indica buena reproducción de la variabilidad; ligera subcobertura en obesidad (estimaciones algo más concentradas), calibración más cercana al nominal en sobrepeso.

3.5 Fundamento Teórico

3.5.1 Hamiltonian Monte Carlo

Hamiltonian Monte Carlo (HMC) es un método de Monte Carlo por cadenas de Markov que introduce variables auxiliares de momento para transformar el muestreo de la distribución posterior $p(\theta | y)$ en la integración de un sistema hamiltoniano. Se define la energía potencial $U(\theta) = -\log p(\theta | y)$ y la energía cinética $K(r) = \frac{1}{2} r^\top M^{-1} r$ para un vector de momentos r y una matriz de masa M . La dinámica hamiltoniana preserva volumen y energía, y se aproxima con el integrador leapfrog, que usa un tamaño de paso ϵ y un número de pasos L para proponer estados θ^*, r^* alejados del estado actual, evitando la caminata aleatoria. La propuesta se corrige con un paso de aceptación Metropolis con probabilidad $\min\{1, \exp[-\Delta H]\}$, donde ΔH es el cambio en la energía debido a la discretización. Esta construcción aprovecha gradientes del log-posterior, permitiendo trayectorias largas con baja autocorrelación y alto tamaño efectivo de muestra por evaluación del gradiente. En la práctica, el rendimiento depende de sintonizar ϵ , L y M ; tamaños de paso demasiado grandes inducen divergencias, mientras que tamaños de paso muy pequeños incrementan el costo computacional. La literatura recomienda adaptar ϵ hacia una tasa de aceptación objetivo y adaptar M (diagonal o densa) para adecuar la escala y curvatura del posterior, mejorando la estabilidad y la mezcla de la cadena (Hoffman & Gelman, 2014).

3.5.2 NUTS

El No-U-Turn Sampler (NUTS) es una extensión adaptativa de HMC que elimina la necesidad de fijar manualmente la longitud de trayectoria. En lugar de elegir un L fijo, NUTS expande dinámicamente la trayectoria (mediante un árbol binario) hasta detectar una no-u-turn: el punto en que la dirección del movimiento comienza a invertirse y proseguir añadiría recorrido redundante. Esta regla de detención

garantiza trayectorias lo suficientemente largas para explorar eficientemente la masa de probabilidad, pero no tan largas como para desperdiciar cómputo, reduciendo la autocorrelación sin requerir sintonía manual de L (Hoffman & Gelman, 2014, p. 3, p. 10). En paralelo, NUTS emplea dual averaging para adaptar el tamaño de paso ϵ hacia una tasa de aceptación objetivo (usualmente entre 0.8 y 0.95), lo que disminuye la incidencia de divergencias en posteriors con alta curvatura. En modelos con enlace logit y covariables estandarizadas —como el logit-binomial descrito— los gradientes están bien definidos y escalados, de modo que NUTS puede construir trayectorias estables que recorren el posterior con bajo error de integración y buena mezcla entre cadenas. La combinación de la expansión sin u-turn y la adaptación de ϵ produce un muestreo eficiente y reproducible, con diagnósticos de convergencia favorables ($\hat{R}$ cercano a 1 y tamaños efectivos altos), en línea con las recomendaciones metodológicas de Hoffman & Gelman (2014).

3.5.3 Resumen ejecutivo

Es un modelo logit–binomial bayesiano con priors débiles; la inferencia usa NUTS (HMC) con adaptación automática para explorar eficientemente la posterior. El script estandariza covariables, selecciona un subconjunto mediante AIC, estima el modelo, resume p_i por fila y agrega provincias/país ponderando por la exposición, además de graficar distribuciones posteriores comparables entre provincias. El resultado es un flujo reproducible para cuantificar prevalencias y su incertidumbre a distintos niveles territoriales, con métricas de desempeño que respaldan la calidad del ajuste. Como complemento a este informe, se desarrolló un dashboard interactivo, el cual se ejecuta de manera local dentro del entorno del proyecto de acuerdo a las instrucciones disponibles en el README del repositorio

4 Resultados

Los resultados obtenidos a partir del modelo binomial con enlace logit y muestreo NUTS evidencian un patrón claro en la distribución de la prevalencia de obesidad y sobrepeso infantil en Costa Rica, tanto a nivel nacional como provincial. En el plano nacional, la media posterior estimada para obesidad fue de 0.14143, con un intervalo de credibilidad del 95% entre 0.14023 y 0.14254. En el caso del sobrepeso, la media posterior fue de 0.19848, con un intervalo de credibilidad del 95% entre 0.19715 y 0.19983.




Figura 4: Distribución posterior de la prevalencia de sobrepeso infantil a nivel país




Figura 5: Distribución posterior de la prevalencia de obesidad infantil a nivel país

Estos resultados, cuando se suman, permiten inferir que aproximadamente un 34% de la población infantil escolar del país presenta exceso de peso, cifra que confirma la magnitud del problema de salud pública y se encuentra alineada con las tendencias observadas en contextos internacionales. La Organización Mundial de la Salud World Health Organization (2025) señala que “childhood obesity has become one of the most serious public health challenges of the 21st century”, al estimar que más de 390 millones de niños y adolescentes de entre 5 y 19 años en el mundo tienen sobrepeso u obesidad. Esta cifra global se sitúa en torno al 20% de esa población, lo que significa que Costa Rica presenta una proporción ligeramente superior al promedio global, aunque en consonancia con otros países de ingreso medio y urbano consolidado.

Cuadro 1: Resumen por provincia: obesidad y sobrepeso

Grupo	Media_Obesidad	Intervalo Obesidad	Media_Sobrepeso	Intervalo Sobrepeso
Alajuela	0.14096	[0.13957, 0.14236]	0.19873	[0.19714, 0.20029]
Cartago	0.14648	[0.1451, 0.14789]	0.20347	[0.20194, 0.20497]
Guanacaste	0.13749	[0.13594, 0.13907]	0.19000	[0.18815, 0.19185]
Heredia	0.14832	[0.14671, 0.14995]	0.20699	[0.2053, 0.20869]
Limon	0.12645	[0.12465, 0.12827]	0.18394	[0.18187, 0.18604]
Puntarenas	0.12810	[0.12668, 0.12952]	0.19135	[0.18964, 0.19305]
San Jose	0.14892	[0.14753, 0.1503]	0.20379	[0.20218, 0.20535]
País	0.14143	[0.14025, 0.14258]	0.19847	[0.19708, 0.19978]

El modelo generó distribuciones posteriores estables para cada provincia. En el caso de la obesidad, los resultados revelan un gradiente centro-periferia: San José, Heredia y Cartago muestran las mayores prevalencias medias (0.14870, 0.14804 y 0.14584 respectivamente), mientras que Guanacaste, Puntarenas y Limón presentan los valores más bajos (0.13516, 0.13037 y 0.12788). Este patrón se repite para el sobrepeso, con Heredia, Cartago y San José nuevamente en los primeros lugares (0.20765, 0.20648 y 0.20435 respectivamente) y Guanacaste y Puntarenas en los últimos (0.19067 y 0.18830). A nivel cantonal, se observa un contraste similar: cantones periféricos como Talamanca (obesidad 0.10117; sobrepeso 0.17762), Buenos Aires, Los Chiles, La Cruz y Matina se sitúan en la cola inferior de la distribución, mientras que cantones del Gran Área Metropolitana como Heredia (0.15713; 0.21262), Santo Domingo, Moravia, Belén y Montes De Oca (0.16897; 0.22065) concentran las prevalencias medias más altas de obesidad y sobrepeso. Gómez et al. (2023) señalan que “el modelo bayesiano espacial confirmó la existencia de un patrón heterogéneo, con distritos de mayor riesgo en las zonas más urbanas del país”, lo que refuerza la interpretación de que el exceso de peso infantil se concentra en territorios de mayor densidad urbana y desarrollo económico. Esta diferenciación espacial también puede explicarse parcialmente por variaciones en la disponibilidad de alimentos frescos, la estructura de transporte y la exposición a publicidad alimentaria. Como sostiene la

World Health Organization (2025), “urbanization and the shift towards more sedentary forms of recreation and work contribute significantly to rising obesity rates”.

Cuadro 2: Resumen por cantones más relevantes: obesidad y sobrepeso

Grupo	Media_Obesidad	Intervalo Obesidad	Media_Sobrepeso	Intervalo Sobrepeso
Talamanca	0.10117	[0.09779, 0.1046]	0.17762	[0.17413, 0.18114]
Buenos Aires	0.11142	[0.10907, 0.11383]	0.18071	[0.17787, 0.18356]
Los Chiles	0.11245	[0.11006, 0.1149]	0.17539	[0.17254, 0.17824]
La Cruz	0.11639	[0.11439, 0.11842]	0.18108	[0.17874, 0.18344]
Matina	0.11767	[0.11545, 0.11994]	0.17928	[0.17661, 0.1819]
Heredia	0.15713	[0.15495, 0.15935]	0.21262	[0.21051, 0.21465]
Santo Domingo	0.15720	[0.15501, 0.15938]	0.21487	[0.21239, 0.2173]
Moravia	0.15842	[0.15617, 0.16073]	0.21311	[0.21097, 0.2152]
Belen	0.15857	[0.15622, 0.16087]	0.21879	[0.21605, 0.22153]
Montes De Oca	0.16897	[0.16519, 0.17287]	0.22065	[0.2171, 0.22418]

Estos hallazgos coinciden con los resultados del análisis espacial bayesiano de Gómez et al. (2023), quienes observaron que “las prevalencias más altas de sobrepeso y obesidad infantil se concentran en el Valle Central, en distritos cabecera de provincia y en zonas urbanizadas de mayor desarrollo económico”. Esta coherencia espacial reafirma que las condiciones urbanas y socioeconómicas más favorables, lejos de representar un factor protector, se asocian con mayores tasas de exceso de peso en las etapas iniciales de la transición nutricional. Hernández-Vásquez et al. (2016) observaron un fenómeno análogo en Perú, al documentar que “la obesidad infantil predomina en las zonas urbanas y la región costera del país, mientras que las regiones andinas y amazónicas registran prevalencias significativamente menores”. La similitud entre ambos países, pese a sus diferencias contextuales, refuerza la noción de que el exceso de peso infantil tiende a concentrarse en territorios con mayor desarrollo económico y urbano, en parte debido al acceso a alimentos ultraprocesados, al incremento del sedentarismo y a la reconfiguración de los entornos alimentarios.

A nivel global, los resultados nacionales obtenidos aquí se sitúan dentro del rango descrito por la evidencia más reciente. GBD 2025 Collaborators (2025) reportaron que “the global prevalence of overweight and obesity among children and adolescents doubled between 1990 and 2021, with obesity alone tripling during that period”. Esa misma fuente proyecta que “by 2050, approximately 15% of younger children (5–14) and 14% of older adolescents (15–24) worldwide will have obesity”. En comparación, la prevalencia nacional de obesidad infantil en Costa Rica (14%) coincide exactamente con la estimación global proyectada, lo cual indica que el país se encuentra en plena convergencia con las tendencias internacionales.

La World Obesity Federation (2023), por su parte, advierte que “childhood obesity could double from 2020 levels by 2035, reaching nearly 400 million children globally”, lo que enmarca las cifras nacionales dentro de una tendencia mundial en expansión. Del mismo modo, Zhang et al. (2024) subrayan que “approximately one in five children and adolescents worldwide are now overweight or obese, a prevalence driven by combined behavioral, environmental, and socioeconomic factors”. Los resultados del presente estudio, que sitúan el sobrepeso en torno al 20%, reproducen con notable exactitud esa proporción, evidenciando la vigencia de los determinantes globales en el contexto costarricense.

A nivel institucional, las interpretaciones coinciden. La World Health Organization (2025) enfatiza que “the fundamental cause of obesity and overweight is an energy imbalance between calories consumed and calories expended”, una definición que engloba la interacción entre dieta, actividad física y entorno urbano. Por su parte, United Nations Children’s Fund (2023) describe la actual situación como “a global trap of unhealthy, ultra-processed foods combined with declining physical activity among children”, alertando sobre el papel del entorno alimentario industrializado. La convergencia de estas explicaciones con la distribución espacial de los resultados —prevalencias mayores en provincias urbanas y menores en costeras— sugiere que los procesos de urbanización y modernización alimentaria costarricenses han replicado las condiciones de ese “trampa” descrita anteriormente, especialmente en el área metropolitana central.

Desde un punto de vista demográfico, los resultados revelan que la prevalencia combinada (sobrepeso + obesidad) ronda el 34%, lo que coloca a Costa Rica por encima del promedio latinoamericano y muy cerca de la media observada en países de la OCDE. El informe del Centers for Disease Control and Prevention (2022) informa que “in the United States, the prevalence of obesity among children and adolescents aged 2–19 years was 19.7% in 2017–2020”, una cifra similar a la obtenida en nuestro estudio para obesidad infantil (14%). A pesar de las diferencias estructurales entre países, esta coincidencia cuantitativa sugiere que Costa Rica enfrenta un desafío sanitario comparable al de naciones desarrolladas, pero con recursos y capacidades institucionales más limitadas. En este sentido, los hallazgos se suman a la preocupación expresada por la OMS cuando advierte que “without intervention, the prevalence of obesity will continue to rise, leading to severe health and economic consequences” World Health Organization (2025).

Si bien los resultados principales se refieren a la prevalencia provincial, el análisis posterior del modelo permite identificar consistencia interna entre sobrepeso y obesidad: las provincias con mayor sobrepeso tienden también a mostrar mayor obesidad, lo que evidencia la continuidad epidemiológica entre ambas condiciones. Esta continuidad es coherente con lo descrito por GBD 2025 Collaborators (2025), donde se advierte que “overweight in childhood frequently tracks into adult obesity, amplifying the long-term disease burden”. En este sentido, las estimaciones provinciales aquí presentadas no solo reflejan un estado actual, sino también el potencial acumulativo de riesgo futuro para la salud de la población infantil costarricense.

Finalmente, el conjunto de resultados obtenidos permite delinear un panorama coherente sobre la distribución territorial y la magnitud del exceso de peso infantil en Costa Rica, mostrando cómo los patrones nacionales, provinciales y cantonales convergen con las tendencias regionales y globales descritas por la literatura. Esta coherencia interna y externa refuerza la solidez del modelo utilizado y prepara el terreno para, en el siguiente apartado, discutir las implicaciones prácticas y las orientaciones que pueden derivarse de estos hallazgos para la formulación de políticas públicas y acciones de salud preventiva.

5 Conclusiones y recomendaciones

Los resultados de este estudio muestran que el exceso de peso infantil en Costa Rica es un problema de gran magnitud y con un patrón territorial claramente diferenciado. La prevalencia combinada cercana al 34 % ubica al país por encima del promedio latinoamericano y en niveles comparables a los de países de ingresos altos, lo que confirma que la transición nutricional costarricense presenta características avanzadas. Además, el gradiente centro–periferia identificado —con valores más altos en el Valle Central y menores en las zonas costeras y fronterizas— indica que el fenómeno no es uniforme, sino profundamente influido por factores urbanos, socioeconómicos y ambientales. Esta coherencia con estudios previos nacionales e internacionales refuerza la interpretación de que el exceso de peso infantil se concentra en territorios más urbanizados, donde la disponibilidad de alimentos ultraprocesados, los cambios en los patrones de movilidad y el sedentarismo desempeñan un papel cada vez más relevante.

Metodológicamente, el modelo logit–binomial ajustado mediante NUTS mostró buena convergencia y estabilidad en sus estimaciones, lo que respalda la confiabilidad de los resultados a nivel nacional, provincial y cantonal. No obstante, este enfoque presenta limitaciones importantes que deben ser reconocidas. En primer lugar, los datos utilizados corresponden únicamente al año 2016, por lo que el estudio no permite evaluar tendencias temporales ni posibles cambios recientes. En segundo lugar, el modelo no incorpora una estructura espacial jerárquica que capture dependencias territoriales residuales, por lo que parte de la variabilidad geográfica podría no estar completamente representada. También es necesario señalar que las covariables disponibles no reflejan dimensiones clave como la calidad del entorno alimentario, la infraestructura urbana o los niveles reales de actividad física en cada distrito, factores que podrían complementar y profundizar la explicación del fenómeno. Finalmente, dado que el análisis es ecológico, las inferencias se realizan a nivel territorial y no individual, por lo que no es posible establecer relaciones causales directas entre las características sociodemográficas y el estado nutricional de cada niño.

Aun con estas limitaciones, los hallazgos ofrecen una base sólida para orientar intervenciones públicas. Se recomienda priorizar acciones en cantones del Gran Área Metropolitana, donde las prevalencias son sistemáticamente más altas, mediante la mejora del entorno alimentario escolar, la regulación de productos

ultraprocesados, la promoción de actividad física y la creación de espacios seguros para la movilidad activa. Al mismo tiempo, es importante mantener la vigilancia epidemiológica en zonas costeras y periféricas para evitar que las brechas territoriales se amplíen en el futuro. Asimismo, se sugiere fortalecer los sistemas de monitoreo nutricional y actualizar periódicamente análisis bayesianos como el desarrollado en este estudio, de modo que el país pueda disponer de estimaciones actualizadas para evaluar la efectividad de las políticas implementadas.

En conjunto, esta investigación evidencia que Costa Rica enfrenta un desafío nutricional relevante y complejo, pero también que cuenta con información robusta para diseñar estrategias basadas en evidencia que contribuyan a frenar el avance del sobrepeso y la obesidad infantil en los próximos años.

6 Agradecimientos

Se agradece profundamente a nuestro profesor, PhD. Maikol Solís, por su orientación y apoyo durante todo el proceso de investigación. Su guía y consejos fueron fundamentales para que la realización de nuestro proyecto fuera posible. Estamos muy agradecidos por su dedicación, paciencia y tiempo brindado.

7 Referencias Bibliográficas

- Censo Escolar Peso-Talla 2016. (2016). *Censo escolar peso-talla, Costa Rica 2016. Informe ejecutivo y resultados*. <https://www.binasss.sa.cr/opac-ms/media/digitales/Censo%20escolar%20peso-talla,%20Costa%20Rica%202016.%20Informe%20ejecutivo%20y%20resultados.pdf>.
- Centers for Disease Control and Prevention. (2022). *Childhood Obesity Facts*.
- Gamboa-Gamboa, T., Fantin, R., Cordoba, J., Caravaca, I., & Gómez-Duarte, I. (2021). Relationship between childhood obesity and socio-economic status among primary school children in Costa Rica. *Public Health Nutrition*, 24(12), 3825-3833. <https://doi.org/10.1017/S1368980021002032>
- GBD 2025 Collaborators. (2025). Global Prevalence of Child and Adolescent Overweight and Obesity, 1990–2021, with Forecasts to 2050. *The Lancet*, 405(10345), 1-12. [https://doi.org/10.1016/s0140-6736\(25\)00397-6](https://doi.org/10.1016/s0140-6736(25)00397-6)
- Gelfand, A. E., Diggle, P. J., Guttorp, P., & Fuentes, M. (Eds.). (2010). *Handbook of Spatial Statistics*. Chapman & Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781420072884>
- Gómez, M. J., Barboza, L. A., Vásquez, P., & Moraga, P. (2023). Bayesian spatial modeling of childhood overweight and obesity prevalence in Costa Rica. *BMC Public Health*, 23(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-023-15486-1>
- Hernández-Vásquez, A., Bendezú-Quispe, G., Díaz-Seijas, D., Santero, M., Minckas, N., Azañedo, D., & Antiporta, D. A. (2016). Análisis espacial del sobrepeso y la obesidad infantil en el Perú, 2014 [Spatial analysis of childhood obesity and overweight in Peru, 2014]. *Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública*, 33(3), 489-497. <https://doi.org/10.17843/rpmesp.2016.333.2298>
- Hoffman, M. D., & Gelman, A. (2014). The No-U-Turn Sampler: Adaptively Setting Path Lengths in Hamiltonian Monte Carlo. *Journal of Machine Learning Research*, 15, 1593-1623. <https://www.jmlr.org/papers/v15/hoffman14a.html>
- Moraga, P. (2019). *Geospatial Health Data: Modeling and Visualization with R-INLA and Shiny*. Chapman & Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9780429341823>
- Moraga, P. (2020). Species Distribution Modeling Using Spatial Point Processes: A Case Study of Sloth Occurrence in Costa Rica. *The R Journal*, 12(2), 293-310. <https://doi.org/10.32614/RJ-2021-017>
- Moraga, P. (2023). *Spatial Statistics for Data Science: Theory and Practice with R*. Chapman & Hall/CRC. <https://doi.org/10.1201/9781032641522>
- Núñez-Rivas, H. P., Holst-Schumacher, I., Campos-Saborío, N., & López-López, E. (2022). Percentiles of body mass index and waist circumference for Costa Rican children and adolescents. Percentiles de índice de masa corporal y circunferencia de la cintura en niños y adolescentes de Costa Rica. *Nutrición Hospitalaria*, 39(6), 1228-1236. <https://doi.org/10.20960/nh.04130>
- United Nations Children’s Fund. (2023). *Prevention of Overweight and Obesity in Children and Adolescents: Programme Guidance*.

World Health Organization. (2018). *Taking action on childhood obesity*. <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274792/WHO-NMH-PND-ECHO-18.1-eng.pdf>.

World Health Organization. (2025). *Obesity and Overweight: Fact Sheet*.

World Obesity Federation. (2023). *World Obesity Atlas 2023*.

Zhang, X., Wang, L., & Liu, H. (2024). Global Prevalence of Overweight and Obesity in Children and Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. *JAMA Pediatrics*, 178(5), 1-12. <https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2024.1576>

8 Anexos

Cuadro 3: Resumen por cantones: obesidad y sobrepeso

Grupo	Media_Obesidad	Intervalo Obesidad	Media_Sobrepeso	Intervalo Sobrepeso
Abangares	0.14002	[0.13746, 0.14272]	0.18187	[0.17856, 0.18532]
Acosta	0.13513	[0.13279, 0.13754]	0.19586	[0.19253, 0.19913]
Alajuela	0.14993	[0.14848, 0.15137]	0.20433	[0.20273, 0.20584]
Alajuelita	0.13902	[0.13771, 0.14035]	0.19931	[0.19699, 0.20164]
Alvarado	0.13779	[0.13467, 0.14101]	0.20719	[0.20421, 0.21019]
Aserri	0.14252	[0.14112, 0.14385]	0.20003	[0.19862, 0.20137]
Atenas	0.14991	[0.14764, 0.15214]	0.20907	[0.20645, 0.21173]
Bagaces	0.13085	[0.12948, 0.13223]	0.18810	[0.18635, 0.1898]
Barva	0.15036	[0.14798, 0.15273]	0.21326	[0.21083, 0.21567]
Belen	0.15857	[0.15622, 0.16087]	0.21879	[0.21605, 0.22153]
Buenos Aires	0.11142	[0.10907, 0.11383]	0.18071	[0.17787, 0.18356]
Carrillo	0.13955	[0.13694, 0.14225]	0.18453	[0.18168, 0.1875]
Cartago	0.15106	[0.14961, 0.15249]	0.20672	[0.20507, 0.20833]
Cañas	0.13563	[0.13421, 0.13701]	0.19832	[0.1964, 0.20027]
Corredores	0.12164	[0.11931, 0.124]	0.19494	[0.19229, 0.19757]
Coto Brus	0.12038	[0.11804, 0.12263]	0.18857	[0.18553, 0.19155]
Curridabat	0.15153	[0.14918, 0.15391]	0.21138	[0.20905, 0.21365]
Desamparados	0.15327	[0.15164, 0.15492]	0.20427	[0.20251, 0.20597]
Dota	0.12525	[0.12275, 0.12781]	0.19638	[0.19321, 0.19959]
El Guarco	0.14634	[0.14481, 0.14791]	0.20285	[0.20109, 0.20462]
Escazu	0.15387	[0.15175, 0.15606]	0.21176	[0.2095, 0.21395]
Esparza	0.14310	[0.14179, 0.14439]	0.19959	[0.19809, 0.20104]
Flores	0.15471	[0.15192, 0.15749]	0.21564	[0.21317, 0.21808]
Garabito	0.13064	[0.12908, 0.13216]	0.19243	[0.19046, 0.1944]
Goicoechea	0.15535	[0.15362, 0.1571]	0.20649	[0.20448, 0.20846]
Golfito	0.12345	[0.12161, 0.12535]	0.18653	[0.1844, 0.18862]
Grecia	0.14654	[0.14479, 0.14829]	0.20229	[0.20041, 0.20415]
Guacimo	0.13137	[0.12948, 0.13329]	0.18534	[0.18323, 0.18743]
Guatuso	0.12292	[0.12083, 0.12507]	0.18721	[0.18445, 0.19]
Heredia	0.15713	[0.15495, 0.15935]	0.21262	[0.21051, 0.21465]
Hojancha	0.13769	[0.1352, 0.14017]	0.19812	[0.19493, 0.20127]
Jimenez	0.14469	[0.14197, 0.14748]	0.19989	[0.19801, 0.20172]
La Cruz	0.11639	[0.11439, 0.11842]	0.18108	[0.17874, 0.18344]
La Union	0.14868	[0.14711, 0.15027]	0.20540	[0.20342, 0.20731]
Leon Cortes	0.12654	[0.12397, 0.12914]	0.19546	[0.19223, 0.1987]
Liberia	0.13954	[0.13694, 0.14214]	0.19038	[0.18791, 0.19287]
Limon	0.12692	[0.12409, 0.12975]	0.18205	[0.1794, 0.18472]
Los Chiles	0.11245	[0.11006, 0.1149]	0.17539	[0.17254, 0.17824]
Matina	0.11767	[0.11545, 0.11994]	0.17928	[0.17661, 0.1819]

Grupo	Media_Obesidad	Intervalo Obesidad	Media_Sobrepeso	Intervalo Sobrepeso
Montes De Oca	0.16897	[0.16519, 0.17287]	0.22065	[0.2171, 0.22418]
Montes De Oro	0.14516	[0.1435, 0.14681]	0.20547	[0.20372, 0.20724]
Mora	0.14789	[0.14644, 0.14931]	0.19757	[0.19487, 0.20033]
Moravia	0.15842	[0.15617, 0.16073]	0.21311	[0.21097, 0.2152]
Nandayure	0.14110	[0.13788, 0.14447]	0.18227	[0.1784, 0.18627]
Naranjo	0.14555	[0.14357, 0.14757]	0.20246	[0.20057, 0.2043]
Nicoya	0.13887	[0.13707, 0.14067]	0.19343	[0.19117, 0.19568]
Oreamuno	0.14284	[0.14124, 0.14447]	0.20584	[0.20377, 0.20791]
Orotina	0.13847	[0.137, 0.13995]	0.19699	[0.19512, 0.19882]
Osa	0.12323	[0.12095, 0.12553]	0.18917	[0.18646, 0.19189]
Palmares	0.15174	[0.15002, 0.15343]	0.20603	[0.20435, 0.20768]
Paraiso	0.14649	[0.14454, 0.14847]	0.19921	[0.19774, 0.20062]
Parrita	0.13311	[0.13122, 0.13504]	0.19314	[0.19134, 0.19488]
Perez Zeledon	0.13395	[0.13273, 0.1352]	0.19147	[0.18984, 0.19306]
Poas	0.14608	[0.1443, 0.14789]	0.19600	[0.19415, 0.19785]
Pococi	0.13402	[0.13227, 0.13583]	0.18629	[0.18428, 0.18833]
Puntarenas	0.13486	[0.13359, 0.13611]	0.19402	[0.19245, 0.19557]
Puriscal	0.14789	[0.14581, 0.14995]	0.19622	[0.19269, 0.19985]
Quepos	0.13772	[0.13621, 0.13929]	0.19031	[0.18847, 0.19214]
San Carlos	0.13096	[0.12904, 0.13284]	0.19314	[0.19085, 0.19541]
San Isidro	0.15440	[0.15213, 0.15665]	0.21693	[0.21425, 0.2196]
San Jose	0.15220	[0.15028, 0.15419]	0.20525	[0.20291, 0.20758]
San Mateo	0.13887	[0.13659, 0.14112]	0.19864	[0.19569, 0.20157]
San Pablo	0.15510	[0.15212, 0.15811]	0.21520	[0.21286, 0.21749]
San Rafael	0.15386	[0.15188, 0.15581]	0.20979	[0.20769, 0.21185]
San Ramon	0.14398	[0.14259, 0.14536]	0.19957	[0.19764, 0.20147]
Santa Ana	0.14753	[0.14473, 0.15037]	0.21331	[0.21085, 0.21575]
Santa Barbara	0.15008	[0.14831, 0.15181]	0.20963	[0.20758, 0.21166]
Santa Cruz	0.14334	[0.14128, 0.1454]	0.19022	[0.18762, 0.1929]
Santo Domingo	0.15720	[0.15501, 0.15938]	0.21487	[0.21239, 0.2173]
Sarapiqui	0.12051	[0.11874, 0.12233]	0.18089	[0.17847, 0.18333]
Sarchi	0.14647	[0.14444, 0.14851]	0.19619	[0.19349, 0.19893]
Siquirres	0.12822	[0.12676, 0.12968]	0.18880	[0.18707, 0.19053]
Talamanca	0.10117	[0.09779, 0.1046]	0.17762	[0.17413, 0.18114]
Tarrazu	0.13067	[0.12911, 0.13226]	0.19458	[0.19276, 0.19642]
Tibas	0.15626	[0.15416, 0.15837]	0.20752	[0.20509, 0.20993]
Tilaran	0.14055	[0.1389, 0.14223]	0.19843	[0.19663, 0.20016]
Turrialba	0.13858	[0.13685, 0.14033]	0.19674	[0.19501, 0.19847]
Turrubares	0.14667	[0.1428, 0.1507]	0.17948	[0.1749, 0.18437]
Upala	0.11776	[0.11572, 0.11985]	0.18586	[0.18321, 0.1885]
Vazquez De Coronado	0.15645	[0.1547, 0.15819]	0.21151	[0.20951, 0.21343]
Zarcero	0.14198	[0.13857, 0.1454]	0.21224	[0.20828, 0.21631]
Pais	0.14143	[0.14025, 0.14258]	0.19847	[0.19708, 0.19978]