



UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

EMat

Escuela de
Matemática

Universidad de Costa Rica
Escuela de Matemática
Departamento de Ciencias Actuariales

Bitácora 3: proyecto grupal

Profesor:
Maikol Solís Chacón

Estudiantes:
Alexandra González Bermúdez, C4F535
Emily Estefanía Mora Contreras, C4H522
José Miguel Rodríguez Gómez, C4J104
Daniela Prado Vargas, C26070

Primer semestre
2026

Índice

1. Parte de planificación	2
1.1. Análisis de la modelación	2
1.1.1. Carga de datos de forma automática	2
1.1.2. Análisis descriptivo completo de la base de datos	2
1.1.3. Ajuste completo del modelo	12
1.1.4. Análisis de diagnósticos del modelo seleccionado	12
1.2. Propuesta metodológica	12
1.2.1. Formulación de los métodos	13
1.2.2. Programa maqueta	23
1.2.3. Etapa de validación	23
1.2.4. Respaldo de la propuesta metodológica	23
1.2.5. Análisis fallido	49
1.3. Construcción de las fichas de resultados	49
1.4. Ordenamiento de los elementos del reporte	52
1.5. La imagen que cuenta la historia	53
2. Arco narrativo del proyecto	53
3. Parte de escritura	53
4. Parte de reflexión	53
4.1. Reflexión sobre alcance del proyecto	53
4.2. Construcción y actualización de la UVE de Gowin	53
5. Fichas literarias construidas en la tercera bitácora	54
6. Implementación de la retroalimentación	59
7. Relativo al trabajo en equipo	59
7.1. Rastro de decisiones	59
7.2. Diario de aprendizaje	59
7.3. Audiencia del proyecto	59
7.4. Registro del uso de IA	59
7.5. Registro del trabajo en equipo	60
Referencias	61

1. Parte de planificación

La fase en la que se encuentra el proyecto actualmente, está enfocada en efectuar los análisis de modelación necesarios con tal de aproximarse a la construcción de los resultados finales, lo anterior mediante el ajuste y el desarrollo de la metodología propuesta en el anteproyecto. En vista de esto, las secciones posteriores se encargan de materializar las ideas abordadas tanto en las bitácoras pasadas como en la presentación brindada por el equipo.

1.1. Análisis de la modelación

Para esta sección se retomó el prototipo de modelación elaborado en la Bitácora #2. En esa etapa se había construido una primera versión de la base de datos modificada, en la cual se cargaban los datos originales, se transformaban las variables de fecha, se creaba una variable categórica para el tipo de vehículo y se calculaba la edad del asegurado.

Sin embargo, para la Bitácora #3 fue necesario ampliar y mejorar ese procesamiento inicial, con el fin de que el código fuera más completo, robusto y reproducible. Por esta razón, se mantuvo la carga automática de la base original, pero se agregaron nuevas variables derivadas que son relevantes para el análisis actuarial, como la antigüedad de la licencia y la edad del vehículo.

1.1.1. Carga de datos de forma automática

Antes de iniciar el análisis descriptivo, se realiza la carga automática de la base de datos. Este paso permite que el código lea directamente el archivo desde la carpeta correspondiente, sin necesidad de seleccionar los datos manualmente.

1.1.2. Análisis descriptivo completo de la base de datos

El análisis descriptivo se organiza a partir de la pregunta de investigación del proyecto. Por esta razón, se seleccionan variables relacionadas con tres dimensiones principales: las características del asegurado, las características del vehículo y el historial de siniestros. Las variables `N_claims_year` y `Cost_claims_year` son centrales, ya que permiten estudiar la frecuencia y la severidad anual de los siniestros, respectivamente.

1.1.2.1. Resumen general de la base de datos

Tabla 1: Resumen general de la base de datos

Característica	Valor
Total de registros	105,555
Total de variables	34
Asegurados únicos	53,502
Promedio de registros por asegurado	1.97
Fecha más antigua de inicio de contrato	1980-10-25
Fecha más reciente de renovación	2018-11-30
Tipos de vehículo	Motocicleta, Turismo, Furgoneta, Agrícola

La tabla muestra que la base contiene 105,555 registros y 34 variables, correspondientes a 53,502 asegurados únicos. Esto indica que algunos asegurados aparecen más de una vez en la base, lo cual se confirma con el promedio de 1.97 registros por asegurado. Además, la información cubre contratos desde 1980 hasta renovaciones registradas en 2018, por lo que se dispone de un periodo amplio para el análisis. Finalmente, se observa que la base incluye cuatro tipos de vehículos: motocicleta, turismo, furgoneta y agrícola, lo cual permite comparar posteriormente el comportamiento de los siniestros según la categoría de riesgo asegurada.

1.1.2.2. Tratamiento de valores faltantes

También se revisa la presencia de valores faltantes, ya que estos pueden afectar el análisis descriptivo y la posterior construcción de modelos. Esta revisión permite identificar cuáles variables requieren tratamiento especial antes de ser utilizadas en una etapa de modelación.

Tabla 2: Resumen de valores faltantes por variable

Variable	Total de valores faltantes	Porcentaje de valores faltantes
Date_lapse	70,408	66.7 %
Length	10,329	9.79 %
Type_fuel	1,764	1.67 %

La tabla muestra que la base presenta valores faltantes únicamente en tres variables. La variable con mayor cantidad de datos faltantes es Date_lapse, con 70,408 registros faltantes, lo que representa un 66.7 % de la base. Esto puede deberse a que no todos los contratos han tenido una fecha de cancelación o finalización registrada.

También se observan valores faltantes en Length, con 10,329 registros equivalentes al 9.79 %, y en Type_fuel, con 1,764 registros, equivalentes al 1.67 %. En comparación con Date_lapse, estas dos variables tienen una proporción menor de datos faltantes.

A partir de la revisión anterior, se definió un tratamiento básico para las variables con valores faltantes. La variable Date_lapse se excluye del análisis descriptivo principal, debido a que presenta una proporción elevada de datos ausentes y no resulta indispensable para responder la pregunta de investigación. En el caso de Length, se utiliza una imputación mediante la mediana según el tipo de vehículo, ya que se trata de una variable numérica asociada con las características físicas del automóvil. Finalmente, para Type_fuel, se eliminan los registros faltantes, pues representan una proporción baja de la base.

1.1.2.3. Resumen de frecuencia y severidad

Para estudiar la frecuencia y la severidad de los siniestros, se seleccionan variables cuantitativas relacionadas con las características del asegurado, el vehículo y el historial de reclamos. En particular, se consideran variables como la edad, la antigüedad con la aseguradora, el número de siniestros, el costo anual de los siniestros, el valor del vehículo y otras características físicas del automóvil.

Como primer acercamiento a la pregunta de investigación, se resumen las variables asociadas directamente con la frecuencia y la severidad de los siniestros. La frecuencia se representa mediante N_claims_year, mientras que la severidad se aproxima con Cost_claims_year.

Tabla 3: Resumen descriptivo de frecuencia y severidad de siniestros

Indicador	Valor
Promedio de siniestros anuales	0.40
Mediana de siniestros anuales	0.00
Máximo de siniestros anuales	25.00
% sin siniestros anuales	81.21
Costo promedio anual	155.60
Costo mediano anual	0.00
Costo máximo anual	260853.24
% con costo anual igual a 0	81.21

La tabla muestra que la mayoría de los registros no presenta siniestros durante el año. Esto se observa en la mediana de siniestros anuales, que es 0, y en el porcentaje de registros sin siniestros, que corresponde al 81.21 %. Es decir, una parte importante de la cartera no generó reclamos en el periodo analizado.

En cuanto a la frecuencia, el promedio de siniestros anuales es de 0.40, lo cual indica que, en general, la cantidad de reclamos por registro es baja. Sin embargo, el máximo observado es de 25 siniestros anuales, lo que evidencia la presencia de algunos casos extremos con una frecuencia mucho mayor que el comportamiento típico.

Respecto a la severidad, el costo promedio anual es de 155.60, mientras que la mediana es 0. Esta diferencia indica que la distribución de los costos está concentrada en cero, pero existen algunos reclamos con montos elevados que aumentan el promedio. Esto se confirma con el costo máximo anual de 260,853.24.

1.1.2.4. Estadística descriptiva completa de variables cuantitativas

Además de las variables principales de frecuencia y severidad, se analizan variables cuantitativas relacionadas con el asegurado, el vehículo y el historial de reclamos. Esto permite observar la variabilidad de los datos e identificar posibles factores asociados con el riesgo asegurado.

Tabla 4: Estadística descriptiva de variables cuantitativas relevantes

Variable	n_validos	n_nulos	minimo	Q1	media	mediana	Q3	maximo	desv_estandar
Cost_claims_year	103791	0	0.000	0.000	155.597	0.000	0.000	260853.240	1489.186
Length	103791	0	1.978	3.953	4.198	4.206	4.436	8.218	0.446
N_claims_history	103791	0	0.000	0.000	2.749	1.000	4.000	52.000	3.871
N_claims_year	103791	0	0.000	0.000	0.398	0.000	0.000	25.000	1.108
Power	103791	0	4.000	75.000	94.258	90.000	110.000	580.000	35.281
R_Claims_history	103791	0	0.000	0.000	0.430	0.090	0.600	26.070	0.718
Seniority	103791	0	1.000	3.000	6.621	4.000	9.000	40.000	6.209
Value_vehicle	103791	0	270.460	13350.000	18620.236	17777.940	22632.060	220675.800	8987.417
Weight	103791	0	50.000	1055.000	1205.664	1211.000	1390.000	7300.000	433.251
antiguedad_licencia	103791	0	-13.000	11.000	21.208	20.000	30.000	71.000	12.335

Tabla 4: Estadística descriptiva de variables cuantitativas relevantes (*continued*)

Variable	n_validos	n_nulos	minimo	Q1	media	mediana	Q3	maximo	desv_estandar
edad	103791	0	18.000	34.000	43.778	43.000	53.000	91.000	12.759
edad_vehiculo	103791	0	0.000	4.000	8.976	9.000	13.000	65.000	6.660

La tabla muestra que no hay datos nulos en las variables analizadas.

Lo más importante es que las variables de reclamos, como Cost_claims_year y N_claims_year, están muy concentradas en cero, porque sus cuartiles y medianas son 0. Esto indica que la mayoría de asegurados no presentó reclamos, aunque existen algunos casos extremos con costos o cantidades muy altas.

También se observan posibles valores atípicos en variables como Cost_claims_year, Power, Weight y Value_vehicle, por sus máximos elevados.

1.1.2.5. Concentración de ceros y umbral de 900 euros

Dado que la pregunta de investigación considera el comportamiento de los reclamos cuando su costo supera los 900 euros, se analiza la concentración de observaciones en cero y alrededor de ese umbral. Este paso permite identificar si existe una acumulación particular de registros que deba considerarse en la etapa de modelación.

Tabla 5: Concentración de ceros y comportamiento respecto al umbral de 900 euros

Indicador	Valor
Registros sin siniestros anuales	84292.00
% sin siniestros anuales	81.21
Registros con costo igual a 0	84292.00
% con costo igual a 0	81.21
Registros con costo igual a 900	0.00
% con costo igual a 900	0.00
Registros con costo mayor a 900	3779.00
% con costo mayor a 900	3.64

Esta tabla confirma que hay una alta concentración de ceros en los reclamos. El 81.21 % de los registros no tuvo siniestros anuales, lo cual coincide con los registros cuyo costo fue igual a 0. Esto significa que la mayoría de asegurados no generó costos por reclamos durante el año.

Además, no hay registros con costo exactamente igual a 900 euros, pero sí hay 3779 casos con costos mayores a 900, equivalentes al 3.64 % de la base.

1.1.2.6. Detección de valores atípicos

Como parte del análisis descriptivo, se revisa la presencia de valores atípicos en las variables cuantitativas más relevantes. Esta revisión es importante porque los datos de seguros suelen presentar valores extremos, especialmente en variables relacionadas con costos y número de reclamos.

Tabla 6: Detección de valores atípicos mediante el método IQR

Variable	Q1	Q3	IQR	limite_inferior	limite_superior	total_outliers	porcentaje_outliers
Cost_claims_year	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	19499	18.79
Length	3.953	4.436	0.483	3.228	5.16	2288	2.20
N_claims_history	0.000	4.000	4.000	-6.000	10.00	4893	4.71
N_claims_year	0.000	0.000	0.000	0.000	0.00	19499	18.79
Power	75.000	110.000	35.000	22.500	162.50	7927	7.64
R_Claims_history	0.000	0.600	0.600	-0.900	1.50	7598	7.32
Seniority	3.000	9.000	6.000	-6.000	18.00	7268	7.00
Value_vehicle	13350.000	22632.060	9282.060	-573.090	36555.15	3361	3.24
Weight	1055.000	1390.000	335.000	552.500	1892.50	10065	9.70
antigüedad_licencia	11.000	30.000	19.000	-17.500	58.50	2	0.00
edad	34.000	53.000	19.000	5.500	81.50	7	0.01
edad_vehiculo	4.000	13.000	9.000	-9.500	26.50	1372	1.32

Lo más relevante es que Cost_claims_year y N_claims_year tienen el mayor porcentaje de atípicos, con 18.79 % cada una. Esto ocurre porque la mayoría de registros está en cero, entonces cualquier valor positivo de reclamo se identifica como atípico.

También destacan Weight, Power, R_Claims_history y Seniority, con porcentajes entre 7 % y 9.7 %, lo que sugiere presencia de valores extremos en características del vehículo y del historial del asegurado.

En cambio, variables como edad, antigüedad_licencia y edad_vehiculo tienen pocos valores atípicos, por lo que parecen más estables.

1.1.2.7. Frecuencia y severidad según tipo de vehículo

Para responder a la pregunta de investigación, también se analiza si el comportamiento de los siniestros varía según el tipo de vehículo asegurado. Esta comparación permite identificar posibles diferencias entre categorías de riesgo.

Tabla 7: Frecuencia y severidad de siniestros según tipo de vehículo

categoria	Cantidad de registros	% del total	Promedio de siniestros	% sin siniestros	Costo promedio	Costo mediano
Agricola	732	0.71	0.001	99.86	0.26	0
Furgoneta	13212	12.73	0.568	77.19	166.35	0
Motocicleta	6857	6.61	0.132	92.75	36.44	0
Turismo	82990	79.96	0.397	80.74	165.10	0

La mayoría de registros corresponde a vehículos de turismo, con casi el 80 % del total. Luego siguen las furgonetas con 12.73 % y las motocicletas con 6.61 %.

En cuanto a siniestros, las furgonetas presentan el mayor promedio de siniestros, con 0.568, y también el costo promedio más alto, con 166.35. Los vehículos de turismo tienen un costo promedio parecido, de 165.10, pero un promedio de siniestros menor.

Las categorías agrícola y motocicleta muestran porcentajes muy altos sin siniestros, especialmente agrícola con 99.86 %, por lo que su costo promedio es muy bajo.

1.1.2.8. Frecuencia y severidad según zona

También se analiza el comportamiento de los siniestros según la zona registrada en la base de datos. Esta variable permite explorar si existen diferencias entre zonas urbanas y rurales en la frecuencia y severidad de los reclamos.

Tabla 8: Frecuencia y severidad de siniestros según zona

zona	Cantidad de registros	% del total	Promedio de siniestros	% sin siniestros	Costo promedio	Costo mediano
Rural	75451	72.7	0.376	81.91	148.10	0
Urbana	28340	27.3	0.458	79.36	175.56	0

En primer lugar, se observa que la mayor parte de la base corresponde a la zona rural, con un 72.7 % de los registros. La zona urbana representa una proporción menor, con 27.3 %. Esto indica que la cartera analizada tiene una mayor presencia de asegurados rurales.

Sin embargo, aunque la zona rural tiene más registros, la zona urbana presenta un mayor promedio de siniestros, con 0.458 frente a 0.376 en la zona rural. Esto sugiere que, en promedio, los asegurados urbanos reportan siniestros con mayor frecuencia.

También se observa que el costo promedio es más alto en la zona urbana: 175.56 frente a 148.10 en la zona rural. Esto podría indicar que los siniestros urbanos no solo ocurren con mayor frecuencia, sino que además tienden a generar costos ligeramente más altos.

Por otro lado, en ambas zonas el costo mediano es 0, lo cual confirma que la mayoría de registros no presenta costos por siniestros. Aun así, el porcentaje sin siniestros es un poco menor en la zona urbana, con 79.36 %, comparado con 81.91 % en la zona rural.

1.1.2.9. Gráficos relevantes para el análisis descriptivo

A través de la presentación de distintos gráficos, se abordará información relevante para abordar la pregunta de investigación.

Como se observa en la Figura 1, se presenta la distribución del costo de los siniestros por año, considerando únicamente los registros con costo entre 1 y 5000 euros.

El gráfico muestra que la distribución del costo de los siniestros es fuertemente asimétrica hacia la derecha, con la mayoría de los reclamos concentrados en valores bajos, por debajo de los 500 euros. Sin embargo, destaca un pico pronunciado alrededor de los 900 euros, donde la frecuencia aumenta de forma




Figura 1: Distribución del costo de siniestros por año

abrupta respecto a los valores cercanos, sugiriendo una concentración inusual de observaciones en ese monto específico. Este comportamiento constituye precisamente el fenómeno que la pregunta de investigación busca explicar, ya que no responde a una distribución continua y uniforme.

Por otra parte, en la Figura 2 se representa la relación entre la edad y la cantidad histórica de reclamos. En este gráfico, la escala de color indica el conteo de observaciones: los tonos más oscuros, como el azul, representan una mayor concentración de asegurados, mientras que los tonos más claros, como el rosado, indican una menor concentración.

La mayor concentración de observaciones se encuentra en asegurados con pocos reclamos históricos, especialmente entre 0 y 5 reclamos, aunque se observa de igual manera gran concentración de cantidad de reclamos entre 5 y 20. Esto indica que, para la mayoría de los asegurados, el historial de reclamos es bajo, independientemente de la edad.


También, se aprecia que los reclamos históricos tienden a acumularse ligeramente conforme aumenta la edad. Esto puede deberse a que las personas de mayor edad han tenido más tiempo de permanencia como aseguradas y, por lo tanto, más oportunidades de registrar reclamos a lo largo del tiempo. Sin embargo, la relación no parece ser fuerte, ya que los puntos se encuentran bastante dispersos y existen asegurados de distintas edades con valores similares de reclamos.

Además, se observan algunos casos aislados con una cantidad alta de reclamos históricos, pero estos presentan baja concentración de observaciones. Por tanto, el gráfico sugiere que la edad puede estar asociada de manera leve con el historial de reclamos, aunque no explica por sí sola la variabilidad observada.

Por otro lado, la Figura 3 muestra la comparación entre la frecuencia y el costo por año según el tipo de vehículo, ya sea turismo (vehículo particular), motocicleta, furgoneta o agrícola.


En el gráfico de la izquierda se observa que los costos de siniestros presentan una distribución bastante dispersa, con una alta concentración de valores bajos y algunos casos extremos de costos elevados.

Relación entre edad e histórico de reclamos



Fuente: Lledó & Pavía (2024), Mendeley Data. DOI: 10.17632/5cxyb5fp4f.2

Figura 2: Relación entre la edad del asegurado y reclamos totales



Fuente: Lledó & Pavía (2024), Mendeley Data. DOI: 10.17632/5cxyb5fp4f.2

Figura 3: Gráfico comparativo entre el número y el costo de siniestros por año según el tipo de vehículo

Esto indica que, aunque la mayoría de los reclamos tiende a mantenerse en montos relativamente bajos o moderados, existen siniestros puntuales que generan costos mucho mayores. Esta situación es visible principalmente en los vehículos de turismo y las furgonetas, donde la distribución se extiende hacia valores más altos.

En el caso de las motocicletas, los costos parecen concentrarse en rangos más bajos en comparación con los otros tipos de vehículos, aunque también se observan algunos valores elevados. Por su parte, los vehículos agrícolas no presentan una distribución visible, lo que podría deberse a una cantidad muy reducida de registros o a la ausencia de siniestros relevantes en esta categoría dentro de la base analizada.

En el gráfico de la derecha se muestra la cantidad de siniestros por año. La mayoría de los vehículos registra pocos siniestros anuales, principalmente entre uno y dos reclamos. Sin embargo, las furgonetas y los vehículos de turismo presentan una mayor dispersión, con algunos casos donde la cantidad de siniestros es considerablemente más alta. Esto sugiere que tales categorías de vehículo podrían estar asociadas con una mayor exposición al riesgo o con un uso más frecuente.

A manera de síntesis, la figura sugiere que el tipo de vehículo sí puede influir tanto en la frecuencia como en la severidad de los siniestros. Las furgonetas y los vehículos de turismo muestran una mayor variabilidad, mientras que las motocicletas parecen concentrarse en niveles más bajos.

La Figura 4 muestra la comparación entre la distribución de distintas características físicas del vehículo: el peso, el largo, la potencia, el cilindraje y el número de puertas, en los casos en donde se supera el umbral de los 900 euros.

En general, se observa que estos reclamos se concentran principalmente en vehículos con pesos aproximados entre 1000 kg y 1500 kg, longitudes cercanas a 4,0–4,7 m, potencias entre 70 y 130 caballos de fuerza y un cilindraje alrededor de 1400 a 2000. Lo anterior sugiere que los siniestros con costos superiores a 900 euros no se distribuyen de forma uniforme entre todos los tipos de vehículos, sino que se presentan con mayor frecuencia en vehículos de características intermedias, probablemente asociados al turismo, de uso común.

En cuanto al número de puertas, la mayor concentración corresponde a vehículos de 5 puertas, seguido en menor medida por vehículos de 3 y 4 puertas. Esto puede indicar que los reclamos superiores a 900 euros se relacionan principalmente con vehículos familiares o de uso cotidiano, aunque también puede deberse a que este tipo de vehículo es más frecuente dentro de la base de datos.


También se observan algunos valores aislados en pesos, potencias y cilindradas muy bajas o muy altas, los cuales podrían corresponder a registros atípicos, motocicletas, vehículos especiales o posibles inconsistencias en los datos. Por ello, estos casos deberán revisarse antes de sacar conclusiones definitivas.

Finalmente, la Figura 5 muestra la distribución de la cantidad de siniestros por zona, ya sea rural o urbana, dividiendo los casos de acuerdo al costo de los 900 euros.

En ambos casos predominan ampliamente los siniestros con costos menores a 900 euros, lo que indica que la mayoría de los reclamos registrados son de baja o moderada severidad.


Se observa que la zona rural concentra una mayor cantidad total de registros, tanto para costos menores a 900 euros como para costos mayores o iguales a ese umbral. Sin embargo, esto no necesariamente significa que la zona rural sea más riesgosa, ya que puede deberse a que hay más pólizas o más observaciones rurales en la base de datos.

En conjunto, el análisis descriptivo permite identificar varios elementos relevantes para la etapa de modelación. Primero, la base presenta una estructura con múltiples registros por asegurado, lo cual permite



Fuente: Lledó & Pavía (2024), Mendeley Data. DOI: 10.17632/5cxyb5fp4f.2

Figura 4: Gráfico comparativo de las características físicas del vehículo, en casos que superan los €900



Fuente: Lledó & Pavía (2024), Mendeley Data. DOI: 10.17632/5cxyb5fp4f.2

Figura 5: Distribución del costo de los siniestros por zona

estudiar el comportamiento anual de los siniestros. Segundo, se observa una concentración importante de registros sin siniestros o con costos iguales a cero, aspecto que debe considerarse al modelar la frecuencia y la severidad. Tercero, las variables relacionadas con los costos presentan asimetría y valores extremos, lo cual es característico en datos de seguros. Finalmente, las comparaciones por tipo de vehículo y zona muestran que existen diferencias entre grupos, por lo que estas variables pueden ser consideradas como posibles factores explicativos en la modelación posterior.

1.1.3. Ajuste completo del modelo

1.1.4. Análisis de diagnósticos del modelo seleccionado

1.2. Propuesta metodológica

La propuesta metodológica de esta investigación se organiza como una secuencia de análisis orientados a estudiar la frecuencia y la severidad de los siniestros en el caso de los seguros de automóviles. En el anteproyecto, el análisis se planteó a partir de cuatro ejes principales: la descripción de la frecuencia y severidad, el estudio de asociaciones entre variables cuantitativas, la comparación entre grupos categóricos y el análisis específico del umbral de 900 euros. En esta bitácora, dichos ejes se mantienen, pero se reformulan con mayor precisión para incorporar la retroalimentación recibida.

El punto de partida de la metodología es que las variables de siniestralidad no presentan un comportamiento simple como se observó en el análisis descriptivo de la bitácora 2. La frecuencia de siniestros corresponde a una variable de conteo, mientras que la severidad corresponde a una variable continua no negativa. Además, se identificó una alta concentración de ceros, una distribución asimétrica hacia la derecha

y la presencia de valores extremos en el costo anual de los siniestros. Estas características hacen necesario utilizar una combinación de métodos descriptivos, comparativos y de modelación exploratoria, dependiendo de las variables que se vayan a analizar.

1.2.1. Formulación de los métodos

La propuesta metodológica se organizará en cuatro métodos complementarios que se detallan más adelante. En primer lugar, se realizará un análisis descriptivo de la frecuencia y la severidad de los siniestros. En segundo lugar, se estudiarán asociaciones entre variables cuantitativas mediante coeficientes de correlación. En tercer lugar, se compararán grupos definidos por variables categóricas. Finalmente, se reformulará el análisis del umbral de 900 euros mediante un enfoque de distribución mixta, análisis de cola derecha e intervalos de confianza sugerido luego de la presentación del anteproyecto.

La razón por la cual se eligió esta organización se debe a que permite avanzar desde una descripción general de los datos hacia un análisis más específico de los reclamos de alta severidad. Además, responde a las características observadas en la Bitácora 2 y retomadas en el anteproyecto: alta concentración de ceros, asimetría hacia la derecha y presencia de valores extremos en la variable de costo anual.

1.2.1.1. Análisis descriptivo de frecuencia y severidad

El primer método consistirá en realizar un análisis descriptivo de las dos variables principales del proyecto: la frecuencia anual de siniestros y la severidad anual de los siniestros. Esta separación es necesaria de acuerdo a la literatura consultada, porque ambas variables tienen naturalezas estadísticas distintas. La frecuencia corresponde a una variable de conteo, mientras que la severidad corresponde a una variable continua no negativa. Por esta razón, no se analizarán como si representaran el mismo fenómeno, sino como dos componentes complementarios del riesgo asegurado.

Sea

$$N_i = \text{N_claims_year}_i$$

la cantidad de siniestros reportados por el asegurado i durante el año, y sea

$$Y_i = \text{Cost_claims_year}_i$$

el costo anual de los siniestros asociado a ese mismo registro.

Para la variable de frecuencia, se construirá una distribución de frecuencias absolutas y relativas. Para cada posible cantidad de siniestros k , se calculará:

$$f_k = \#\{i : N_i = k\},$$

donde f_k representa la cantidad de registros con exactamente k siniestros. También se calculará la frecuencia relativa correspondiente:

$$p_k = \frac{f_k}{n},$$

donde n representa el número total de registros de la base de datos. En particular, se calculará la proporción de asegurados sin siniestros durante el año:

$$\hat{p}_0 = \frac{\#\{i : N_i = 0\}}{n}.$$

Este cálculo es relevante porque permite cuantificar el exceso de ceros en la frecuencia de siniestros. Si una proporción muy alta de registros tiene $N_i = 0$, entonces la frecuencia no puede analizarse únicamente mediante medidas como la media, ya que esta podría ocultar la concentración de asegurados sin reclamos.

Además, para la variable N_i se calcularán medidas descriptivas como media, mediana, desviación estándar, mínimo, máximo y cuartiles. Estas medidas se complementarán con gráficos de barras o histogramas, con el fin de observar visualmente si la mayoría de los registros se concentra en cero, si existen registros con múltiples siniestros y qué tan dispersa es la frecuencia anual.

Para la variable de severidad, el análisis también se realizará en dos etapas. Primero, se calculará la proporción de registros con costo anual igual a cero:

$$\hat{q}_0 = \frac{\#\{i : Y_i = 0\}}{n}.$$

Esta proporción permite identificar cuántos registros no presentan costo anual de siniestros. Sin embargo, debido a que una alta cantidad de ceros puede ocultar el comportamiento real de los montos reclamados, se analizarán por separado los costos estrictamente positivos:

$$Y_i \mid Y_i > 0.$$

Esto significa que, además de estudiar la proporción de costos iguales a cero, se examinará la distribución del costo anual únicamente entre los registros donde sí hubo un costo positivo. Sobre este subconjunto se calcularán medidas como media, mediana, desviación estándar, cuartiles, mínimo y máximo. También se construirán histogramas y boxplots para observar la forma de la distribución, la presencia de asimetría hacia la derecha y posibles valores extremos.

Esta separación es importante porque la variable de severidad puede estar afectada por dos fenómenos distintos: por un lado, la ausencia de costos registrados, y por otro, la magnitud de los costos cuando efectivamente existe un reclamo.

En particular, el análisis descriptivo permite identificar si las variables presentan exceso de ceros, alta dispersión, asimetría o valores atípicos. Estos elementos son fundamentales para justificar las decisiones metodológicas posteriores.

En relación con la pregunta de investigación, este análisis permite caracterizar el comportamiento general de la siniestralidad en la base de datos. La frecuencia muestra qué tan común es que los asegurados presenten reclamos durante el año, mientras que la severidad muestra qué tan altos son los costos cuando estos reclamos ocurren. Por lo tanto, el análisis descriptivo constituye el punto de partida para estudiar qué características del asegurado o del vehículo podrían estar asociadas con una mayor frecuencia o severidad de siniestros.

1.2.1.2. Análisis de asociación entre variables cuantitativas

El segundo método consistirá en estudiar la asociación entre variables cuantitativas del asegurado o del vehículo y las variables de siniestralidad. El propósito de esta etapa no será establecer relaciones causales, sino identificar patrones de asociación que permitan explorar si ciertas características numéricas se relacionan con una mayor frecuencia o severidad de los siniestros.

En una primera etapa, se elaborarán gráficos de dispersión entre cada variable cuantitativa X_i y las variables de respuesta N_i y Y_i . Estos gráficos permitirán observar si existen patrones visuales, relaciones crecientes o decrecientes, agrupamientos, valores atípicos o ausencia aparente de asociación. En el caso de la severidad, también se considerará el análisis sobre los costos positivos, $Y_i \mid Y_i > 0$, para evitar que la gran cantidad de ceros oculte el comportamiento de los montos efectivamente reclamados.

Posteriormente, se calcularán coeficientes de correlación entre pares de variables cuantitativas. En primer lugar, se considerará el coeficiente de correlación de Pearson, definido como:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Z_i - \bar{Z})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2}},$$

donde Z_i representa una variable de siniestralidad, como N_i , Y_i o el costo positivo $Y_i \mid Y_i > 0$.

Sin embargo, debido a las características observadas en las variables de siniestralidad, especialmente la alta concentración de ceros, la presencia de valores extremos y la asimetría hacia la derecha en la severidad, Pearson se utilizará únicamente como una referencia inicial. En este contexto, se dará prioridad a coeficientes no paramétricos como Spearman y Kendall, ya que estos no requieren asumir normalidad ni una relación estrictamente lineal entre las variables.

El coeficiente de Spearman se define como la correlación de Pearson aplicada a los rangos de las variables:

$$\rho_s = \frac{\sum_{i=1}^n (R(X_i) - \overline{R(X)})(R(Z_i) - \overline{R(Z)})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (R(X_i) - \overline{R(X)})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (R(Z_i) - \overline{R(Z)})^2}},$$

donde $R(X_i)$ y $R(Z_i)$ representan los rangos de las observaciones de X_i y Z_i , respectivamente. Este coeficiente permite evaluar si existe una relación monótona entre las variables, aunque dicha relación no sea lineal.

Cuando no existen empates en los rangos, Spearman también puede expresarse como:

$$\rho_s = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)},$$

donde

$$d_i = R(X_i) - R(Z_i).$$

Por otra parte, el coeficiente de Kendall se basa en la comparación entre pares de observaciones. Dos observaciones (X_i, Z_i) y (X_j, Z_j) , con $i < j$, son concordantes si ambas variables se mueven en la misma dirección, es decir, si:

$$(X_i - X_j)(Z_i - Z_j) > 0.$$

Son discordantes si se mueven en direcciones opuestas:

$$(X_i - X_j)(Z_i - Z_j) < 0.$$

Si C representa el número de pares concordantes y D el número de pares discordantes, el coeficiente de Kendall se define como:

$$\tau = \frac{C - D}{\binom{n}{2}} = \frac{C - D}{\frac{n(n-1)}{2}}.$$

Este coeficiente es útil porque evalúa la asociación a partir del orden relativo de los datos, por lo que puede ser más adecuado cuando existen distribuciones asimétricas, valores extremos o relaciones no lineales.

En la implementación en R, las correlaciones se calcularán mediante la función `cor.test()`, ya que esta permite obtener tanto el coeficiente de correlación como una prueba de significancia asociada. El método que se va a utilizar se va a determinar mediante un `shapiro.test()`, el cual va a identificar si las variables tienen distribución normal, o no. En caso de que sí, se utilizará el método Pearson, y en caso de que no se utilizará Kendall o Spearman según sea pertinente.

1.2.1.2.1. Intervalos de confianza para los coeficientes de correlación

Además de calcular los coeficientes de correlación planteados, se construirán intervalos de confianza para evaluar la precisión de las asociaciones estimadas. La idea principal es no interpretar únicamente el valor puntual del coeficiente, sino también considerar la incertidumbre asociada a su estimación.

Sea X_i una variable cuantitativa asociada al asegurado o al vehículo, y sea Z_i una variable de siniestralidad. De manera general, la correlación entre ambas variables se define como:

$$\rho = \text{Corr}(X, Z) = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Z)}}.$$

Utilizando esperanzas, esta expresión puede escribirse como:

$$\rho = \frac{E[XZ] - E[X]E[Z]}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Z)}}.$$

A nivel muestral, el coeficiente de correlación se estima mediante:

$$\hat{\rho} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i Z_i - \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Z_i\right)}{\sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Z_i - \bar{Z})^2}}.$$

En esta investigación, $\hat{\rho}$ representará el coeficiente de correlación estimado según el método utilizado. Es decir, podrá corresponder a la correlación de Pearson, Spearman o Kendall, según las características de las variables analizadas.

Para construir intervalos de confianza, se utilizará una transformación estabilizadora de la varianza. El problema es que el coeficiente de correlación no tiene una varianza constante en su escala original, pues esta depende del valor de la correlación poblacional. De manera aproximada, para muestras grandes se tiene que:

$$\sqrt{n} \left(\frac{\hat{\rho} - \rho}{1 - \rho^2} \right) \rightarrow N(0, 1).$$

Por esta razón, se busca una función $g(\rho)$ que permita estabilizar la varianza. Esta función debe cumplir que:

$$g'(\rho) = \frac{1}{1 - \rho^2}.$$

Al integrar, se obtiene:

$$g(\rho) = \int \frac{1}{1 - \rho^2} d\rho = \operatorname{arctanh}(\rho).$$

Por lo tanto:

$$g(\rho) = \operatorname{arctanh}(\rho) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \rho}{1 - \rho} \right).$$

Aplicando esta transformación al coeficiente de correlación estimado, se define:

$$z_{\hat{\rho}} = \operatorname{arctanh}(\hat{\rho}) = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1 + \hat{\rho}}{1 - \hat{\rho}} \right).$$

Bajo esta transformación, el coeficiente transformado puede aproximarse mediante una distribución normal:

$$z_{\hat{\rho}} \sim N \left(\operatorname{arctanh}(\rho), \frac{1}{n - 3} \right).$$

Por tanto, un intervalo de confianza del 95 % para la correlación en la escala transformada está dado por:

$$z_{\hat{\rho}} \pm z_{0.975} \frac{1}{\sqrt{n - 3}}.$$

Si se denotan los límites en la escala transformada como:

$$L_z = z_{\hat{\rho}} - z_{0.975} \frac{1}{\sqrt{n-3}},$$

y

$$U_z = z_{\hat{\rho}} + z_{0.975} \frac{1}{\sqrt{n-3}},$$

entonces se regresa a la escala original mediante la función tangente hiperbólica:

$$\tanh(z) = \frac{e^{2z} - 1}{e^{2z} + 1}.$$

Así, el intervalo de confianza del 95 % para la correlación será:

$$IC_{95\%}(\rho) = [\tanh(L_z), \tanh(U_z)].$$

Es decir:

$$IC_{95\%}(\rho) = \left[\frac{e^{2L_z} - 1}{e^{2L_z} + 1}, \frac{e^{2U_z} - 1}{e^{2U_z} + 1} \right].$$

En este proyecto, este procedimiento se aplicará a los coeficientes de correlación estimados, ya sea Pearson, Spearman o Kendall, con el objetivo de complementar el análisis puntual con una medida de incertidumbre. De esta manera, no solo se observará si la correlación estimada es positiva, negativa o cercana a cero, sino también qué tan precisa es dicha estimación.

Si el intervalo de confianza contiene el cero, la asociación se interpretará como débil o incierta. En cambio, si el intervalo se mantiene completamente por encima de cero, se interpretará como evidencia descriptiva de asociación positiva. Si el intervalo se mantiene completamente por debajo de cero, se interpretará como evidencia descriptiva de asociación negativa.

1.2.1.3. Comparación entre grupos para variables categóricas

El tercer método consistirá en comparar la frecuencia y la severidad de los siniestros entre grupos definidos por variables categóricas. Este análisis es necesario porque algunas características relevantes del asegurado o del vehículo no son cuantitativas, sino cualitativas. Por ejemplo, variables como el tipo de vehículo, la zona de circulación o el tipo de combustible no se analizan adecuadamente mediante correlaciones, sino mediante comparaciones entre grupos.

En este caso, considere X_i una variable categórica asociada al registro i , cuyos posibles valores son:

$$X_i \in \{g_1, g_2, \dots, g_m\},$$

donde $g_1, g_2, \dots, g_m$ representan las categorías o grupos de la variable.

El objetivo será comparar el comportamiento de las variables de siniestralidad dentro de cada grupo. Para la frecuencia de siniestros, se analizará la variable: N_i .

Para cada grupo g , se calculará la frecuencia promedio de siniestros:

$$\bar{N}_g = \frac{1}{n_g} \sum_{X_i=g} N_i,$$

donde n_g representa la cantidad de registros pertenecientes al grupo g . Esta medida permitirá comparar si algunos grupos presentan, en promedio, más siniestros anuales que otros.

También se calculará la proporción de asegurados sin siniestros dentro de cada grupo:

$$\hat{p}_{0,g} = \frac{\#\{i : X_i = g \text{ y } N_i = 0\}}{n_g}.$$

Esta proporción es importante porque permite identificar si ciertos grupos concentran una mayor cantidad de registros sin reclamos. Debido a que la frecuencia de siniestros presenta una alta concentración de ceros, esta medida puede ser más informativa que analizar solamente la media.

Para la severidad se analizará la variable: Y_i

En cada grupo g , se calculará la proporción de registros con costo positivo:

$$\hat{q}_g = \frac{\#\{i : X_i = g \text{ y } Y_i > 0\}}{n_g}.$$

Esta proporción permitirá observar qué grupos presentan una mayor presencia de costos asociados a siniestros. Además, para los registros con costos positivos, se calcularán medidas de tendencia central y dispersión por grupo, como la media, la mediana, los cuartiles y el máximo:

$$Y_i \mid (Y_i > 0, X_i = g).$$

En particular, se dará importancia a la mediana del costo positivo por grupo:

$$\text{Mediana}(Y_i \mid Y_i > 0, X_i = g),$$

ya que la mediana es menos sensible a valores extremos que la media. Esto es relevante porque la severidad de los siniestros puede presentar asimetría hacia la derecha y valores atípicos.

Para complementar la comparación entre grupos, se construirán tablas resumen que integren indicadores de frecuencia y severidad. Estas tablas permitirán observar, para cada categoría, la cantidad de registros, la frecuencia promedio de siniestros, la proporción de asegurados sin siniestros, la proporción de registros con costo positivo y las medidas principales del costo positivo. De esta manera, será posible comparar no solo cuántos siniestros ocurren en cada grupo, sino también qué tan costosos son cuando ocurren.

Además, se elaborarán gráficos comparativos. Para la frecuencia de siniestros se van a utilizar gráficos de barras que muestren la frecuencia promedio o la proporción de asegurados sin siniestros por grupo. Para la severidad se van a utilizar boxplots o gráficos de violín, ya que estos permiten observar diferencias en la distribución del costo entre categorías, así como la presencia de valores extremos.

Cuando se desee evaluar la asociación entre una variable categórica y una variable binaria de siniestralidad, se definirá una variable indicadora. A partir de esta variable se podrán construir tablas resumen y de comparación. Estas tablas permitirán comparar la proporción de registros con costo positivo dentro de cada categoría.

Este método se escoge porque permite analizar variables que no pueden estudiarse adecuadamente mediante correlación. Mientras que la sección anterior se enfoca en variables cuantitativas, esta sección permite estudiar diferencias entre grupos definidos por características categóricas.

En relación con la pregunta de investigación, la comparación entre grupos permite identificar si ciertas categorías presentan mayor frecuencia de siniestros, mayor proporción de costos positivos o mayor severidad entre los reclamos observados. De esta manera, el análisis aporta evidencia descriptiva sobre posibles diferencias en la siniestralidad según características del asegurado o del vehículo.

1.2.1.4. Análisis del umbral de 900 euros mediante distribución mixta y ajuste de distribuciones

El cuarto método consistirá en analizar de manera específica el comportamiento de los registros cuyo costo anual de siniestros alcanza o supera los 900 euros. En el anteproyecto, este umbral se había planteado mediante una variable indicadora que separaba los costos menores a 900 euros de los costos mayores o iguales a dicho valor. Sin embargo, a partir de la retroalimentación recibida, este análisis se reformula para incorporar tres elementos adicionales: una interpretación mediante distribución mixta, un análisis de la cola derecha de la distribución y el ajuste de distribuciones paramétricas utilizando el paquete `fitdistrplus` de R.

El análisis exploratorio previo mostró que la variable Y_i presenta una alta concentración de ceros, valores positivos moderados y algunos costos considerablemente altos. Por esta razón, no se asumirá que todos los valores de Y_i provienen de una única distribución homogénea. En cambio, se considerará que la variable puede entenderse como una mezcla de distintos comportamientos (distribución mixta).

De manera general, la distribución del costo anual se puede expresar como:

$$Y_i \sim \pi_0 \delta_0 + \pi_1 F_1(y \mid \theta_1) + \pi_2 F_2(y \mid \theta_2),$$

donde δ_0 representa la masa de probabilidad en cero, $F_1(y \mid \theta_1)$ representa la distribución de los costos positivos moderados y $F_2(y \mid \theta_2)$ representa la distribución de los costos altos. Los parámetros π_0 , π_1 y π_2 representan la proporción de observaciones en cada componente, de manera que:

$$\pi_0 + \pi_1 + \pi_2 = 1.$$

Este planteamiento se inspira en el uso de modelos de mezcla en datos de seguros, donde se reconoce que los reclamos pueden presentar exceso de ceros, asimetría y colas pesadas. Marambakuyana & Shongwe (2024) estudian distribuciones compuestas y distribuciones de mezcla aplicadas a datos de reclamos de seguros, señalando que estos modelos son útiles para representar datos de colas pesadas y mejorar el ajuste cuando una sola distribución no describe adecuadamente el comportamiento de las pérdidas. Además, Počuča et al. (2020) proponen modelos con inflación de ceros para frecuencia y severidad de reclamos en seguros generales, precisamente para tratar datos con exceso de ceros provenientes de fuentes heterogéneas.

Para operacionalizar esta idea, se definirá una variable categórica G_i de la siguiente manera:

$$G_i = \begin{cases} 0, & \text{si } Y_i = 0, \\ 1, & \text{si } 0 < Y_i < 900, \\ 2, & \text{si } Y_i \geq 900. \end{cases}$$

El grupo $G_i = 0$ corresponde a registros sin costo anual de siniestros. El grupo $G_i = 1$ corresponde a registros con costos positivos moderados, mientras que el grupo $G_i = 2$ corresponde a registros con costos altos, ubicados en la cola derecha de la distribución.

Los pesos de la mezcla se estimarán mediante las proporciones observadas en la muestra:

$$\hat{\pi}_0 = \frac{\#\{i : Y_i = 0\}}{n},$$

$$\hat{\pi}_1 = \frac{\#\{i : 0 < Y_i < 900\}}{n},$$

y

$$\hat{\pi}_2 = \frac{\#\{i : Y_i \geq 900\}}{n}.$$

Estas proporciones permitirán cuantificar qué parte de la base corresponde a registros sin costo, qué parte corresponde a costos positivos moderados y qué parte se ubica en la zona de alta severidad.

Posteriormente, se utilizará el paquete `fitdistrplus` de R para ajustar distribuciones paramétricas a los componentes positivos del costo anual. Este paquete, de acuerdo a Delignette-Muller & Dutang (2015) permite ajustar distribuciones paramétricas a datos no censurados o censurados y ofrece distintos métodos de estimación, como máxima verosimilitud, estimación por momentos, estimación por cuantiles, bondad de ajuste y máximo espaciamento. En este proyecto, se utilizará principalmente para comparar distribuciones candidatas y estimar los parámetros de aquellas que se adapten mejor a los datos observados.

Primero, se analizarán los costos positivos menores a 900 euros:

$$Y_i \mid 0 < Y_i < 900.$$

Este componente corresponde a los reclamos de severidad positiva moderada. Para este grupo se evaluarán distribuciones candidatas como gamma, lognormal, Weibull y exponencial, debido a que son distribuciones usuales para variables continuas positivas y asimétricas.

Luego, se analizarán los costos mayores o iguales a 900 euros:

$$Y_i \mid Y_i \geq 900.$$

Este componente corresponde a la cola derecha de la distribución, es decir, a los reclamos de mayor severidad. El objetivo será determinar si los costos altos presentan un comportamiento distinto al de los costos positivos moderados y si requieren una distribución diferente para describirlos adecuadamente.

Para cada componente positivo, y siguiendo con lo indicado por Delignette-Muller & Dutang (2015), se estimarán los parámetros de las distribuciones candidatas. De forma general, si $F_j(y | \theta_j)$ representa una distribución candidata para el componente j , el objetivo será estimar el vector de parámetros θ_j . Mediante máxima verosimilitud, estos parámetros se obtienen maximizando la función de verosimilitud:

$$L(\theta_j) = \prod_{i \in C_j} f_j(y_i | \theta_j),$$

donde C_j representa el conjunto de observaciones pertenecientes al componente analizado y $f_j(y_i | \theta_j)$ es la función de densidad de la distribución candidata. De forma equivalente, se maximiza la log-verosimilitud:

$$\ell(\theta_j) = \sum_{i \in C_j} \log f_j(y_i | \theta_j).$$

Una vez ajustadas las distribuciones candidatas, se comparará su desempeño mediante criterios de ajuste como el AIC (criterio de información de Akaike) y el BIC (criterio Bayesiano de información). El criterio de información de Akaike se define como:

$$AIC = -2\ell(\hat{\theta}) + 2k,$$

donde $\ell(\hat{\theta})$ representa la log-verosimilitud evaluada en los parámetros estimados y k representa el número de parámetros del modelo. Por su parte, el criterio bayesiano de información se define como:

$$BIC = -2\ell(\hat{\theta}) + k \ln(n).$$

En ambos casos, valores más bajos indican un mejor equilibrio entre ajuste y complejidad del modelo.

Además de los criterios numéricos, se utilizarán herramientas gráficas de diagnóstico generadas a partir de los ajustes, como comparaciones entre la función de distribución empírica y la función de distribución ajustada. Estos gráficos permitirán evaluar visualmente si la distribución seleccionada representa adecuadamente los datos observados.

Finalmente, el umbral de 900 euros se interpretará como una herramienta para separar el comportamiento de los costos moderados y de los costos altos. No se utilizará únicamente como una variable indicadora, sino como parte de una estructura de mezcla que distingue entre ausencia de costo, severidad positiva moderada y severidad alta. De esta manera, el análisis permitirá estimar tanto los pesos de cada componente como las distribuciones paramétricas que describen los costos positivos.

En relación con la pregunta de investigación, este método permite identificar no solo qué proporción de registros se ubica en la zona de alta severidad, sino también qué tipo de distribución describe mejor los costos moderados y los costos altos.

1.2.1.5. Justificación integrada de los métodos

Los métodos propuestos se organizan como una secuencia de análisis complementarios. En primer lugar, el análisis descriptivo permite caracterizar la estructura general de las variables de siniestralidad, distinguiendo entre frecuencia y severidad. Esta distinción es necesaria porque la frecuencia corresponde a una variable de conteo, mientras que la severidad corresponde a una variable continua no negativa. Además, el análisis descriptivo permite identificar características importantes de los datos, como el exceso de ceros, la asimetría y la presencia de valores extremos.

En segundo lugar, el análisis de asociación entre variables cuantitativas permite explorar si características numéricas del asegurado o del vehículo se relacionan con la frecuencia o la severidad de los siniestros. Este método no busca establecer causalidad, sino identificar patrones preliminares que puedan orientar la interpretación de los resultados. Debido a que las variables de siniestralidad pueden presentar distribuciones asimétricas y valores atípicos, se dará prioridad a coeficientes no paramétricos como Spearman y Kendall.

En tercer lugar, la comparación entre grupos permite estudiar variables categóricas, como el tipo de vehículo, la zona de circulación o el tipo de combustible. Este método complementa el análisis de correlación, ya que muchas características relevantes del problema no son numéricas. A través de tablas, proporciones y gráficos comparativos, será posible observar si ciertos grupos presentan mayor frecuencia de siniestros, mayor proporción de costos positivos o mayor severidad en los reclamos.

Finalmente, el análisis del umbral de 900 euros permite estudiar con mayor detalle los reclamos de alta severidad. Este método incorpora la retroalimentación recibida, al no tratar el umbral únicamente como una variable indicadora, sino como parte de una posible estructura de mezcla en la distribución del costo anual. De esta manera, se distinguen registros sin costo, registros con costos positivos moderados y registros ubicados en la cola derecha de la distribución.

1.2.2. Programa maqueta

1.2.3. Etapa de validación

1.2.4. Respaldo de la propuesta metodológica

1.2.4.1. Análisis descriptivo de la frecuencia y severidad





Figura 6: Distribución de la frecuencia de los siniestros menores a 10

En el gráfico sobre la distribución de la frecuencia de los reclamos menores o iguales a 10, se puede observar que hay una gran concentración de observaciones en 0, con un total de 85,909 observaciones, representando aproximadamente un 81.39 % de los datos. Además de esto, se puede ver que la distribución es decreciente, entre más aumenta la cantidad de reclamos, más disminuye la cantidad de observaciones.



Fuente: Lledó & Pavía (2024), Mendeley Data. DOI: 10.17632/5cxyb5fp4f.2

Figura 7: Comparación entre los ceros observados y los ceros esperados en la frecuencia de los siniestros utilizando una distribución Poisson

Este gráfico muestra la proporción de ceros observados en los datos originales con la proporción de ceros esperada según una distribución Poisson de parámetro $\lambda = 0.39$, el cual es el promedio de la frecuencia de siniestros por año. Se obtuvo que, con la distribución Poisson, la proporción de ceros esperada es de 67.39 %, mientras que la proporción de ceros observada en los datos es de 81.39 %, resultando en una diferencia de 14 % en la proporción de ceros, lo que indica que la distribución Poisson no es adecuada para modelar la frecuencia de los siniestros debido a la gran cantidad de ceros observada en la columna “N_claims_year”.




Figura 8: Distribución de los costos de reclamos por año mayores a €0 y menores a €5,000

El boxplot muestra la distribución de la variable “Cost_claims_year” para reclamos mayores a €0 y menores a €5000, en el cual se puede observar que esta variable presenta una fuerte asimetría hacia la derecha, alta concentración en valores bajos y múltiples valores atípicos. Esto justifica el uso de coeficientes no paramétricos como el Spearman y el Kendall en vez del Pearson para el análisis de asociación de las variables y el uso de la mediana en vez de la media debido a la gran cantidad de valores atípicos.

```
library(pastecs)
```

Warning: package 'pastecs' was built under R version 4.5.3

Adjuntando el paquete: 'pastecs'

The following objects are masked from 'package:dplyr':

first, last

The following object is masked from 'package:tidyr':

extract

```

stat_frec <- stat.desc(datos_analisis$N_claims_year,
                      basic = TRUE, desc = TRUE, norm = FALSE)

costos_positivos <- datos_analisis$Cost_claims_year[
  datos_analisis$Cost_claims_year > 0]

stat_sev <- stat.desc(costos_positivos,
                      basic = TRUE, desc = TRUE, norm = FALSE)

indicadores <- c("nbr.val", "min", "max", "mean", "median",
                 "var", "std.dev", "coef.var")

nombres <- c("N válidos", "Mínimo", "Máximo", "Media",
             "Mediana", "Varianza", "Desviación estándar",
             "Coeficiente de variación")

tabla_fs <- tibble(
  Indicador = c(
    nombres,
    "% de ceros (toda la variable)",
    "Índice de sobredispersión (var/media)"
  ),
  frecuencia = c(
    round(stat_frec[indicadores], 4),
    round(mean(datos_analisis$N_claims_year == 0) * 100, 2),
    round(var(datos_analisis$N_claims_year) /
          mean(datos_analisis$N_claims_year), 4)
  ),
  severidad = c(
    round(stat_sev[indicadores], 2),
    round(mean(datos_analisis$Cost_claims_year == 0) * 100, 2),
    NA
  )
) %>%
  rename(
    `Frecuencia (N_claims_year)` = frecuencia,
    `Severidad (Cost_claims_year)` = severidad
  )

knitr::kable(
  tabla_fs,
  caption = "Estadísticos descriptivos de frecuencia y severidad de siniestros",
  booktabs = TRUE,
  align = c("l", "r", "r"),
  format.args = list(big.mark = ",", scientific = FALSE)
) %>%
  kableExtra::kable_styling(

```

```

full_width = FALSE,
position = "center",
font_size = 10,
latex_options = "hold_position"
)

```

Tabla 9: Estadísticos descriptivos de frecuencia y severidad de siniestros

Indicador	Frecuencia (N_claims_year)	Severidad (Cost_claims_year)
N válidos	103,791.0000	19,499.00
Mínimo	0.0000	40.05
Máximo	25.0000	260,853.24
Media	0.3982	828.22
Mediana	0.0000	291.00
Varianza	1.2286	11,247,814.30
Desviación estándar	1.1084	3,353.78
Coefficiente de variación	2.7837	4.05
% de ceros (toda la variable)	81.2100	81.21
Índice de sobredispersión (var/media)	3.0855	NA

Por el lado de la frecuencia, de los 103,791 registros válidos, el 81.21 % no presentó ningún siniestro durante el año, lo que se confirma con una mediana de 0. Esto evidencia una alta concentración de ceros en la distribución. La media de 0.40 siniestros anuales está fuertemente influenciada por los casos extremos, siendo el máximo observado de 25 siniestros en un año. El índice de sobredispersión de 3.09 indica que la varianza es aproximadamente tres veces mayor que la media, lo cual viola el supuesto de equidispersión de la distribución Poisson. Esto es consistente con el análisis previo que mostró que la Poisson solo predice un 67.39 % de ceros, subestimando en 14 puntos porcentuales los ceros observados. Ambos elementos en conjunto descartan el uso de Poisson para modelar esta variable. Por otro lado, los estadísticos de severidad se calcularon únicamente sobre los 19,499 registros con costo positivo, es decir, el 18.79 % de la base. Entre estos registros, la media del costo es de €828.22, pero la mediana es de apenas €291.00, una diferencia considerable que refleja una fuerte asimetría hacia la derecha. Esto significa que la mayoría de los reclamos positivos son de baja cuantía, pero existen casos extremos que elevan el promedio, como lo confirma el máximo de €260,853.24. La desviación estándar de €3,353.78 es cuatro veces mayor que la media, y el coeficiente de variación de 4.05 indica una dispersión muy alta en los costos. Esto justifica el uso de la mediana como medida principal de tendencia central para la severidad, y respalda la elección de distribuciones asimétricas como la lognormal para modelar los costos positivos, como se desarrolla más adelante en el análisis del umbral de €900.


1.2.4.2. Análisis de asociación entre variables cuantitativas

Shapiro-Wilk normality test

```
data: datos$N_claims_year[1:5000]
```

$W = 0.37226$, $p\text{-value} < 2.2e-16$

Para determinar el método de correlación más adecuado, se aplicó la prueba de Shapiro-Wilk sobre una muestra de 5,000 valores de la variable `N_claims_year`. Se obtuvo un estadístico $W = 0.37226$ y un $p\text{-valor} < 2.2e-16$. Como el $p\text{-valor}$ es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis de normalidad, por lo que se descarta el coeficiente de Pearson y se utiliza Spearman para el análisis de correlación. Se eligió Spearman sobre Kendall porque con muestras grandes como la de este proyecto ambos coeficientes tienden a producir conclusiones similares, pero Spearman es computacionalmente más eficiente y es el más utilizado en la literatura de seguros para este tipo de análisis exploratorio.



Fuente: Lledó & Pavia (2024), Mendeley Data. DOI: 10.17632/5cxyb5fp4f.2

Figura 9: Matriz de correlaciones de variables numéricas

La matriz permite observar las asociaciones entre las variables cuantitativas. En cuanto a las variables de siniestralidad, `N_claims_history` presenta la correlación más alta con `N_claims_year` ($\rho = 0.38$)

y con `Cost_claims_year` ($\rho = 0.36$), lo que indica que los asegurados con mayor historial de reclamos tienden a presentar más siniestros y costos más altos en el año analizado. La correlación casi perfecta entre `N_claims_year` y `Cost_claims_year` ($\rho = 0.99$) es un resultado esperable, ya que a mayor número de reclamos mayor será el costo acumulado, por lo que ambas variables capturan esencialmente el mismo fenómeno desde ángulos distintos.

Como observación secundaria, la matriz también muestra correlaciones altas entre variables explicativas entre sí. El peso del vehículo (`Weight`) presenta una correlación positiva fuerte con el valor del vehículo (`Value_vehicle`, $\rho = 0.87$) y con la potencia (`Power`, $\rho = 0.67$), lo que sugiere que estas tres variables podrían estar midiendo aspectos relacionados entre sí. Esto es relevante para etapas posteriores de modelación, ya que incluir variables que están muy correlacionadas entre sí podría generar redundancia en el modelo.

Tabla 10: Correlaciones de Spearman con intervalos de confianza al 95 %

Variable explicativa	Variable respuesta	ρ Spearman	IC inferior (95 %)	IC superior (95 %)	p-valor	Interpretación
Variables temporales del asegurado						
edad	<code>N_claims_year</code>	-0.0124	-0.0185	-0.0063	0.000064	Asociación negativa
edad	<code>Cost_claims_year</code>	-0.0140	-0.0201	-0.0079	0.000007	Asociación negativa
Seniority	<code>N_claims_year</code>	-0.0443	-0.0503	-0.0382	0.000000	Asociación negativa
Seniority	<code>Cost_claims_year</code>	-0.0499	-0.0560	-0.0439	0.000000	Asociación negativa
antigüedad_licencia	<code>N_claims_year</code>	-0.0234	-0.0295	-0.0173	0.000000	Asociación negativa
antigüedad_licencia	<code>Cost_claims_year</code>	-0.0250	-0.0311	-0.0189	0.000000	Asociación negativa
edad_vehiculo	<code>N_claims_year</code>	0.0663	0.0603	0.0724	0.000000	Asociación positiva
edad_vehiculo	<code>Cost_claims_year</code>	0.0609	0.0548	0.0670	0.000000	Asociación positiva
Variables del vehículo e historial						
Power	<code>N_claims_year</code>	0.0669	0.0608	0.0729	0.000000	Asociación positiva
Power	<code>Cost_claims_year</code>	0.0689	0.0628	0.0749	0.000000	Asociación positiva
Value_vehicle	<code>N_claims_year</code>	0.0798	0.0738	0.0858	0.000000	Asociación positiva
Value_vehicle	<code>Cost_claims_year</code>	0.0822	0.0761	0.0882	0.000000	Asociación positiva
Weight	<code>N_claims_year</code>	0.0885	0.0825	0.0946	0.000000	Asociación positiva
Weight	<code>Cost_claims_year</code>	0.0889	0.0829	0.0950	0.000000	Asociación positiva
<code>N_claims_history</code>	<code>N_claims_year</code>	0.3782	0.3730	0.3834	0.000000	Asociación positiva
<code>N_claims_history</code>	<code>Cost_claims_year</code>	0.3645	0.3592	0.3698	0.000000	Asociación positiva

Los resultados de la tabla confirman que ninguna variable explicativa presenta una asociación fuerte con la frecuencia ni con la severidad de los siniestros. La correlación más alta corresponde a `N_claims_history`, con $\rho = 0.3782$ para frecuencia y $\rho = 0.3645$ para severidad, lo que indica una asociación positiva moderada consistente con lo observado en la matriz. Este resultado es esperable desde una perspectiva actuarial, ya que el historial de reclamos es un predictor natural del comportamiento futuro.

Las variables asociadas a características físicas del vehículo, como `Weight`, `Value_vehicle` y `Power`, muestran asociaciones positivas débiles con coeficientes entre 0.06 y 0.09, lo que sugiere que vehículos más pesados, valiosos o potentes están levemente asociados con mayor siniestralidad. Las variables temporales del asegurado, como `edad`, `antigüedad_licencia` y `Seniority`, presentan asociaciones negativas

muy débiles con coeficientes entre -0.01 y -0.05, mientras que `edad_vehiculo` muestra una asociación positiva débil de $\rho = 0.066$.

En todos los casos los intervalos de confianza al 95 % no contienen el cero, lo que indica que las asociaciones son estadísticamente distinguibles de cero. Sin embargo, dado que los coeficientes son cercanos a cero en la mayoría de los casos, estas asociaciones deben interpretarse como débiles en términos prácticos, no como relaciones sustantivas entre las variables.

1.2.4.3. Comparación entre grupos para variables categóricas




Figura 10: Frecuencia promedio de siniestros por año según el tipo de vehículo

Se observa que las furgonetas son el tipo de vehículo que mayor frecuencia promedio de siniestros anual posee, con 0.568 siniestros por año, luego están los turismos, los cuales tienen 0.397 siniestros por año, luego están las motocicletas con 0.145 siniestros por año y por último están los vehículos agrícolas, los cuales poseen 0.001 siniestros por año.

Estos resultados indican que el tipo de vehículo es un factor de importancia en la frecuencia de siniestros; las furgonetas son el tipo de vehículo con la mayor frecuencia promedio de siniestros anual, las furgonetas poseen en promedio más del doble de siniestros que las motocicletas y más de 500 veces más siniestros en promedio que los vehículos agrícolas.

Este hallazgo indica que la variable del tipo de vehículo “`Type_risk`” interviene en la frecuencia de los siniestros.




Figura 11: Proporción de asegurados sin siniestros según el tipo de vehículo

Como muestra el gráfico, los vehículos agrícolas son los que poseen mayor proporción de asegurados sin siniestros, con un 99.88 % que no presentan reclamaciones, seguido por las motocicletas las cuales poseen un 92.43 % de asegurados sin reclamaciones, los turismos poseen un 80.74 % y las furgonetas un 77.19 %.

Estos hallazgos concuerdan con el hallazgo anterior, ya que las furgonetas no solamente poseen la mayor frecuencia promedio: 0.568, sino que también poseen la menor proporción de asegurados sin siniestros: 77.19 %. A diferencia de los vehículos agrícolas los cuales prácticamente nunca reportan siniestros y son los que mayor proporción de asegurados sin siniestros tienen, con 99.88 % como se mencionó anteriormente.




Figura 12: Proporción de registros con costo positivo según el tipo de vehículo

En este gráfico se puede observar que los vehículos agrícolas son los que poseen la menor proporción de registros con costo mayor a €0, con una proporción de 0.12 %, seguido de las motocicletas las cuales tienen un 7.57 %, luego los turismos con 19.26 % y finalmente, las furgonetas son las que tienen la mayor proporción, con 22.81 %. El presente gráfico y el anterior son complementarios, ya que las furgonetas, las cuales tienen un 77.19 % en la proporción de asegurados sin siniestros, son las que mayor proporción de asegurados con costo positivo tiene, con 22.81 %. En contraste, los vehículos agrícolas los cuales son los que poseen mayor proporción sin siniestros, con 99.88 %, tienen prácticamente una nula presencia en la proporción de costos positivos, con 0.12 %.




Figura 13: Distribución del costo anual por tipo de vehículo

Como se puede observar, la mediana de las furgonetas, motocicletas y turismos, se encuentra por debajo de la mitad de la caja de cada una, indicando que existe una asimetría positiva para estos tres tipos de vehículos. Además, las cajas de las furgonetas y turismos son prácticamente iguales, lo que indica que tienen una variabilidad similar, a pesar de esto, los turismos presentan muchos valores atípicos desde los 2000 hasta los 5000, mientras que las furgonetas poseen menos valores atípicos.

La caja de las motocicletas es más pequeña que la de las furgonetas y la de los turismos, indicando que posee menor variabilidad que estos dos tipos de vehículos, además, posee menos valores atípicos. Para el caso de los vehículos agrícolas, su caja es casi una línea, indicando que hay prácticamente un costo fijo cerca de 200, además, no posee valores atípicos ni bigotes, esto concuerda con su frecuencia promedio de siniestros que es prácticamente 0.

```
tabla_resumen_tipo_vehiculo <- datos_modificados %>%
  group_by(categoria) %>%
  summarise(
    n = n(),
    frec_promedio = mean(N_claims_year, na.rm = TRUE),
    prop_sin_siniestros = mean(N_claims_year == 0, na.rm = TRUE),
    prop_costo_positivo = mean(Cost_claims_year > 0, na.rm = TRUE),
    media_costo_pos = mean(Cost_claims_year[Cost_claims_year > 0], na.rm = TRUE),
    mediana_costo_pos = median(Cost_claims_year[Cost_claims_year > 0], na.rm = TRUE),
    q1_costo_pos = quantile(Cost_claims_year[Cost_claims_year > 0], 0.25, na.rm = TRUE),
    q3_costo_pos = quantile(Cost_claims_year[Cost_claims_year > 0], 0.75, na.rm = TRUE),
    max_costo_pos = max(Cost_claims_year[Cost_claims_year > 0], na.rm = TRUE)
```

```

)

tabla_resumen_tipo_vehiculo %>%
  mutate(
    frec_promedio = round(frec_promedio, 4),
    prop_sin_siniestros = scales::percent(prop_sin_siniestros, accuracy = 0.01),
    prop_costo_positivo = scales::percent(prop_costo_positivo, accuracy = 0.01),
    across(c(media_costo_pos, mediana_costo_pos,
              q1_costo_pos, q3_costo_pos, max_costo_pos),
            ~ formatC(., format = "f", digits = 2, big.mark = ","))
  ) %>%
  knitr::kable(
    col.names = c("Tipo de vehículo", "n", "Frec. promedio",
                  "Sin siniestros", "Costo > €0",
                  "Media (€)", "Mediana (€)", "Q1 (€)", "Q3 (€)", "Máximo (€)"),
    caption = "Resumen de frecuencia y severidad por tipo de vehículo",
    booktabs = TRUE,
    align = c("l", "r", "r", "r", "r", "r", "r", "r", "r", "r"),
    format.args = list(scscientific = FALSE)
  ) %>%
  kableExtra::kable_styling(
    full_width = FALSE,
    position = "center",
    font_size = 9,
    latex_options = "hold_position"
  )

```


Tabla 11: Resumen de frecuencia y severidad por tipo de vehículo

Tipo de vehículo	n	Frec. promedio	Sin siniestros	Costo > €0	Media (€)	Mediana (€)	Q1 (€)	Q3 (€)	Máximo (€)
Agrícola	851	0.0012	99.88 %	0.12 %	192.67	192.67	192.67	192.67	192.67
Furgoneta	13212	0.5676	77.19 %	22.81 %	729.42	282.32	111.54	882.00	37,469.24
Motocicleta	8502	0.1454	92.43 %	7.57 %	479.90	141.25	66.06	556.66	22,098.24
Turismo	82990	0.3967	80.74 %	19.26 %	857.00	298.42	94.62	882.00	260,853.24

En cuanto a la frecuencia, los resultados confirman que las furgonetas presentan la mayor siniestralidad promedio con 0.5676 siniestros por año, seguidas por los turismos con 0.3967, las motocicletas con 0.1454, y los vehículos agrícolas con 0.0012. Este mismo ordenamiento se refleja en la proporción de asegurados sin siniestros: los vehículos agrícolas concentran el 99.88 % de registros sin reclamaciones, mientras que las furgonetas tienen la menor proporción con 77.19 %. En cuanto a la severidad, cuando se presentan siniestros, los turismos son el tipo de vehículo con mayor costo promedio (€857.00) y el mayor costo máximo registrado (€260,853.24), lo que sugiere la presencia de siniestros de alta severidad en este grupo. Sin embargo, su mediana (€298.42) es cercana a la de las furgonetas (€282.32), lo que indica que la mayoría de los siniestros en ambos grupos tienen costos similares y que la diferencia en la media está impulsada por valores extremos. Un hallazgo notable es que tanto las furgonetas como los turismos presentan un tercer cuartil de exactamente €882.00, lo que coincide con el umbral analizado en secciones anteriores del presente informe y


sugiere una concentración de siniestros en ese valor para ambos tipos de vehículo. Las motocicletas, aunque con menor frecuencia que furgonetas y turismos, presentan una mediana de costo positivo de €141.25, la más baja entre los tres grupos activos, lo que indica que sus siniestros tienden a ser menos costosos. Para los vehículos agrícolas, todos los estadísticos de severidad convergen en €192.67, resultado consistente con el hecho de que prácticamente la totalidad de sus escasos registros con costo positivo corresponden a un único valor.

A continuación, se realizará la comparación entre grupos por área:




Fuente: Lledó & Pavia (2024), Mendeley Data. DOI: 10.17632/5cxyb5fp4f.2

Se muestra que los asegurados en zonas urbanas presentan una mayor frecuencia promedio de siniestros anual en comparación con los asegurados en zonas rurales. Si bien la diferencia no es tan pronunciada como la observada entre tipos de vehículo, sí existe una brecha visible entre ambas zonas, lo que sugiere que la zona de circulación tiene alguna influencia sobre la frecuencia de siniestros. Esto es consistente con lo esperado, dado que las zonas urbanas presentan mayor densidad de tráfico y, por tanto, mayor exposición al riesgo de siniestros.



Fuente: Lledó & Pavía (2024), Mendeley Data. DOI: 10.17632/5cxyb5fp4f.2

La zona rural presenta una proporción de asegurados sin siniestros ligeramente mayor (82.07 %) en comparación con la zona urbana. Este resultado es complementario al gráfico anterior, ya que la zona urbana, que tiene mayor frecuencia promedio de siniestros, también tiene menor proporción de asegurados sin reclamaciones. Sin embargo, la diferencia entre ambas zonas es modesta, lo que indica que la zona de circulación, aunque relevante, no genera diferencias tan marcadas en la concentración de ceros como sí lo hace el tipo de vehículo.



Fuente: Lledó & Pavía (2024), Mendeley Data. DOI: 10.17632/5cxyb5fp4f.2

En este gráfico se puede observar que las zonas urbanas presentan una mayor proporción de registros con costo mayor a €0 (20.42 %) en comparación con las zonas rurales (17.93 %). Este resultado es el complemento directo del gráfico anterior: la zona urbana, que tiene menor proporción de asegurados sin siniestros (79.58 %), es también la que mayor proporción de registros con costo positivo presenta. La diferencia entre zonas es de aproximadamente 2 puntos porcentuales, modesta pero consistente con el patrón de mayor siniestralidad en entornos urbanos.




Figura 14: Distribución del costo anual por zona de circulación

Las distribuciones del costo anual positivo son notablemente similares entre zonas rurales y urbanas. Ambas cajas tienen tamaños prácticamente iguales, con medianas cercanas a los €300, lo que indica una variabilidad y tendencia central muy parecidas entre zonas. En ambos casos la mediana se encuentra en la parte inferior de la caja, evidenciando una asimetría positiva: la mayoría de los siniestros con costo positivo tienen costos relativamente bajos, pero existen valores atípicos que se extienden hasta los €5,000 en el rango visible del gráfico. La cantidad y distribución de estos valores atípicos son similares entre zonas.

Tabla 12: Resumen de frecuencia y severidad por zona de circulación

Zona	n	Frecuencia		Severidad					
		Frec. promedio	Sin siniestros	Costo > €0	Media (€)	Mediana (€)	Q1 (€)	Q3 (€)	Máximo (€)
Rural	75451	0.3758	81.91 %	18.09 %	818.62	288.98	98.87	882.00	236,285.18
Urbana	28340	0.4578	79.36 %	20.64 %	850.65	295.31	89.70	882.00	260,853.24

En cuanto a la frecuencia, los asegurados en zonas urbanas presentan una mayor siniestralidad promedio (0.4534 siniestros por año) en comparación con los de zonas rurales (0.3726), lo que es consistente con las condiciones de tráfico más densas características de las áreas urbanas. Esto también se refleja en la proporción de asegurados sin siniestros, que es ligeramente mayor en zonas rurales (82.07 %) que en zonas urbanas (79.58 %). En cuanto a la severidad, las diferencias entre zonas son menos pronunciadas que las observadas entre tipos de vehículo. La media del costo positivo es de €846.08 en zonas urbanas y €816.00

en zonas rurales, una diferencia modesta. Las medianas son también similares: €292.29 para zonas urbanas y €287.50 para zonas rurales, lo que indica que la distribución central de los costos cuando ocurre un siniestro no varía sustancialmente entre zonas. Como ya se observó para el tipo de vehículo, ambas zonas presentan un tercer cuartil de €882.00, lo que refuerza la hipótesis de una concentración de siniestros en ese umbral con independencia de la zona de circulación. El costo máximo registrado es mayor en zonas urbanas (€260,853.24) que en rurales (€236,285.18), aunque ambos valores corresponden a eventos extremos y no son representativos del comportamiento general. En conjunto, estos resultados sugieren que la zona de circulación tiene una influencia moderada sobre la frecuencia de siniestros, siendo las zonas urbanas ligeramente más siniestradas, mientras que su efecto sobre la severidad es limitado.

1.2.4.4. Análisis del umbral de 900 euros mediante distribución mixta

Para estudiar el comportamiento del costo anual de los siniestros en el umbral de los €900, se propuso un modelo de distribución mixta, separado en tres componentes, primero, una masa puntual ubicada en cero, para la cual los costos corresponden a 0 ($Y = 0$). Segundo, una distribución para los costos ubicados entre €0 y €900, sin incluir ($0 < Y < 900$). Tercero, una distribución para los costos mayores o iguales a €900 ($Y \geq 900$), la cual para una mejor visualización gráfica se acotó a €20000. A continuación se presentan los resultados obtenidos a través del ajuste de distribuciones para costos mayores a €0.

Para el intervalo de 0 a 900, se ajustaron dos distribuciones posibles elegidas a partir de la visualización del gráfico de la distribución los costos entre €0 y €900, las cuales fueron la distribución Lognormal y la distribución Gamma. Por medio del paquete “fitdistrplus” se realizó el ajuste, del cual se obtuvo que el Criterio de Información de Akaike (AIC) tuvo un valor de 211,339.9 para el caso de la distribución Lognormal, mientras que para la distribución Gamma se obtuvo un AIC de 212,684.5, resultando en una diferencia de 1,344.6; obteniendo que la distribución Lognormal posee un AIC significativamente menor que el de la distribución Gamma, lo que indica que posee un mejor ajuste para los datos. De esta forma se seleccionó la Lognormal para modelar los costos que están en el intervalo $]0,900[$. A partir del paquete “fitdistrplus” y su función “fitdist()” se obtuvo que los parámetros para esta distribución son: $\text{meanlog} = 5.2785366$ y $\text{sdlog} = 0.9693318$. Los siguientes gráficos muestran pruebas adicionales que se realizaron para comparar ambas distribuciones.




Figura 15: Gráficos diagnósticos de la distribución Lognormal para el intervalo $0 < Y < 900$




Figura 16: Gráficos diagnósticos de la distribución Gamma para el intervalo $0 < Y < 900$

Además, la siguiente figura muestra la comparación entre la distribución Lognormal y la Gamma, superpuestas al histograma de los costos en el intervalo $0 < Y < 900$:




Figura 17: Comparación de las distribuciones Lognormal y Gamma para el intervalo $0 < Y < 900$

Para el intervalo de los valores mayores o iguales a 900 ($Y \geq 900$), primero se acotaron los costos por €20,000, de modo que quedó el intervalo ($900 \leq Y \leq 20,000$). Después, se ajustaron dos distribuciones posibles elegidas a partir de la visualización del gráfico de la distribución los costos entre €900 y €20,000, las cuales fueron la distribución Lognormal y la distribución Pareto. Por medio del paquete “fitdistrplus” y la función “fitdist()” se realizó el ajuste para la distribución Lognormal, del cual se obtuvo que el AIC tuvo un valor de 64,536.62, mientras que para la distribución Pareto se obtuvo un AIC de 66422.61, resultando en una diferencia de 1,885.99; obteniendo que la distribución Lognormal posee un AIC significativamente menor que el de la distribución Pareto, lo que indica que posee un mejor ajuste para los datos. De esta forma se seleccionó la Lognormal para modelar los costos que están en el intervalo ($Y \geq 900$). Además, se obtuvo que los parámetros para esta distribución Lognormal son: $\text{meanlog} = 7.5571894$ y $\text{sdlog} = 0.6816524$. Los siguientes gráficos muestran pruebas adicionales que se realizaron para comparar ambas distribuciones.








Figura 18: Gráficos diagnósticos de la distribución Lognormal para el intervalo $900 \leq Y \leq 20,000$



Además, la siguiente figura muestra la comparación entre la distribución Lognormal y la Pareto, superpuestas al histograma de los costos en el intervalo $900 \leq Y \leq 20,000$:




Figura 19: Comparación de las distribuciones Lognormal y Pareto para el intervalo $900 \leq Y \leq 20,000$

Tabla 13: Proporciones de los componentes de la distribución mixta

Grupo	Frecuencia	Proporcion	Porcentaje
Ceros	85909	0.8138790	81.388
Medios	15851	0.1501682	15.017
Altos	3795	0.0359528	3.595

A través de los resultados obtenidos, presentados en la tabla anterior, se puede observar que los costos nulos representan un 81.388 % del total de registros, mientras que el 15.017 % de los registros corresponden a costos medios, ubicados en el intervalo $(0 < Y < 900)$, mientras que solamente 3.595 % de los registros corresponden a costos mayores o iguales a €900.

Con el análisis anterior, con las distribuciones y las proporciones determinadas, se puede construir la distribución mixta.

$$Y_i \sim \pi_0 \cdot \delta_0 + \pi_1 \cdot \text{Lognormal}(\mu_1, \sigma_1) + \pi_2 \cdot \text{Lognormal}(\mu_2, \sigma_2)$$

Donde:

- $\pi_0 = 0.81388$
- δ_0 es una masa puntual en cero, donde $\delta_0 = 1$ si $Y = 0$, y $\delta_0 = 0$ en otro caso.
- $\pi_1 = 0.15017$

- Lognormal(μ_1, σ_1) es la distribución para costos en el intervalo ($0 < Y < 900$)
- $\mu_1 = 5.2785366$
- $\sigma_1 = 0.9693318$
- $\pi_2 = 0.03595$
- Lognormal(μ_2, σ_2) es la distribución para costos en el intervalo ($Y \geq 900$)
- $\mu_2 = 7.5571894$
- $\sigma_2 = 0.6816524$

Este modelo se adapta adecuadamente a la estructura de una distribución mixta para los datos, una masa en cero de $\pi_0 = 0.81388$ de las observaciones, un componente de costos medios correspondiente al intervalo ($0 < Y < 900$) el cual sigue una distribución Lognormal con parámetros $\mu_1 = 5.2785366$ y $\sigma_1 = 0.9693318$, el cual posee una proporción $\pi_1 = 0.15017$ y finalmente un componente para los costos altos, correspondiente al intervalo ($Y \geq 900$), el cual sigue nuevamente una distribución Lognormal con parámetros $\mu_2 = 7.5571894$ y $\sigma_2 = 0.6816524$ el cual posee una proporción $\pi_2 = 0.03595$. La información mencionada anteriormente se resume en la siguiente tabla.

Tabla 14: Parámetros del modelo de distribución mixta para el costo anual de siniestros

Componente	Rango	Distribución	Parámetros	Prop
Costos Cero	$Y = 0\$$	Masa puntual (δ_0) ($Y = 0$)	—	π_0
Costos Medios	$0 < Y < 900\$$	Lognormal	$\mu_1 = 5.2785366, \sigma_1 = 0.9693318$	π_1
Costos Altos	$Y \geq 900\$$	Lognormal	$\mu_2 = 7.5571894, \sigma_2 = 0.6816524$	π_2

```
[1] ID                      Date_start_contract Date_last_renewal
[4] Date_next_renewal      Date_birth           Date_driving_licence
[7] Distribution_channel    Seniority            Policies_in_force
[10] Max_policies            Max_products         Lapse
[13] Date_lapse              Payment              Premium
[16] Cost_claims_year        N_claims_year        N_claims_history
[19] R_Claims_history        Type_risk             Area
[22] Second_driver           Year_matriculation    Power
[25] Cylinder_capacity       Value_vehicle         N_doors
[28] Type_fuel               Length               Weight
[31] categoria               edad                 antiguedad_licencia
[34] edad_vehiculo
<0 rows> (o 0- extensión row.names)
```

Como se puede observar, las furgonetas son las que tienen la mayor proporción de reclamos mayores a €900, presentando un 4.35 % de casos en los que los reclamos son mayores a €900, seguidamente se encuentran los turismos con 3.79 %, luego las motocicletas con 0.92 % y por último los vehículos agrícolas con 0.00 %, en donde no hay ningún caso en el que un vehículo agrícola posea un reclamo mayor a €900.

Este hallazgo indica que las furgonetas y turismos, no solamente poseen mayor frecuencia promedio, sino que también poseen mayor proporción de casos en donde los reclamos superan o son iguales al monto de los €900, lo que puede indicar que estos dos tipos de vehículos son relevantes para explicar el comportamiento en el umbral de los €900.




Figura 20: Proporción de reclamos mayores a €900 según el tipo de vehículo

1.2.5. Análisis fallido

1.2.5.1. Modelo Poisson para la frecuencia de siniestros

Para modelar la frecuencia de los siniestros se intentó ajustar un modelo lineal generalizado (GLM) con distribución Poisson para identificar las variables que influyen en la frecuencia de los siniestros por año. Las variables explicativas utilizadas fueron la edad del asegurado, la antigüedad del asegurado con la aseguradora (Seniority), el número de reclamos histórico (N_claims_history), el tipo de vehículo (Type_risk), el número de puertas (N_doors), el largo de vehículo (Length) y el peso del vehículo (Weight). El modelo se ajustó utilizando la función “glm()”, utilizando “family = poisson()”.

El modelo de Poisson falló por dos razones principales. La primera, es que el modelo de Poisson asume que la media y la varianza son iguales o que no distan por mucho. Sin embargo, gracias al análisis exploratorio realizado, se encontró que la variable N_claims_year tiene una media de aproximadamente 0.39, mientras que la varianza es de aproximadamente 1.22; lo que representa un indicio de sobredispersión en los datos. Luego se procedió a calcular la relación entre la varianza y la media (varianza/media) y se obtuvo que es de 3.09, el cual es mayor a uno, por lo que según el índice de sobredispersión de datos, se confirma que hay sobredispersión.

La segunda razón por la cual el modelo de Poisson falló fue porque subestima drásticamente la cantidad de ceros; en los datos se observó que aproximadamente 81.39 % del número de reclamos por año son cero, mientras que el modelo de Poisson, utilizando la media original de 0.39, estima que habrá 67.39 % de ceros, esto resulta en una diferencia de 14 puntos porcentuales, evidenciando un exceso de ceros que la distribución Poisson no puede generar con la media de los datos.

Para saber que el modelo de Poisson falló se realizaron 3 pruebas. Primero, se calculó la relación entre la varianza y la media, obteniendo un valor de 3.09, que como ya se indicó, implica sobredispersión en los datos. Segundo, se realizó una comparación entre los ceros observados y la proporción de ceros esperada con la distribución Poisson, de esta prueba se obtuvo que ambos valores distaban de 14 puntos porcentuales en la proporción de ceros. Tercero, se calculó el estadístico de sobredispersión por medio de los residuos de desviación del modelo de Poisson, de este cálculo se obtuvo un valor de 1.23, el cual es mayor a 1, lo que indica que hay una mayor variabilidad en los datos de la que el modelo Poisson puede contemplar.

Gracias a este fallo, se aprendió que para datos con alta concentración de ceros en la frecuencia no pueden modelarse por medio de una distribución Poisson, idea reforzada por la literatura consultada a lo largo de la investigación. Además de esto, se observó que la sobredispersión está presente incluso antes de controlar los datos con variables explicativas. Por esto, se descarta el uso del modelo Poisson para trabajar la frecuencia de los siniestros.

1.3. Construcción de las fichas de resultados

Ficha 1: frecuencia promedio por tipo de vehículo

Nivel descriptivo

Titular: Las furgonetas tienen mayor frecuencia promedio de siniestros

Nombre del hallazgo/resultado: Existen diferencias notables en la frecuencia promedio anual según el tipo de vehículo.

Resumen en una oración: Las furgonetas poseen la mayor frecuencia promedio, 0.568, turismos 0.397, motocicletas 0.145 y agrícolas 0.001.

Método o análisis que lo produjo: Se calculó el promedio de la variable “N_claims_year” agrupada

por el tipo de vehículo “categoria”, para esto se utilizaron las funciones “group_by()” y “summarise()” de R y para la visualización de los resultados se utilizó un gráfico de barras.

Evidencia: El gráfico que respalda este hallazgo corresponde a la (**promedio-tipo-vehículo?**) de la tercera bitácora, titulada “Frecuencia promedio de siniestros por año según el tipo de vehículo”.

Nivel analítico

Conexión con la pregunta de investigación: Este hallazgo responde directamente una parte de la pregunta de investigación, ya que confirma que el tipo de vehículo influye en la frecuencia de los siniestros, al encontrarse que las furgonetas y los turismos poseen una frecuencia promedio mayor a la de las motocicletas y vehículos agrícolas, los cuales poseen una frecuencia promedio mucho menor.

Contraste con la literatura: En relación con lo planteado por Párraga & Giler (2024), se encuentra una concordancia ya que los autores plantean que el tipo de vehículo es un factor de riesgo asociado a la ocurrencia de accidentes de tránsito.

Lo que NO explica este resultado: Este resultado no explica a qué factores se debe que las furgonetas tengan la mayor frecuencia promedio, tales como si es por el kilometraje, el uso comercial, las características de los conductores, etc.

Implicación para el siguiente paso: La variable “categoria” creada a partir de la variable “Type_risk” del data set original, se considerará como un posible factor explicativo en el análisis de la frecuencia de los siniestros, acompañada de otras variables que también influyan en la frecuencia de los siniestros, en caso de ser identificadas.

i Ficha 2: La distribución Poisson subestima drásticamente los ceros observados en siniestros

Nivel descriptivo

Nombre del hallazgo/resultado: La distribución Poisson es inadecuada para modelar la frecuencia anual de siniestros debido a sobredispersión y exceso de ceros

Resumen en una oración: La Poisson predice 67.4 % de ceros, pero los datos presentan 81.4 %.

Método o análisis que lo produjo: Se calculó el índice de sobredispersión como la razón varianza/media sobre N_claims_year directamente desde los datos, obteniendo un valor de 3.09. La proporción de ceros esperada bajo Poisson se obtuvo aplicando la fórmula analítica $P(X = 0) = e^{-\lambda}$ con $\lambda = 0.39$ (la media observada de N_claims_year), lo que da 67.39 %. Ambos valores se compararon visualmente con la proporción observada de ceros (81.39 %), calculada como $mean(N_{claims_year} == 0) * 100$, mediante un gráfico de barras construido con ggplot2.

Evidencia: Figura 2 (“Comparación entre ceros observados y esperados”), Tabla 9 (“Estadísticos descriptivos de frecuencia y severidad”) e índice de sobredispersión = 3.09 reportado en la sección 1.2.5.1.

Nivel analítico

Conexión con la pregunta de investigación: Este resultado es fundamental para la pregunta de investigación porque descarta un modelo de referencia clásico para la frecuencia de siniestros. Si la Poisson asumiera correctamente el comportamiento de N_claims_year, bastaría con un GLM estándar. Al fallar, se confirma que la estructura de los datos con exceso de ceros y sobredispersión, exige modelos más flexibles, como la binomial negativa o modelos con inflación de ceros, lo que orienta directamente la etapa de modelación formal.

Contraste con la literatura: Este resultado coincide plenamente con lo planteado por Počuča et al. (2020) en su ficha literaria, quienes advierten que los modelos tradicionales son insuficientes cuando los datos de seguros presentan distintas fuentes de heterogeneidad y exceso de ceros. La diferencia de 14 puntos porcentuales entre los ceros observados y los esperados bajo Poisson es, precisamente, la evidencia empírica que motiva el uso de modelos con inflación de ceros que los autores proponen.

Comparación explícita entre lo obtenido y lo esperado según la literatura: La literatura revisada, en particular Počuča et al. (2020) y Frees (2021), anticipaba que la distribución de Poisson podría ser un punto de partida razonable para modelar frecuencias de siniestros, pero advertía que los datos reales suelen presentar sobredispersión. El resultado obtenido confirma esta advertencia de manera contundente: el índice de sobredispersión de 3.09 indica que la varianza triplica a la media, y la brecha de 14 puntos porcentuales en la proporción de ceros hace que el modelo Poisson sea directamente inviable, no solo impreciso. Esta discrepancia no sorprende dado que los datos de seguros de automóviles incluyen asegurados muy heterogéneos, ya que algunos nunca tienen accidentes, otros los tienen frecuentemente, lo cual genera naturalmente un exceso de ceros que la Poisson no puede capturar con un único parámetro λ . La implicación es que cualquier análisis de frecuencia debe partir de modelos que separen la probabilidad de no tener ningún siniestro de la distribución de los siniestros cuando sí ocurren.

Lo que NO explica este resultado: Este resultado descarta la Poisson, pero no determina cuál distribución alternativa es la más adecuada. No permite distinguir entre una binomial negativa, una Poisson inflada de ceros o un modelo hurdle. Tampoco identifica qué variables explicativas generan la sobredispersión observada.

Implicación para el siguiente paso: Se debe explorar modelos alternativos para la frecuencia que contemplen sobredispersión y exceso de ceros, como lo son las cuatro etapas metodológicas que se han desarrollado a lo largo de esta bitácora.

i Ficha 3: proporción de reclamos mayores a €900 por tipo de vehículo

Nivel descriptivo

Titular: Las furgonetas y turismos concentran reclamos con alta severidad

Nombre del hallazgo/resultado: El tipo de vehículo influye en la proporción de reclamos del umbral que supera los €900.

Resumen en una oración: Las furgonetas poseen la mayor proporción, 4.35 %, turismos 3.79 %, motocicletas 0.92 % y agrícolas 0 %.

Método o análisis que lo produjo: Para este hallazgo, primero se creó una variable llamada “mayores_900”, la cual toma el valor de 1 si la variable “Cost_claims_year” era mayor o igual a 900, y 0 si no. Luego se calculó el promedio de esta variable agrupando por el tipo de vehículo “categoria”, obteniendo así la proporción de reclamos que supera el umbral de los €900 y se generó un gráfico de barras para la visualización de los resultados.

Evidencia: El gráfico que respalda este hallazgo corresponde a la (**proporcion-mayores-900-tipo-vehiculo?**) de la tercera bitácora, titulada “Proporción de reclamos mayores a €900 según el tipo de vehículo”.

Nivel analítico

Conexión con la pregunta de investigación: Este hallazgo responde directamente una parte del segundo componente de la pregunta de investigación, la cual intenta identificar qué explica el incremento abrupto en el umbral de los €900. Con este hallazgo, se puede confirmar que el tipo de vehículo es un factor relevante para explicar el comportamiento de los costos en el umbral de los €900, ya que las furgonetas y los turismos concentran las proporciones más altas de reclamos que superan este umbral.

Contraste con la literatura: No se identificaron estudios contemplados en esta investigación que mencionen el análisis categórico por tipo de vehículo en los costos de reclamos en un valor determinado como es el caso de este hallazgo, por lo que no se puede contrastar directamente con la literatura propuesta para esta investigación.

Lo que NO explica este resultado: Este resultado no explica por qué las furgonetas y los turismos poseen una mayor proporción de reclamos que superan los €900. No se identifica si esta mayor proporción se debe a factores como la distancia que recorren estos tipos de vehículos, el uso comercial que se les da, características de los conductores u otros factores no contemplados en la base de datos utilizada.

Implicación para el siguiente paso: A partir de este hallazgo, las furgonetas y turismos se identifican como dos grupos prioritarios para analizar los costos de reclamos que superen los €900. La variable del tipo de vehículo “categoría”, deberá ser considerada para análisis que busquen explicar el aumento en los costos de reclamos en el umbral de los €900.

1.4. Ordenamiento de los elementos del reporte

En la presente sección se realizará el ordenamiento de los elementos de reporte identificados durante el desarrollo del proyecto, los cuales serán clasificados como primarios o secundarios según su nivel de relevancia y aporte a la investigación. Estos elementos incluyen hipótesis, ideas, teorías provenientes de la literatura, así como hallazgos y resultados obtenidos a lo largo de la ejecución del proyecto.

Este proceso tiene como finalidad organizar la información de manera estructurada, de modo que sirva como base para la construcción del borrador final del informe.

Como primer paso en este proceso, se identifican y clasifican los elementos de reporte del proyecto en primarios y secundarios, según su nivel de importancia para el desarrollo de la investigación. Los elementos primarios corresponden a aquellos sin los cuales el trabajo perdería sentido, mientras que los secundarios aportan apoyo y contexto, pero no son fundamentales.

Elementos de reporte	
Primarios	Secundarios
Teoría A	Teoría B
Idea A	Idea B
Resultado A	Resultado B
Resultado C	Resultado D

Posteriormente, con base en la clasificación anterior, se establece una propuesta de organización para la redacción del informe final. La siguiente tabla presenta la distribución de los elementos dentro de las distintas secciones del documento, con el objetivo de garantizar una estructura lógica, coherente y ordenada para la presentación del trabajo.

Sección	Temas a tratar
Introducción	1. Teoría A (Primario) 2. Idea B (Primario) 3. Resultado de otro autor A (Secundario) 4. Resultado de otro autor B (Secundario) 5. etc.
Metodología	1. Detalle de los datos. (Primario) 2. Método A (Primario) 3. Método B (Secundario) 4. Diagnóstico del modelo (Primario)
Resultados	1. Resultado A (Primario) 2. Resultado B (Secundario) 3. etc.

1.5. La imagen que cuenta la historia

2. Arco narrativo del proyecto

3. Parte de escritura

4. Parte de reflexión

4.1. Reflexión sobre alcance del proyecto

4.2. Construcción y actualización de la UVE de Gowin

Luego de reflexionar sobre el alcance del proyecto, se replantearon algunas ideas y se incorporaron en la figura de la UVE de Gowin trabajada previamente en la Bitácora #1. Además, se agregaron las secciones de conclusiones y registro y transformación de datos, con el fin de completar la estructura del esquema.

En la sección de conclusiones, se indicó que, a partir del análisis realizado hasta el momento, es posible identificar algunas variables asociadas con la frecuencia y severidad de los siniestros. Sin embargo, es importante aclarar que estas no corresponden todavía a las conclusiones generales del proyecto, sino a observaciones preliminares basadas en los análisis desarrollados previamente. También se incluyó que el umbral de 900 euros permite distinguir reclamos de mayor severidad, aspecto que igualmente se determinó a partir del trabajo previo. Una vez que se complete el análisis restante, será posible plantear conclusiones más sólidas y contundentes.

Por otro lado, en la sección de registro y transformación de datos se describe, de manera general, el tratamiento aplicado a la base de datos entre la Bitácora #2 y la Bitácora #3. En esta parte se mencionan las transformaciones realizadas sobre algunas variables y la elaboración del análisis descriptivo. Los demás elementos de la UVE de Gowin se conservaron según la construcción realizada anteriormente.




Figura 21: UVE de Gowin

5. Fichas literarias construidas en la tercera bitácora

i Marambakuyana y Shongwe (2024)

Nivel descriptivo

Título: *Composite and Mixture Distributions for Heavy-Tailed Data—An Application to Insurance Claims*

Autores: Walena Anesu Marambakuyana y Sandile Charles Shongwe.

Año: 2024.

Nombre del tema: comparación de modelos compuestos y modelos de mezcla para ajustar datos de reclamos de seguros con colas pesadas.

Clasificación: Metodológica.

Se eligió esta etiqueta porque el artículo compara una gran cantidad de distribuciones paramétricas, modelos compuestos y modelos de mezcla para determinar cuáles se ajustan mejor a datos de reclamos de seguros. En particular, los autores analizan 256 modelos compuestos y 256 modelos de mezcla derivados de 16 distribuciones paramétricas populares.

Resumen en una oración: el artículo compara modelos compuestos y modelos de mezcla para analizar

reclamos de seguros con distribuciones asimétricas y colas pesadas.

Argumento central: los autores sostienen que los modelos compuestos y de mezcla ofrecen mayor flexibilidad que las distribuciones clásicas para modelar reclamos de seguros, especialmente cuando los datos presentan asimetría, alta severidad y colas pesadas. Sin embargo, concluyen que, para los dos conjuntos de datos analizados, los modelos compuestos tienden a brindar mejores estimaciones de riesgo que los modelos de mezcla.

Problemas con el argumento o el tema: una limitación importante es que el artículo se concentra en datos positivos de reclamos, por lo que no aborda directamente variables con exceso de ceros o acumulaciones en valores específicos como 0 o 900. Además, los propios autores advierten que no existe un modelo universalmente superior, ya que el mejor modelo depende de la estructura de los datos y de las métricas de riesgo utilizadas. También señalan que el acceso a datos reales de aseguradoras suele estar limitado por restricciones privadas, lo cual dificulta el uso de técnicas más avanzadas y procesos de validación más robustos.

Nivel analítico

Conexión con mi proyecto: este artículo se relaciona directamente con el proyecto porque trabaja con reclamos de seguros y con la modelización de variables de severidad. En el proyecto, la variable `Cost_claims_year` también representa una medida de severidad monetaria, por lo que la comparación entre distribuciones compuestas y modelos de mezcla puede servir como referencia metodológica para analizar la distribución de los costos. Además, el artículo es útil para justificar el uso de modelos más flexibles cuando los datos presentan asimetría y colas pesadas, características que pueden estar presentes en los reclamos con costos altos.

Lo que NO dice el autor: el artículo no estudia una variable con concentración específica en un umbral fijo como €900, ni propone una metodología diseñada para detectar un salto abrupto en un valor determinado. Tampoco trabaja con una distribución cero-inflada o con una masa puntual en valores como 0 o 900; más bien, se enfoca en reclamos positivos y en el ajuste de colas pesadas.

Contraste con otra fuente: en comparación con *Ayuso-Gutiérrez et al. (2015)*, este artículo no se enfoca en datos con exceso de ceros, sino en reclamos positivos con colas pesadas. Mientras *Ayuso-Gutiérrez et al. (2015)* es más útil para justificar modelos cero inflados, *Marambakuyana y Shongwe (2024)* es más útil para justificar el uso de distribuciones compuestas y de mezcla en datos de severidad monetaria. Ambas fuentes se complementan: la primera ayuda a pensar el problema de la acumulación en cero, mientras que la segunda permite analizar la severidad de los costos positivos y las colas de la distribución.

Evaluación de aplicabilidad (escala 1–5): 4.

La metodología es bastante aplicable al proyecto porque permite justificar el análisis de la variable `Cost_claims_year` como una variable de severidad con posible asimetría y cola pesada. Sin embargo, no recibe 5 porque el artículo no aborda directamente el problema de una concentración en el valor 900 ni el exceso de ceros.

Pregunta que le haría al autor: ¿Cómo modificaría los modelos compuestos o de mezcla para incorporar una masa puntual en valores específicos como 0 y 900 dentro de una variable de costos de reclamos?

Resumen argumentativo: Lo que los autores intentan resolver es cómo modelar datos de reclamos de seguros que presentan asimetría y colas pesadas, ya que las distribuciones clásicas como lognormal, gamma, Weibull o Pareto pueden no ser suficientemente flexibles para describir toda la estructura de los datos. Para esto, comparan 256 modelos compuestos y 256 modelos de mezcla construidos a partir de 16 distribuciones paramétricas. Los modelos compuestos dividen la distribución en dos partes: una para reclamos pequeños o moderados y otra para reclamos grandes; en cambio, los modelos de mezcla combinan dos distribuciones sobre el mismo dominio. Los autores evalúan los modelos mediante crite-

rios como NLL, AIC y BIC, además de medidas de riesgo como VaR y TVaR. Su conclusión principal es que los modelos compuestos tienden a producir mejores estimaciones de riesgo para los datos analizados. Para el proyecto, este artículo es útil porque respalda la idea de no asumir una única distribución simple para `Cost_claims_year`, sino comparar modelos flexibles capaces de capturar comportamientos distintos entre reclamos pequeños, moderados y altos. No obstante, como el proyecto también tiene concentración en 0 y posiblemente en 900, esta metodología debería complementarse con modelos que permitan masas puntuales o componentes discretos.

i Počuča et al. (2020)

Nivel descriptivo

Título: *Modeling Frequency and Severity of Claims with the Zero-Inflated Generalized Cluster-Weighted Models*

Autores: Nikola Počuča, Petar Jevtić, Paul D. McNicholas y Tatjana Miljkovic.

Año: 2020.

Nombre del tema: modelización conjunta de la frecuencia y severidad de reclamos de seguros mediante modelos generalizados ponderados por conglomerados con inflación de ceros.

Clasificación: Metodológica.

Se eligió esta etiqueta porque el artículo propone una extensión metodológica de los modelos *cluster-weighted models* para adaptarlos a datos de seguros. En particular, introduce los modelos generalizados ponderados por conglomerados y una versión cero inflada para trabajar con reclamos que presentan exceso de ceros.

Resumen en una oración: el artículo propone modelos cero inflados basados en conglomerados para analizar conjuntamente la frecuencia y la severidad de reclamos de seguros.

Argumento central: los autores sostienen que los modelos tradicionales pueden ser insuficientes para representar datos de seguros cuando existen distintas fuentes de heterogeneidad y exceso de ceros; por ello, proponen los modelos ZI-GCWM, los cuales permiten clasificar observaciones en grupos latentes y, al mismo tiempo, modelar la presencia de ceros en los reclamos.

Problemas con el argumento o el tema: una posible limitación es que la metodología es más compleja que modelos más tradicionales como GLM, modelos cero inflados simples o distribuciones compuestas. Esto puede dificultar su implementación e interpretación en un proyecto aplicado. Además, aunque el artículo trabaja con exceso de ceros, no se enfoca específicamente en una acumulación en un valor monetario distinto de cero, como el umbral de €900.

Nivel analítico

Conexión con mi proyecto: este artículo se relaciona directamente con el proyecto porque la variable `Cost_claims_year` presenta una gran cantidad de ceros, lo cual sugiere que no todos los asegurados generan reclamos durante el periodo observado. La propuesta de los autores es útil porque permite modelar datos de seguros con exceso de ceros y, además, considera la heterogeneidad entre grupos de pólizas o asegurados. Esto puede ser relevante para analizar si ciertos grupos de observaciones tienen mayor probabilidad de presentar reclamos positivos o costos más altos.

Lo que NO dice el autor: el artículo no se centra en explicar un salto abrupto en un umbral monetario específico como €900. Aunque el modelo cero inflado ayuda a tratar el exceso de ceros, no resuelve directamente el problema de una concentración adicional en otro valor puntual. Por eso, para el proyecto, esta fuente debería complementarse con una metodología que permita analizar masas puntuales o cambios estructurales alrededor del umbral de €900.

Contraste con otra fuente: en comparación con Marambakuyana y Shongwe (2024), este artículo se

enfoca más en el exceso de ceros y en la modelización conjunta de frecuencia y severidad, mientras que Marambakuyana y Shongwe se concentran en distribuciones compuestas y de mezcla para datos positivos con colas pesadas. Por otra parte, en contraste con *Ayuso-Gutiérrez et al. (2015)*, ambos artículos consideran datos con exceso de ceros, pero *Počuča et al. (2020)* incorpora una estructura de conglomerados latentes que permite capturar heterogeneidad entre grupos de asegurados.

Evaluación de aplicabilidad (escala 1–5): 4.5.

La metodología es altamente aplicable al proyecto porque trabaja directamente con reclamos de seguros y con exceso de ceros, dos elementos centrales de la variable `Cost_claims_year`. Sin embargo, no recibe 5 porque no aborda de forma específica la acumulación en el valor €900, por lo que habría que adaptar el enfoque o combinarlo con otro modelo.

Pregunta que le haría al autor: ¿Cómo podría adaptarse el modelo ZI-GCWM para incluir no solo inflación en cero, sino también una concentración adicional en un valor monetario específico como €900?

Resumen argumentativo: Lo que los autores intentan resolver es cómo modelar datos de seguros donde la frecuencia y la severidad de los reclamos no se comportan de manera homogénea para todos los asegurados. Para esto, extienden los modelos ponderados por conglomerados y proponen una versión cero inflada, llamada ZI-GCWM, que permite trabajar con datos donde existen muchos ceros provenientes de distintas fuentes. La idea central es que los datos pueden estar formados por grupos latentes con comportamientos diferentes, por lo que un único modelo global podría no capturar adecuadamente la relación entre las variables explicativas, la frecuencia de reclamos y la severidad. Para el proyecto, esta metodología es especialmente útil porque `Cost_claims_year` tiene una concentración importante en cero, lo cual puede interpretarse como ausencia de reclamos o ausencia de costo durante el periodo observado. Además, el enfoque por conglomerados puede ayudar a identificar grupos de observaciones con distintos patrones de riesgo. No obstante, como el proyecto también analiza el comportamiento alrededor del umbral de €900, sería necesario complementar este enfoque con una estrategia que permita estudiar ese punto específico de acumulación.

Delignette-Muller y Dutang (2015)

Nivel descriptivo

Título: *fitdistrplus: An R Package for Fitting Distributions*

Autores: Marie Laure Delignette-Muller y Christophe Dutang.

Año: 2015.

Nombre del tema: ajuste de distribuciones paramétricas en R mediante el paquete `fitdistrplus`.

Clasificación: Metodológica.

Se eligió esta etiqueta porque el artículo presenta una herramienta estadística en R para ajustar distribuciones a distintos tipos de datos. El paquete permite estimar parámetros, comparar distribuciones, generar gráficos de bondad de ajuste y utilizar criterios como AIC y BIC para evaluar cuál distribución describe mejor los datos.

Resumen en una oración: el artículo presenta el paquete `fitdistrplus` como una herramienta en R para ajustar y comparar distribuciones probabilísticas a datos observados.

Argumento central: los autores sostienen que ajustar una distribución a los datos no consiste únicamente en elegir una distribución y estimar sus parámetros, sino que requiere un proceso iterativo que incluye exploración gráfica, elección de distribuciones candidatas, estimación de parámetros y evaluación de la calidad del ajuste. Para esto, proponen el paquete `fitdistrplus`, que permite realizar este proceso de forma ordenada en R.

Problemas con el argumento o el tema: una limitación del artículo es que se concentra en el ajuste de distribuciones univariadas, por lo que no estudia directamente la relación entre la variable de severidad y variables explicativas como edad, tipo de vehículo o antigüedad de la licencia. Además, aunque el paquete permite comparar distribuciones, la decisión final no debe basarse únicamente en un criterio automático como AIC o BIC, sino también en la interpretación del problema y en el comportamiento visual de los datos.

Nivel analítico

Conexión con mi proyecto: este artículo se relaciona directamente con el proyecto porque el profesor recomendó utilizar el paquete `fitdistrplus` para analizar a qué distribución se ajusta mejor la variable `Cost_claims_year`. En lugar de asumir desde el inicio una distribución específica para los costos de reclamos, el paquete permite comparar varias distribuciones candidatas, observar gráficos de ajuste y utilizar criterios como AIC y BIC para respaldar la elección. Esto es útil especialmente para el análisis de los costos positivos y para estudiar si la variable presenta asimetría o cola derecha.

Lo que NO dice el autor: el artículo no propone un modelo específico para reclamos con acumulación en el valor 900 ni desarrolla una metodología particular para detectar umbrales monetarios. Tampoco resuelve por sí solo el problema de los ceros en `Cost_claims_year`; más bien, ofrece una herramienta general para ajustar distribuciones a datos observados.

Contraste con otra fuente: en comparación con Marambakuyana y Shongwe (2024), este artículo es más práctico y menos especializado. Mientras Marambakuyana y Shongwe analizan modelos compuestos y de mezcla para datos de seguros con colas pesadas, Delignette-Muller y Dutang (2015) ofrecen una herramienta concreta en R para ajustar distribuciones y comparar su bondad de ajuste. Por eso, este artículo puede usarse como base operativa para implementar una parte sencilla de la metodología, mientras que Marambakuyana y Shongwe funciona mejor como respaldo teórico para explicar por qué los costos de reclamos pueden requerir distribuciones flexibles.

Evaluación de aplicabilidad (escala 1–5): 5.

La aplicabilidad es muy alta porque el paquete `fitdistrplus` puede incorporarse directamente en el análisis del proyecto. Permite trabajar en R, comparar distribuciones candidatas, estimar parámetros y generar criterios de ajuste para justificar la selección de una distribución para los costos positivos de reclamos.

Pregunta que le haría al autor: ¿Cómo recomendaría utilizar `fitdistrplus` cuando una variable de costos tiene muchos ceros y, además, una posible concentración en un valor específico como €900?

Resumen argumentativo: Lo que los autores intentan resolver es la necesidad de contar con una herramienta práctica en R para ajustar distribuciones probabilísticas a datos reales. El artículo explica que este proceso no debe limitarse a aplicar una fórmula, sino que requiere explorar los datos, escoger distribuciones candidatas, estimar parámetros y evaluar la calidad del ajuste mediante gráficos y criterios estadísticos. Para esto, presentan el paquete `fitdistrplus`, el cual permite ajustar distribuciones mediante diferentes métodos, como máxima verosimilitud, emparejamiento de momentos, emparejamiento de cuantiles y criterios de bondad de ajuste. Para el proyecto, este artículo es especialmente útil porque permite justificar el uso de `fitdistrplus` como herramienta para estudiar la distribución de `Cost_claims_year`, principalmente en los valores positivos. En este sentido, no sería necesario afirmar que se aplicará un modelo de mezcla complejo, sino que se compararán distribuciones candidatas de manera exploratoria y metodológicamente respaldada.

6. Implementación de la retroalimentación

Las observaciones extendidas a partir de la revisión de la tercera bitácora se efectuaron en torno a cuatro ejes: ... En la presente entrega se procuró implementar los distintos puntos de mejora, por lo que se detalla a continuación la manera en que esto fue realizado, según los distintas áreas.

7. Relativo al trabajo en equipo

7.1. Rastro de decisiones

Durante la elaboración de la tercera bitácora, el equipo se vio en la necesidad de tomar una serie de decisiones con el objetivo de desarrollar óptimamente las tareas requeridas. Dichas decisiones atrevesaron varios ejes, los cuales se detallan a continuación en compañía de los párrafos explicativos correspondientes.

7.2. Diario de aprendizaje

La presente sección está diseñada para registrar los aprendizajes adquiridos durante la elaboración de la bitácora, en torno al proceso acumulativo del desarrollo del proyecto. Lo anterior a través de oraciones concisas que respondan a la siguiente pregunta: ¿Qué sabemos ahora que no sabíamos al entregar la segunda bitácora? Dichas oraciones proceden a detallarse como sigue:

- Durante esta etapa, se incorporó el uso de la librería `fitdistrplus` en R como apoyo para el análisis metodológico de la severidad de los siniestros. Esta herramienta permitió plantear una forma más ordenada de comparar posibles distribuciones para los costos positivos, utilizando criterios de ajuste que ayudan a justificar la selección del modelo más adecuado.
- Se fortaleció el concepto de distribución mixta. A partir de la identificación visual del histograma de la variable “`Cost_claims_year`”, se dividió esta variable en tres componentes: costos cero, costos medios y costos altos. Se aprendió a modelar la distribución de cada componente y su respectiva proporción por medio de gráficos y comparaciones del AIC de distintas distribuciones con el fin de seleccionar la que mejor se adaptaba a cada componente.

7.3. Audiencia del proyecto

Esta semana el equipo le diría a un actuario que se enfoca en el área de seguros para vehículos que

7.4. Registro del uso de IA

Se detalla a continuación el respectivo registro:

Herramienta: ChatGPT.

Prompt: Se solicitó apoyo (en varios prompts) para comprender cómo utilizar la librería `fitdistrplus` en R dentro de la metodología del proyecto, especialmente para analizar posibles distribuciones asociadas a la severidad de los siniestros.

Respuesta de la IA: A modo de resumen de todo el chat, la IA explicó que `fitdistrplus` permite ajustar y comparar distintas distribuciones de probabilidad a datos positivos, como los costos de siniestros. También ayudó a relacionar el uso de esta librería con una referencia bibliográfica, para justificar metodológicamente la selección de distribuciones mediante criterios de ajuste.

Evaluación: La respuesta fue útil porque permitió entender mejor el propósito de la librería y cómo integrarla dentro de la metodología sin presentar el procedimiento como una decisión arbitraria.

Modificaciones: Se adaptó la explicación al contexto del proyecto, enfocándola en el análisis de severidad y en la comparación de distribuciones para los costos positivos de los siniestros.

Aprendizaje: Se comprendió que el uso de una librería estadística debe estar acompañado de una justificación teórica y metodológica, de modo que las decisiones de modelación puedan explicarse con mayor claridad.

7.5. Registro del trabajo en equipo

La siguiente tabla contiene los aportes de los integrantes, de acuerdo a las secciones en las que cada uno se desempeñó:

Nombre	Contribuciones
Alexandra González Bermúdez	Corrección en base a la retroalimentación Arco narrativo del proyecto La imagen que cuenta la historia Parte de escritura Registro del trabajo en equipo Diario de aprendizaje Construcción de fichas de resultados
Nombre	Contribuciones
Emily Estefanía Mora Contreras	Análisis de la modelación Carga automática de datos Análisis descriptivo completo Propuesta metodológica Parte de reflexión: UVE de Gowin Diario de aprendizaje Construcción de fichas de resultados Construcción de fichas de literatura
Nombre	Contribuciones
Daniela Prado Vargas	Análisis de la modelación Ordenamiento de los elementos del reporte Rastro de decisiones Diario de aprendizaje Construcción de fichas de resultados
Nombre	Contribuciones
José Miguel Rodríguez Gómez	Organización de las tareas de acuerdo a su dificultad Análisis de la modelación Audiencia del proyecto Diario de aprendizaje Construcción de fichas de resultados

Referencias

- Delignette-Muller, M. L., & Dutang, C. (2015). fitdistrplus: An R Package for Fitting Distributions. *Journal of Statistical Software*, 64(4), 1-34. <https://www.jstatsoft.org/article/view/v064i04>
- Marambakuyana, W. A., & Shongwe, S. C. (2024). Composite and mixture distributions for heavy-tailed data—An application to insurance claims. *Mathematics*, 12(2), 335. <https://www.mdpi.com/2227-7390/12/2/335>
- Párraga, A. E. A., & Giler, S. L. (2024). Accidentes de tránsito, un problema de salud pública: revisión sistemática. *Revista Científica Arbitrada Multidisciplinaria PENTACIENCIAS*, 6(3), 313-332. https://www.researchgate.net/publication/380524505_Accidentes_de_transito_un_problema_de_salud_publica_revision_sistemica
- Počuča, N., Jevtić, P., McNicholas, P. D., & Miljkovic, T. (2020). Modeling frequency and severity of claims with the zero-inflated generalized cluster-weighted models. *Insurance: Mathematics and Economics*, 94, 79-93. <https://arxiv.org/pdf/1812.11829>