

Bitácora 4

Universidad de Costa Rica

Escuela de Matemática

Departamento de Matemática y Ciencias Actuariales

Proyecto de Investigación

**Análisis del cambio de la probabilidad de decremento
 ${}_nq_x^{(c)}$ para grupos etarios por causas de muerte de
acuerdo a la clasificación ICD-10 en países de
Centroamérica [2015, 2018].**

Integrantes

Sebastián Miranda Ramírez C4H274

Benjamín Gutiérrez Padua C4F813

Kevin David Calderón Martínez C4D511

Gabriel de Jesús Chaves Esquivel C4E273

Profesor

Maikol Solís Chacón

2026

1. Parte de planificación

Parte iterativa

En este apartado nos vamos a centrar en analizar las variaciones obtenidas en los resultados frecuentista y bayesiano con mayor detenimiento dado que en anteriores avances se indagó en las particularidades de las dinámicas demográficas que se manifiestan, tales como: la concentración absoluta de la $q_{x,t}^{(c)}$ en edades adultas debido a causas externas de mortalidad auspiciado principalmente por la clasificación de agresiones o por otro lado de las vinculadas a la causa perinatal en edades tempranas, y para edades avanzadas el incremento de esta probabilidad en edades avanzadas respecto a causas de enfermedades del sistema circulatorio. Posteriormente se concluirá con las 4 fichas de resultados correspondientes a los análisis acumulados.

De esta manera vamos a analizar las diferencias absolutas simétricas entre las estimaciones de $q_{x,t}^{(c)}$ por los enfoques bayesiano y frecuentista. En este sentido, denotar q_F y q_B las estimaciones de $q_{x,t}^{(c)}$ respectivamente para el enfoque frecuentista y bayesiano, luego considerar que esta notación abrevia una combinación de grupo etario x , año calendario t , país p , sexo s , y causa de muerte c , pero se resume su notación de este modo, así considerar:

$$DRAS_{x,t}^{(c)} = \frac{2 \left| q_{B,x,t}^{(c)} - q_{F,x,t}^{(c)} \right|}{q_{B,x,t}^{(c)} + q_{F,x,t}^{(c)}}.$$

Esta métrica nos permite medir la Diferencia Relativa Absoluta Simétrica DRAS para una causa (c) cercano a 0 indica valores de coincidencia, cercanos a 2 de discrepancia fuerte entre bloques $q_{x,t}^{(c)}$. La aplicación de esta métrica se resume en resultados en Tabla 1 .

Tabla 1: Causas ICD-10 con mayor discrepancia entre enfoque clásico y bayesiano

Tabla 1: Causas ICD-10 con mayor discrepancia entre enfoque clásico y bayesiano

cau- sa	causa_grupo	n_cel- das	me- dia- na_drasp95	me- dia- na_drasp95	media- dif_abs_q	pct_q_cla- sico_ce- ro
III	Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y ciertos trastornos de la inmunidad	960	0.1498	2	2.6e-06	18.3
IV	Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas	960	0.0130	2	1.8e-06	5.6
V- VIII	Trastornos mentales, enfermedades del sistema nervioso y de los órganos de los sentidos	960	0.0297	2	2.2e-06	6.0
XI	Enfermedades del sistema digestivo	960	0.0153	2	1.8e-06	5.1

cau- sa	causa_grupo	n_cel- das	me- dia- na_drasp95	me- dia- na_drasp95	media- dif_abs_q	pct_q_cla- sico_cero
XII	Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo	960	0.1414	2	1.3e-06	36.4
XIII	Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo	960	0.1622	2	1.9e-06	27.1
XIV	Enfermedades del sistema genitourinario	960	0.0166	2	1.6e-06	10.8
XV	Embarazo, parto y puerperio	216	0.2972	2	3.7e-06	32.4

De esta métrica lo que desprendemos es el siguiente análisis, se ha tabulado n_{celdas} como la cardinalidad del conjunto $n_{\text{celdas}}^{(c)}$, es decir $\|\{(x, t) : q_{B,x,t}^{(c)} \text{ y } q_{F,x,t}^{(c)} \text{ existen}\}\|$ luego note que la columna $median(DRAS_{x,t}^{(c)})$ lo que realizamos fue fijar la causa (c) y dejar variar x, t, p, s aquellas causas de mayor mediana son donde el enfoque bayesiano modificó más la estimación relativa donde vemos que se manifiesta en una mayor medida para la causa *III*, pero probabilísticamente notamos que el numerador de $DRAS_{x,t}^{(c)}$ es bastante pequeño acotado por $2.62 * 10^{-6}$ lo cual significa que en sí mismo es un conjunto de medida 0. Y el porcentaje de ceros $pct_q_clasico_cero$ desde el enfoque clásico permite explicar esta discrepancia debido a que recordemos que la estimación bayesiana posterior de la fuerza instantánea de mortalidad para la causa (c) dadas las observaciones de defunciones viene se conjuga por una Gamma de soporte positivo, es decir la intensidad posterior de mortalidad puede quedar muy pequeña pero no exactamente en cero, en particular cuando la población en exposición es grande.

En complemento a este análisis es adecuado comprender la distancia de variación total entre composiciones causales Para esto definimos D_π que permite comparar el vector completo $(\pi^{(1)}, \pi^{(2)}, \dots, \pi^{(r)})$ dentro de una misma celda (delimitación por grupo etario x , año calendario t , país p , sexo s , y causa de muerte c) de esta manera buscamos ver si el enfoque bayesiano cambia la forma en que se reparte el total de decrementos por causas. Así definir $D_{\pi,x,t} = \frac{1}{2} \sum_{c=1}^r |\pi_{B,x,t}^{(c)} - \pi_{F,x,t}^{(c)}|$. Donde π_{B} , π_{F} representan respetivamente la composición causal Bayesiana y la Frecuentista. La lectura de esta métrica es bastante directa valores cercanos a 0 indican una baja variabilidad y aquellos otros más altos justo una mayor diferencia. Vease en Tabla 2

Tabla 2: Celdas con mayor diferencia de composición causal entre enfoques

				q_to-	q_to-	cau-	cau-	misma_cau-
pais	se-	gru-		tal_cla-	tal_baye-	sa_dom_cla-	sa_dom_ba-	sa_domi-
	anio	xo	po_edadd_pi	sico	siano	sico	yesiano	nante
Be-	2017	Mu-	5-9	0.43670	0.0001671	0.0003836	XX	XX
lice		jer						Sí

Tabla 2: Celdas con mayor diferencia de composición causal entre enfoques

país	año	sexo	grupo_edad	$q_{total_clasico}$	$q_{total_bayesiano}$	causa_dominante_sico	causa_dominante_bayesiano	misma_causa_dominante
Belice	2016	Mujer	10-14	0.38280.0001562	0.0003808	II	XX	No
Belice	2018	Mujer	5-9	0.36410.0002242	0.0004438	XX	XX	Sí
Belice	2017	Hombr	95+	0.31130.7019596	0.3829855	IX	IX	Sí
Belice	2016	Hombr	5-9	0.27890.0002642	0.0004713	V-VIII	V-VIII	Sí
Belice	2015	Mujer	95+	0.26670.7106158	0.4559879	IX	IX	Sí
Belice	2017	Mujer	10-14	0.26500.0002615	0.0004791	XX	XX	Sí
Belice	2015	Mujer	10-14	0.26350.0002595	0.0004780	XX	XX	Sí

En Tabla 2 se observa que las mayores distancias de variación total entre composiciones causales se concentran en Belice. Este resultado es metodológicamente coherente, ya que Belice tiene una menor exposición poblacional relativa dentro del conjunto centroamericano, lo cual hace que sus conteos por causa sean más sensibles a variaciones pequeñas. En este contexto, el enfoque clásico puede asignar probabilidades exactamente nulas cuando no se observan defunciones por una causa específica, mientras que el enfoque bayesiano, por el suavizamiento Empirical Bayes, tiende a conservar probabilidades positivas aunque cercanas a cero.

La mayor diferencia aparece en mujeres de Belice, grupo 5-9, año 2017, con $D_\pi = 0.4367$. Esto no significa que una única causa explique por sí sola el 43.67% de diferencia, sino que aproximadamente esa proporción de la masa de composición causal tendría que redistribuirse para pasar del vector frecuentista al vector bayesiano. En esa celda, ambos enfoques mantienen como causa dominante a *XX*, correspondiente a causas externas de mortalidad, por lo que la discrepancia no cambia la causa principal, pero sí modifica la distribución relativa del resto de causas.

El segundo caso, Belice, mujeres de 10-14 años en 2016, es más relevante desde el punto de vista interpretativo, porque la causa dominante cambia de *II* en el enfoque clásico a *XX* en el enfoque bayesiano. En este caso, la distancia $D_\pi = 0.3828$ sí indica una modificación sustantiva en la lectura causal de la celda. Esta diferencia puede explicarse por la combinación de baja exposición, conteos pequeños y suavizamiento bayesiano, factores que hacen que pequeñas diferencias absolutas en $q_{x,t}^{(c)}$ produzcan cambios visibles en la composición causal $\pi_{x,t}^{(c)}$.

Por tanto, esta tabla complementa el análisis basado en *DRAS*: mientras *DRAS* mostraba diferencias causa por causa en las probabilidades absolutas $q_{x,t}^{(c)}$, la distancia D_π permite evaluar si esas diferencias alteran la interpretación del reparto causal dentro de cada celda. En general, las mayores discrepancias no parecen responder a cambios regionales amplios, sino a celdas pequeñas y sensibles, principalmente en Belice.

Fichas de resultados parte iterativa

Enfoque frecuentista

Nivel descriptivo

Enfoque frecuentista

Nivel descriptivo

Titular:

Discrepancias relativas entre enfoques surgen principalmente por ceros clásicos.

Nombre del hallazgo/resultado

Diferencia relativa absoluta simétrica entre estimaciones clásicas y bayesianas de $q_{x,t}^{(c)}$.

Resumen en una oración

Las mayores discrepancias relativas aparecen en causas con alta presencia de celdas clásicas iguales a cero.

Método o análisis que lo produjo

Se compararon las estimaciones finales de $q_{x,t}^{(c)}$ obtenidas mediante el enfoque clásico y el enfoque bayesiano. Para cada causa (c) , se calculó la Diferencia Relativa Absoluta Simétrica,

$$DRAS_{x,t}^{(c)} = \frac{2 |q_{B,x,t}^{(c)} - q_{F,x,t}^{(c)}|}{q_{B,x,t}^{(c)} + q_{F,x,t}^{(c)}}.$$

Posteriormente, para cada causa se resumió la distribución de esta métrica mediante la mediana y el percentil 95. Además, se calculó la mediana de la diferencia absoluta $|q_B - q_F|$ y el porcentaje de celdas donde la estimación clásica fue exactamente cero.

Evidencia

Como se observa en Tabla 1, varias causas presentan $P95(DRAS) = 2$, lo cual indica discrepancias relativas máximas en la cola superior de las celdas comparadas. Sin embargo, la mediana de $|q_B - q_F|$ se mantiene en valores muy pequeños, por ejemplo del orden de 2.62×10^{-6} para la causa III. Esto muestra que la separación entre enfoques puede ser grande en términos relativos, pero baja en escala absoluta de probabilidad, lo que indica que la diferencia es en un conjunto de medida 0.

Nivel analítico

Conexión con pregunta de investigación

Este resultado se conecta directamente con la pregunta de investigación, porque permite evaluar si las probabilidades de decremento $q_{x,t}^{(c)}$ cambian de forma sustantiva al pasar del enfoque clásico al bayesiano. En términos generales, la comparación sugiere que ambos enfoques producen lecturas similares en escala absoluta, aunque difieren en celdas específicas donde el enfoque clásico asigna probabilidad nula.

Contraste con la literatura

El contraste metodológico más adecuado es entre la estimación clásica por máxima verosimilitud y el suavizamiento Empirical Bayes bajo el modelo Poisson-Gamma. En el enfoque clásico, si una celda no registra muertes por una causa, entonces $\hat{\mu}^{(c)} = D^{(c)}|E = 0$, y por tanto también se obtiene $q_F^{(c)} = 0$. En cambio, en el enfoque Empirical Bayes, la intensidad posterior se obtiene desde una distribución Gamma de soporte positivo; por ello, incluso cuando $D^{(c)} = 0$, la estimación bayesiana puede producir una probabilidad positiva, aunque muy cercana a cero. Esta diferencia es consistente con la idea de estabilización bayesiana de tasas en celdas con conteos bajos o nulos.

Lo que NO explica este resultado

Este resultado no demuestra que un enfoque sea mejor que el otro. La métrica DRAS solo cuantifica discrepancias entre estimaciones finales, pero no mide error frente a un valor verdadero desconocido. Tampoco explica por sí sola las causas demográficas o epidemiológicas detrás de las diferencias observadas.

Implicación para el siguiente paso

El siguiente paso es complementar esta comparación de $q_{x,t}^{(c)}$ con una comparación de la composición causal $\pi_{x,t}^{(c)}$. Esto permitirá evaluar si las pequeñas diferencias absolutas entre enfoques modifican o no la interpretación sustantiva sobre la participación relativa de cada causa dentro del total de decrementos estimados.

Nivel descriptivo

Titular

Belice concentra las mayores diferencias de composición causal.

Nombre del hallazgo/resultado

Distancia de variación total entre composiciones causales clásica y bayesiana.

Resumen en una oración

Las mayores diferencias de composición causal aparecen en celdas pequeñas de Belice.

Método o análisis que lo produjo

Se calculó la composición causal condicionada al fallecimiento para cada enfoque,

$$\pi_{x,t}^{(c)} = \frac{q_{x,t}^{(c)}}{\sum_{j=1}^r q_{x,t}^{(j)}},$$

y luego se comparó el vector completo de composiciones causales mediante la distancia de variación total,

$$D_{\pi,x,t} = \frac{1}{2} \sum_{c=1}^r \left| \pi_{B,x,t}^{(c)} - \pi_{F,x,t}^{(c)} \right|.$$

Esta métrica resume cuánto debe redistribuirse la composición causal frecuentista para coincidir con la composición causal bayesiana dentro de una misma celda.

Evidencia

Como se observa en Tabla 2, las mayores diferencias se concentran en Belice. La celda con mayor distancia corresponde a mujeres de Belice, grupo 5-9, año 2017, con $D_\pi = 0.4367$. En este caso, ambos enfoques mantienen como causa dominante a XX , correspondiente a causas externas de mortalidad. El segundo caso corresponde a mujeres de Belice, grupo 10-14, año 2016, con $D_\pi = 0.3828$, donde la causa dominante cambia de II en el enfoque clásico a XX en el enfoque bayesiano.

Nivel analítico

Conexión con pregunta de investigación

Este resultado permite evaluar si las diferencias entre el enfoque clásico y el bayesiano modifican la interpretación de la mortalidad por causa, no solo en términos de magnitud absoluta de $q_{x,t}^{(c)}$, sino también en términos de reparto causal. La métrica $D_{\pi,x,t}$ complementa el análisis basado en $DRAS$, porque muestra si las diferencias causa por causa alteran el vector completo de participación relativa entre causas.

Contraste con la literatura

El resultado es coherente con la lógica del enfoque Empirical Bayes Poisson-Gamma utilizado en la estimación bayesiana. En celdas con conteos bajos o nulos, el enfoque clásico puede producir probabilidades exactamente iguales a cero, mientras que el enfoque bayesiano tiende a suavizar la estimación usando información colectiva de la causa y del país. Por ello, en celdas con menor exposición o menor frecuencia de defunciones, pequeñas diferencias absolutas en $q_{x,t}^{(c)}$ pueden traducirse en diferencias visibles en la composición causal $\pi_{x,t}^{(c)}$.

Lo que NO explica este resultado

Este resultado no demuestra que el enfoque bayesiano sea mejor que el frecuentista, ni permite afirmar que una de las dos estimaciones sea la verdadera. Tampoco explica por qué causas externas aparecen como dominantes en ciertas celdas de Belice. La tabla solo muestra diferencias en la asignación relativa de la probabilidad de decremento entre causas, no una explicación de dinámica demográfica del proceso.

Implicación para el siguiente paso

El siguiente paso es sistematizar las diferencias halladas entre el enfoque bayesiano y frecuentista desde un resumen ejecutivo de resultados y determinar que ambas metodologías proporcionan diferentes herramientas de acción para ciertos problemas, y esencialmente corresponderá de las características propias del mismo una decisión del investigador por cuál metodología usar.

Enfoque bayesiano

Fichas de resultados

Titular:

Los tumores cuentan con mayor peso relativo en la composición causal femenina en edades adultas de Panamá

Nombre del hallazgo/resultado:

Diferencia por sexo considerable en la composición causal condicionada al fallecimiento por tumores.

Resumen en una oración:

En Panamá, la participación relativa de los tumores dentro del total de fallecimiento es más alta en mujeres que en hombres en edades adultas.

Método o análisis que lo produjo:

Composición causal condicionada al fallecimiento, calculada como la razón entre la probabilidad de decremento por tumores y la suma de las probabilidades de decremento por todas las causas.

Evidencia:

En el panel de tumores para mujeres se observa una participación relativa cercana o superior al 30 % en varios grupos de edad adulta, con valores especialmente altos alrededor de 40-54 años. En hombres, la participación por tumores también es importante, pero se distribuye de forma más moderada y alcanza sus mayores valores en edades más avanzadas.

Conexión con la pregunta de investigación:

Este resultado nos muestra que la variabilidad de la probabilidad de decremento por causa también depende del sexo, encontrando una fuerte variación, en específico, entre la probabilidad de decremento por tumores en adultos en Panamá, en donde estos ocupan un mayor valor dentro de la composición causal de las mujeres.

Contraste con la literatura:

Este resultado puede contrastarse principalmente con Calazans y Queiroz (2020), quienes estudian perfiles de mortalidad adulta por causa en países latinoamericanos y muestran que la estructura de la mortalidad por causa no es homogénea entre países, edades y sexos. En ese sentido, el mayor peso relativo de los tumores dentro de los fallecimientos femeninos en Panamá no debe interpretarse como un patrón universal, sino una característica local de la composición causal.

Lo que NO explica este resultado:

Este gráfico no permite afirmar que las mujeres tengan una probabilidad absoluta mayor de morir por tumores que los hombres.

Implicación para el siguiente paso:

Conviene contrastar este resultado con el gráfico de probabilidad absoluta de decremento por tumores. Si allí también las mujeres presentan valores mayores en esos grupos etarios, entonces sí podría hablarse de una mayor mortalidad absoluta por tumores.

Titular:

La mayor participación relativa de tumores en mujeres no implica mayor probabilidad absoluta de decremento

Nombre del hallazgo/resultado:

Diferencia entre composición causal condicionada y probabilidad absoluta de decremento por sexo en Panamá.

Resumen en una oración:

Aunque los tumores pesan más dentro de la composición causal femenina en varios grupos adultos, la probabilidad absoluta de decremento por tumores y otras causas crónicas tiende a ser mayor en hombres en edades avanzadas.

Método o análisis que lo produjo:

El resultado se obtuvo a partir del enfoque bayesiano, usando como estimación principal la media posterior de la probabilidad de decremento por causa. Para cada celda definida por grupo etario, año, país, sexo y causa, esta cantidad se escribe como

$$q_{x,t,p,s}^{(c),*} \approx E\left(Q_{x,t,p,s}^{(c)} \mid \text{datos}\right).$$

Primero se analizó la composición causal condicionada al fallecimiento, definida como

$$\pi_{x,t,p,s}^{(c),*} = \frac{q_{x,t,p,s}^{(c),*}}{\sum_j q_{x,t,p,s}^{(j),*}}.$$

Esta medida indica qué proporción del total de fallecimientos estimados corresponde a la causa (c), una vez que se condiciona a que ocurrió un fallecimiento en la celda. Luego se comparó esa lectura con la probabilidad absoluta de decremento por causa,

$$100 \times q_{x,t,p,s}^{(c),*}.$$

Esta segunda medida expresa, en porcentaje, la probabilidad estimada de morir por una causa específica dentro de toda la población expuesta de la celda.

Evidencia:

En el gráfico de composición condicionada, los tumores presentan una participación relativa mayor en mujeres que en hombres en varios grupos etarios adultos de Panamá. Sin embargo, al observar el gráfico de probabilidad absoluta de decremento, la lectura cambia: en edades avanzadas, los hombres muestran valores más altos que las mujeres para las principales causas crónicas, especialmente enfermedades del sistema circulatorio y enfermedades del sistema respiratorio. Para tumores, la diferencia por sexo es menos marcada que en circulatorias y respiratorias, pero en los grupos de mayor edad los hombres también tienden a presentar una probabilidad absoluta mayor. Esto muestra que una causa puede ocupar más peso relativo dentro de los fallecimientos femeninos sin que eso implique necesariamente una mayor probabilidad absoluta de muerte en mujeres.

Conexión con la pregunta de investigación:

Este resultado responde directamente a la pregunta del proyecto porque muestra que la variabilidad de la probabilidad de decremento por causa no depende únicamente de la edad o del año, sino también del sexo y de la forma en que se mida el fenómeno.

Contraste con la literatura:

Este hallazgo se relaciona con Goerlich Gisbert (2012), porque su trabajo muestra que la mortalidad por causa debe analizarse diferenciando edad, sexo y causa dentro de un marco de decrementos múltiples. También se conecta con Calazans y Queiroz (2020), quienes señalan que los perfiles de mortalidad adulta por causa en América Latina no son homogéneos entre países ni grupos poblacionales. En este caso, el resultado de Panamá refuerza esa idea: la lectura cambia según se observe la composición causal condicionada o la probabilidad absoluta de decremento. Además, Román Sánchez, Sánchez Pérez y Mendieta Zacarias (2018) sirven como antecedente latinoamericano de que las tablas de decrementos múltiples permiten estudiar diferencias por edad, sexo y causa de muerte.

Lo que NO explica este resultado:

Este resultado no explica por qué los hombres presentan mayores probabilidades absolutas de decremento en edades avanzadas, ni permite atribuir las diferencias observadas a factores clínicos, sociales o de acceso al sistema de salud. Tampoco prueba que las diferencias entre 2015 y 2018 sean estadísticamente significativas, porque el gráfico no muestra intervalos de incertidumbre ni pruebas formales. Además, el análisis se limita a Panamá y a las causas seleccionadas en la visualización, por lo que no debe generalizarse automáticamente al resto de Centroamérica.

Implicación para el siguiente paso:

El siguiente paso es contrastar este resultado bayesiano con el enfoque clásico o frecuentista. Si el patrón observado en Panamá también aparece en las estimaciones clásicas, entonces el hallazgo tendría mayor consistencia metodológica. En cambio, si el patrón cambia mucho entre enfoques, habría que revisar si la diferencia se debe a la estabilización bayesiana, a conteos pequeños, a baja exposición en ciertas celdas o a variación propia de los datos observados. También conviene complementar la lectura bayesiana con intervalos posteriores de incertidumbre, para no afirmar como diferencia clara algo que visualmente parece distinto pero podría estar dentro de la variabilidad posterior.

2. Parte de escritura

2.1.1 Retroalimentación de la Bitácora 3

En aras de perfeccionar la escritura realizada en la Bitácora 3, se procede a mencionar las retroalimentaciones realizadas tras su revisión, esto con el fin de ofrecer una versión final de la investigación pulida.

En primera instancia, se corrigió el orden de los subtítulos comprendidos entre las secciones 1.2.1 y 1.2.4, ya que la secuencia anterior no seguía una estructura adecuada de titulación. En segundo lugar, se atendieron distintos errores de codificación en subtítulos y fórmulas, identificados como “typos”. Entre ellos destaca el error presente en la fórmula de la página 72, así como dos errores adicionales en la sección 1.2.5.2, vinculados con la titulación de la página 38. Además, se corrigió otro typo ubicado en la página 53, dentro de una ficha de resultado, específicamente en la sección “Lo que NO explica el resultado”. Finalmente, se añadió la cita que había sido omitida en esa misma página, dentro de la sección “Contraste con la literatura” de la Bitácora anterior. En conjunto, estas modificaciones fortalecen la coherencia formal del documento y reducen errores que podían afectar la lectura o la interpretación metodológica del trabajo.

También en la parte 3 de Escritura de la Bitácora anterior, se propone una nueva redacción para mejorar la estructurada anteriormente. De esta forma, se añade también a la corrección.

2.1.2 Corrección de Escritura

Propuesta Metodológica (Inciso 1.2)

A continuación, se reescribe la Bitácora anterior, tomando en cuenta las correcciones anteriores, empezando con definir los puntos 1.2.3 y 1.2.4 de la propuesta metodológica. De esta forma, hay correcta enumeración de subtítulos y detalles de la implementación metodológica en R:

Implementación Inicial (Inciso 1.2.2)

Para probar la metodología propuesta, se elaboró un programa maqueta en R. Este permitió cargar la base depurada, revisar que las defunciones fueran no negativas y que la exposición poblacional fuera positiva. La base se trabajó en formato largo, donde cada fila representa una celda definida por país, sexo, año, grupo etario y causa de muerte.

En primer lugar, se implementó el enfoque frecuentista. Para cada celda se calculó la intensidad específica por causa como el cociente entre defunciones y exposición. Luego, se obtuvo la intensidad total sumando las intensidades de todas las causas competidoras. Con estas cantidades se estimó la probabilidad local de decremento por causa bajo el supuesto de fuerza constante

dentro de la celda anual. La maqueta es actualmente el script `04_enfoque_clasico.R` (Ver repositorio para más detalles) que contiene la implementación total del enfoque clásico. Posteriormente, se incorporó una primera versión del enfoque bayesiano. En este caso, las defunciones se mantuvieron bajo un modelo Poisson, pero la intensidad de mortalidad se trató como una variable aleatoria con distribución Gamma. A partir de esta estructura Poisson-Gamma, se simulaban intensidades posteriores mediante `rgamma()` y, en cada simulación, se transformaron esas intensidades en probabilidades de decremento. La estimación bayesiana se obtuvo como el promedio de las probabilidades simuladas. Tras su implementación completa, la maqueta es actualmente el script `06_enfoque_bayesiano.R` y `07_enfoque_bayesiano_simulaciones.R`. (Ver repositorio para más detalles).

Esta maqueta fue útil para probar funciones, revisar parámetros y detectar errores conceptuales antes de consolidar el modelo final. En particular, permitió identificar problemas en el tratamiento de causas con dominios específicos, como embarazo, parto y puerperio, y afecciones originadas en el periodo perinatal. A partir de esto, se incorporó la distinción entre ceros observacionales y ceros estructurales.

Validación del modelo y criterios de revisión (Inciso 1.2.3)

La validación del modelo se planteó con el objetivo de revisar si las estimaciones obtenidas eran coherentes con la estructura de los datos y con la interpretación actuarial del proyecto. Dado que se trabaja con conteos de defunciones y exposición poblacional, la revisión se centró principalmente en modelos de conteo, intensidades de mortalidad y probabilidades de decremento. Esta parte del trabajo consiste en toda la implementación de la metodología en la base de datos mediante los scripts presentes en la carpeta código del repositorio.

En el enfoque frecuentista, se revisó la adecuación del modelo Poisson para representar las defunciones observadas. Para ello, se consideró la posible presencia de sobredispersión y la estabilidad de las intensidades estimadas. Esta revisión es importante porque las celdas con baja exposición o pocos fallecimientos pueden producir estimaciones clásicas muy variables. Tras concluir estabilidad en las intensidades, se procedió a calcular los decrementos; como se dijo en la sección de la implementación inicial, el cálculo de las probabilidades de decremento para el enfoque clásico se encuentra en el script `04_enfoque_clasico.R`, posterior a ello, se procede con el análisis de este enfoque, utilizando el análisis de las observaciones y el cálculo de las composiciones causales, además de la creación de los gráficos. Este procedimiento computacional se encuentra disponible en el script `05_analisis_clasico.R` (Ver repositorio para más información).

En el enfoque bayesiano, la validación se enfocó en las simulaciones posteriores de las intensidades y de las probabilidades de decremento. Como el procedimiento utiliza una simulación directa desde distribuciones Gamma posteriores, no corresponde aplicar diagnósticos como trazas, autocorrelación o $\hat{R}$. En su lugar, se revisó la estabilidad de los promedios simulados, la precisión utilizando la Ley de los Grandes Números y la coherencia de los intervalos posteriores.

Análogamente, la creación de gráficos y análisis del enfoque bayesiano se encuentra disponible en el script `08_analisis_bayesiano.R` (Ver repositorio para más información).

Además, se compararon las estimaciones clásicas y bayesianas para observar en qué celdas ambos enfoques producían resultados similares y en cuáles difieren. Se espera que las diferencias sean menores cuando hay alta exposición y suficientes defunciones, y más visibles en celdas con poca información. Esta comparación no busca declarar un enfoque superior, sino entender cómo cambia la estimación al incorporar información colectiva mediante el enfoque bayesiano. Esta información se encuentra disponible en el script `09_comparacion_enfoques.R` (Ver repositorio para más información).

Finalmente, se revisó la coherencia sustantiva de los resultados. Por ejemplo, se espera que las afecciones perinatales se concentren en edades tempranas, que las causas externas tengan mayor peso en edades jóvenes y que enfermedades crónicas como tumores, circulatorias y respiratorias aumentan su relevancia en edades adultas y avanzadas, y en efecto, ocurre lo esperado.

Fichas de Resultados (Inciso 1.3)

Seguidamente, se reescribe la ficha en donde hubo un error de citación y un typo con la sección “Lo que NO dice el autor”:

Titular:

Nicaragua exhibe una composición causal más fragmentada que Costa Rica.

Nombre del hallazgo/resultado:

Comparación de la composición causal por edad entre Costa Rica y Nicaragua bajo el enfoque clásico.

Resumen en una oración:

La composición causal de Nicaragua se distribuye más entre causas residuales que la de Costa Rica, especialmente en varios grupos etarios adultos.

Método o análisis que lo produjo:

El resultado se obtuvo a partir del enfoque clásico de estimación de la probabilidad local de decremento por causa. Para cada celda definida por grupo etario, año, país, sexo y causa, se estimó primero:

$${}_1\hat{q}_{x,t,p,s}^{(c)} = \frac{\hat{\mu}_{x,t,p,s}^{(c)}}{\hat{\mu}_{x,t,p,s}^{(\tau)}} \left(1 - e^{-\hat{\mu}_{x,t,p,s}^{(\tau)}} \right),$$

donde la intensidad total de salida del estado vivo se define como:

$$\hat{\mu}_{x,t,p,s}^{(\tau)} = \sum_{j=1}^r \hat{\mu}_{x,t,p,s}^{(j)}.$$

A partir de estas probabilidades se construyó la composición causal condicionada al fallecimiento:

$$\hat{\pi}_{x,t,p,s}^{(c)} = \frac{{}_1\hat{q}_{x,t,p,s}^{(c)}}{\sum_{j=1}^r {}_1\hat{q}_{x,t,p,s}^{(j)}}.$$

Esta cantidad no mide el riesgo absoluto de morir por una causa, sino la participación relativa de esa causa dentro del total de decrementos estimados para una misma celda demográfica. Para resumir la visualización por grupo etario, se promedió la composición causal sobre las combinaciones de año y sexo consideradas:

$$\bar{\pi}_{x,p}^{(c)} = \frac{1}{|\mathcal{A}|} \sum_{(t,s) \in \mathcal{A}} \hat{\pi}_{x,t,p,s}^{(c)},$$

donde $\mathcal{A}$ representa el conjunto de combinaciones de año y sexo incluidas en el análisis.

Evidencia:

La evidencia principal corresponde a las visualizaciones de composición causal por edad para Costa Rica y Nicaragua. En la Figura 15 se observa que Costa Rica presenta una participación persistente de la causa II, correspondiente a tumores, junto con una presencia creciente de la causa IX, asociada a enfermedades del sistema circulatorio. En la Figura 16, para Nicaragua, las causas seleccionadas explican una proporción conjunta menor en varios grupos etarios. Esta lectura se complementa con la Figura 17, donde se incluyen todas las causas disponibles y cada barra acumula el 100 % de la composición causal:

$$\sum_{c=1}^r \bar{\pi}_{x,p}^{(c)} = 1.$$

La comparación entre el gráfico parcial y el gráfico completo muestra que la menor participación conjunta de las causas principales en Nicaragua no se debe necesariamente al dominio de una única causa omitida, sino a una mayor dispersión entre causas residuales.

Nivel analítico

Conexión con la pregunta de investigación:

Este resultado se conecta directamente con la pregunta de investigación porque permite estudiar patrones de variabilidad en la probabilidad de decremento por causa desde una perspectiva relativa. Mientras ${}_1\hat{q}_{x,t,p,s}^{(c)}$ mide la magnitud local del decremento por una causa específica, $\hat{\pi}_{x,t,p,s}^{(c)}$ permite analizar cómo se reparte causalmente el total de decrementos dentro de cada grupo etario, país, sexo y año.

En el caso de Costa Rica, la composición causal parece más concentrada en un conjunto relativamente estable de causas principales, especialmente tumores, enfermedades circulatorias y enfermedades respiratorias. En cambio, para Nicaragua, la visualización completa sugiere una estructura más fragmentada en varios intervalos de edad, con mayor participación de causas no incluidas entre las cuatro principales del gráfico resumido. Esto indica que los patrones de decremento por causa no solo varían en magnitud, sino también en la forma en que se distribuye internamente la estructura causal de la mortalidad.

Contraste con la literatura:

El resultado es coherente con el marco general de decrementos múltiples utilizado por Goerlich Gisbert (2012), quien analiza la mortalidad por causa dentro de una estructura de tabla de vida. La conexión principal no está en que ambos trabajos estimen exactamente la misma cantidad, sino en que ambos interpretan las causas de muerte como salidas competitivas dentro de una estructura de mortalidad.

Goerlich Gisbert (2012) señala que las probabilidades derivadas de tablas de decrementos múltiples informan sobre la distribución del patrón de mortalidad por causas y edades, pero no directamente sobre el nivel de riesgo al que está sometida la población. Esta distinción es clave para interpretar el presente resultado: $\hat{\pi}_{x,t,p,s}^{(c)}$ no describe el riesgo absoluto de fallecer por la causa c , sino la proporción que ocupa esa causa dentro del total de decrementos estimados para una celda.

Además, Goerlich Gisbert (2012) muestra que la incidencia por causa cambia de forma importante según la edad: los tumores tienen mayor incidencia en edades medias, las enfermedades del sistema circulatorio en edades avanzadas y las causas externas en edades jóvenes. Esta idea

respalda la lectura general de este resultado, porque la composición causal de Costa Rica y Nicaragua también cambia según el grupo etario. No obstante, el contraste debe hacerse con cautela: Goerlich trabaja con tablas de vida de una generación ficticia y con una comparación histórica amplia para España, mientras que este proyecto estima una composición local por país, año, sexo y grupo etario para Centroamérica entre 2015 y 2018.

Lo que NO explica este resultado:

Este resultado no permite afirmar que Nicaragua tenga necesariamente un mayor riesgo absoluto de muerte que Costa Rica, ni que una causa específica sea epidemiológicamente más importante en términos absolutos. Una causa puede tener alta participación relativa dentro de la composición causal y, aun así, corresponder a una probabilidad absoluta baja si la mortalidad total del grupo etario también es baja.

Tampoco permite concluir, por sí solo, que la mayor fragmentación observada en Nicaragua responda a diferencias reales en salud, calidad del sistema sanitario o estructura epidemiológica. Parte de esa fragmentación podría estar asociada a diferencias en registro, clasificación de causas, tamaño poblacional o variabilidad propia de las celdas analizadas.

Además, cuando se grafican solo las causas principales, las barras no representan la totalidad de la composición causal. En ese caso,

$$\sum_{c \in \mathcal{C}_{sel}} \bar{\pi}_{x,p}^{(c)}$$

no necesariamente es igual a 1, porque $\mathcal{C}_{sel}$ representa únicamente el conjunto de causas seleccionadas. Por esta razón, la visualización completa de Nicaragua resulta necesaria para verificar cómo se distribuye la composición entre todas las causas disponibles.

Implicación para el siguiente paso:

El siguiente paso es complementar esta lectura relativa con el análisis de la probabilidad local absoluta ${}_1\hat{q}_{x,t,p,s}^{(c)}$. Esto permitirá distinguir si la fragmentación causal observada en Nicaragua corresponde únicamente a una redistribución interna entre causas o si también se asocia con diferencias relevantes en la magnitud absoluta del decremento. Además, conviene verificar si esta estructura se mantiene bajo el enfoque bayesiano, especialmente en celdas con baja exposición o conteos pequeños.

2.2 Conclusiones

La investigación permitió responder la pregunta sobre los patrones de variabilidad de la probabilidad de decremento por causa, $q_{x,t}^{(c)}$, en Centroamérica, excluyendo a Honduras por falta de información compatible con el periodo de estudio, entre 2015 y 2018, a partir de conteos de

defunciones de la WHO Mortality Database y exposiciones poblacionales aproximadas mediante la World Population Prospects (WPP). La elección de decrementos múltiples se desprendió directamente de la forma en que estaban organizados los datos: Para cada combinación de país, sexo, año y grupo etario se disponía de defunciones separadas por causa ICD-10 y de una exposición común para la población de esa celda. Con esa estructura, los conteos por causa y la exposición de cada celda se transformaron en probabilidades de decremento por causa, conservando la lectura de causas competidoras propia de un modelo actuarial. Esta lectura se apoya en la teoría de decrementos múltiples desarrollada por Deshmukh (2012) y en la discusión de Keyfitz et al. (1972) sobre el paso de tasas a probabilidades en contextos con varias causas de salida. A partir de los conteos de defunciones y la exposición poblacional, el enfoque clásico permitió construir intensidades y transformarlas en probabilidades locales de decremento, siguiendo la lógica de estimación de tasas discutida por Pitacco et al. (2009) y el uso de conteos Poisson en mortalidad planteado por Manton et al. (1989). El enfoque bayesiano, por su parte, amplió esta estimación al incorporar información colectiva mediante una estructura Poisson-Gamma y una lógica Empirical Bayes, cercana a Zhang et al. (2019), Schmitt et al. (2019) y Nelder y Verrall (1997). En términos generales, los resultados fueron coherentes con lo esperado: Ambos enfoques tendieron a acercarse cuando las celdas tenían suficiente información, mientras que las diferencias se hicieron más visibles en causas poco frecuentes, conteos bajos o celdas con mayor inestabilidad. En términos generales, los resultados fueron coherentes con lo esperado: ambos enfoques tendieron a acercarse cuando las celdas tenían suficiente información, mientras que las diferencias se hicieron más visibles en causas poco frecuentes, conteos bajos o celdas con mayor inestabilidad. Los resultados dejan ver que el grupo etario es una dimensión central del análisis: conforme cambia la edad, también cambia el peso relativo de las causas dentro del decremento estimado.

Los hallazgos empíricos evidencian que la variabilidad de la mortalidad por causa en Centroamérica se expresa de manera diferenciada según edad, sexo, país, año y causa. La probabilidad absoluta de decremento, $q_{x,t}^{(c)}$, permitió analizar la magnitud local del riesgo por causa dentro de cada celda, mientras que la composición causal condicionada al fallecimiento, $\pi_{x,t}^{(c)}$, permitió estudiar el peso relativo de cada causa entre quienes fallecen. A partir de estas medidas, se observó una dinámica etaria relativamente consistente entre países: las causas externas presentaron mayor participación en hombres jóvenes y adultos jóvenes, especialmente entre los 15 y 44 años, mientras que las enfermedades del sistema circulatorio adquirieron mayor peso en edades avanzadas, principalmente a partir de los 65 años. Este comportamiento se complementa con el análisis de excesos, donde El Salvador concentró el 92.6 % de las muertes por agresiones dentro del conjunto de países que superan la mediana de dicha causa. El caso más marcado correspondió a hombres de 20–24 años en 2015, con un exceso de 296 muertes. En contraste, los mayores conteos absolutos de defunciones se ubicaron en edades avanzadas y en enfermedades del sistema circulatorio, especialmente en Guatemala, donde la causa ICD-10 1064 acumuló cerca de 23,235 muertes en el grupo 85–89. También se identificaron diferencias relevantes entre países: Belice presentó un aumento local del decremento por enfermedades circulatorias en hombres de 65–69 años entre 2015 y 2018; Nicaragua mostró una composición causal más dispersa entre causas residuales que Costa Rica; y Guatemala evidenció una mayor presencia

de síntomas y hallazgos no clasificados en edades avanzadas. Estos resultados muestran que la variabilidad del decremento combina patrones etarios esperados, concentraciones causales específicas, diferencias nacionales y posibles efectos asociados a los sistemas de registro y clasificación de las defunciones.

Finalmente, las discrepancias observadas entre países, causas y enfoques obligan a cerrar el análisis con cautela. En los resultados clásicos, Belice presentó un aumento local de la probabilidad de decremento por enfermedades del sistema circulatorio en hombres de 65–69 años entre 2015 y 2018, un comportamiento que tensiona la expectativa general de mejora de supervivencia discutida a partir de Goerlich (2012). También se observaron variaciones relevantes en tumores para edades adultas y mayores, como en mujeres de 70–74 años. En El Salvador, las causas externas en hombres jóvenes mostraron niveles elevados en 2015, especialmente en los grupos 20–24 y 30–34, junto con una reducción visible hacia 2018. La comparación entre enfoque clásico y bayesiano mostró diferencias más marcadas en causas con mayor fragilidad estadística o con alta presencia de celdas donde la estimación clásica fue igual a cero, como enfermedades de la sangre, enfermedades de la piel y tejido subcutáneo, enfermedades osteomusculares, enfermedades genitourinarias y embarazo, parto y puerperio. En Belice también aparecieron diferencias de composición causal en edades tempranas y en el grupo 95+, aunque en varios casos la causa dominante se mantuvo estable entre enfoques. Estas discrepancias deben leerse dentro del periodo 2015–2018 y con el nivel de desagregación utilizado en el proyecto. Las principales limitaciones provienen de la naturaleza agregada de los datos, la ausencia de trayectorias individuales, la posible heterogeneidad en la calidad de los registros de mortalidad entre países y el horizonte temporal reducido. Por ello, trabajos futuros deberían ampliar la serie de años, incorporar intervalos de incertidumbre de forma sistemática, revisar con más detalle la calidad demográfica de las exposiciones y evaluar la persistencia de estos patrones con una ventana temporal más amplia.

2.3 Introducción

Al mirar la mortalidad como una sola cifra, se pierde una parte decisiva del fenómeno. Dos poblaciones pueden parecer cercanas en su nivel general de mortalidad y, sin embargo, tener estructuras causales muy distintas. No es lo mismo que las defunciones se concentren en edades avanzadas por enfermedades crónicas a que aparezcan con mayor peso en edades jóvenes por causas externas o condiciones evitables. Por eso, este artículo parte de una idea central y es que, en mortalidad no solo importa cuánto se muere, también se debe preguntar por qué causas ocurre los decrementos, en qué edades, en qué país y bajo qué estructura por sexo. Esta distinción tiene relevancia social, porque las causas de muerte permiten leer desigualdades demográficas y sanitarias que una tasa agregada deja demasiado planas.

Para estudiar esa estructura se utiliza el marco actuarial de decrementos múltiples. En este marco, una persona parte del estado vivo y puede salir de él por causas mutuamente excluyentes. La base del proyecto tiene justamente esa forma, pues para cada combinación de país, sexo, año y grupo etario se observan defunciones separadas por causa ICD-10 y una exposición común. A partir de esa información se estima la probabilidad anual de decremento por causa, denotada en el artículo como $q_{x,t}^{(c)}$.

Esta forma de plantear el problema se sostiene en la literatura revisada. Calazans y Queiroz (2020) aportan el antecedente regional al mostrar que la mortalidad adulta por causa en América Latina comparte ciertos patrones, pero también cambia entre países, edades y sexos. Román Sánchez et al. (2018) muestran, además, que este enfoque puede usarse en un contexto latinoamericano para estudiar mortalidad por causas. Aun con esos antecedentes, Centroamérica sigue siendo un espacio poco trabajado desde esta combinación de datos por causa, enfoque actuarial y comparación metodológica.

El estudio se delimita a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá durante 2015-2018. Se utilizan datos agregados de defunciones y exposición poblacional, organizados por grupo etario, país, sexo, año calendario y causa agrupada según capítulos de la ICD-10. La unidad de análisis es una celda actuarial definida por país, sexo, año, grupo etario y causa. Sobre esa base se comparan un enfoque clásico y uno bayesiano. Esa comparación no es el fin principal, sino una herramienta para leer con más cuidado los patrones de variabilidad, especialmente en celdas con poca exposición o conteos pequeños.

El objetivo del artículo es identificar cómo varía la probabilidad actuarial de decremento por causa según edad, país, sexo y año, distinguiendo entre riesgo absoluto de morir por una causa y composición causal condicionada al fallecimiento. En el fondo, se busca pasar de leer cuántos mueren a entender de qué se muere una población. El artículo presenta, en ese orden, la metodología, los resultados y las conclusiones.

2.5 Ordenamiento final

Título

Resumen

Palabras clave

Introducción

Al mirar la mortalidad como una sola cifra, se pierde una parte decisiva del fenómeno. Dos poblaciones pueden parecer cercanas en su nivel general de mortalidad y, sin embargo, tener estructuras causales muy distintas. No es lo mismo que las defunciones se concentren en edades avanzadas por enfermedades crónicas a que aparezcan con mayor peso en edades jóvenes por causas externas o condiciones evitables. Por eso, este artículo parte de una idea central y es que, en mortalidad no solo importa cuánto se muere, también se debe preguntar por qué causas ocurre los decrementos, en qué edades, en qué país y bajo qué estructura por sexo. Esta distinción tiene relevancia social, porque las causas de muerte permiten leer desigualdades demográficas y sanitarias que una tasa agregada deja demasiado planas.

Para estudiar esa estructura se utiliza el marco actuarial de decrementos múltiples. En este marco, una persona parte del estado vivo y puede salir de él por causas mutuamente excluyentes. La base del proyecto tiene justamente esa forma, pues para cada combinación de país, sexo, año y grupo etario se observan defunciones separadas por causa ICD-10 y una exposición común. A partir de esa información se estima la probabilidad anual de decremento por causa, denotada en el artículo como $q_{x,t}^{(c)}$.

Esta forma de plantear el problema se sostiene en la literatura revisada. Calazans y Queiroz (2020) aportan el antecedente regional al mostrar que la mortalidad adulta por causa en América Latina comparte ciertos patrones, pero también cambia entre países, edades y sexos. Román Sánchez et al. (2018) muestran, además, que este enfoque puede usarse en un contexto latinoamericano para estudiar mortalidad por causas. Aun con esos antecedentes, Centroamérica sigue siendo un espacio poco trabajado desde esta combinación de datos por causa, enfoque actuarial y comparación metodológica.

El estudio se delimita a Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá durante 2015-2018. Se utilizan datos agregados de defunciones y exposición poblacional, organizados por grupo etario, país, sexo, año calendario y causa agrupada según capítulos de la ICD-10. La unidad de análisis es una celda actuarial definida por país, sexo, año, grupo etario y causa. Sobre esa base se comparan un enfoque clásico y uno bayesiano. Esa comparación no es el fin principal, sino una herramienta para leer con más cuidado los patrones de variabilidad, especialmente en celdas con poca exposición o conteos pequeños.

El objetivo del artículo es identificar cómo varía la probabilidad actuarial de decremento por causa según edad, país, sexo y año, distinguiendo entre riesgo absoluto de morir por una causa y composición causal condicionada al fallecimiento. En el fondo, se busca pasar de leer cuántos mueren a entender de qué se muere una población. El artículo presenta, en ese orden, la metodología, los resultados y las conclusiones.

Metodología

Antes de presentar el modelo, se aclara una convención de notación. En realidad, la probabilidad estimada depende del grupo etario x , año calendario t , país p , sexo s , y causa de muerte c , por lo que podría escribirse como $q_{x,t,p,s}^{(c)}$. Sin embargo, para no cargar la lectura, en general se escribirá solo $q_{x,t}^{(c)}$, entendiendo que cada cálculo se realiza dentro de una celda definida también por país y sexo. Solo se retomarán los subíndices p y s cuando sean necesarios para explicar la estimación.

La base final utilizada en el estudio se construyó a partir de registros agregados de defunciones por causa y una medida de exposición poblacional. Las defunciones provienen de la *WHO Mortality Database*, mientras que la exposición se aproximó mediante la población a mitad de año correspondiente al mismo país, sexo, grupo etario y año calendario, la cual se encontró en la *World Population Prospects 2024*. El análisis se restringió al periodo 2015-2018 y a los países centroamericanos con información disponible en la base depurada, los cuales fueron Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Panamá.

La unidad de análisis no corresponde a individuos observados directamente, sino a una celda agregada por grupo etario y año. Cada celda contiene un número de defunciones $D_{x,t}^{(c)}$ y una exposición $E_{x,t}$. Las causas de muerte se agruparon según capítulos generales de la ICD-10, identificados mediante números romanos, con el fin de trabajar con categorías amplias, identificables, y evitar lidiar con conteos demasiado específicos. El análisis exploratorio de datos (EDA, por sus siglas en inglés) mostró que la mortalidad cambia de forma importante por edad y causa, particularmente las enfermedades del sistema circulatorio concentran defunciones en edades avanzadas, las causas externas (entre ellas agresiones) tienen mayor presencia en hombres jóvenes y algunas causas, como las afecciones perinatales, se ubican casi exclusivamente en edades tempranas. Por ello, se mantuvo la estratificación por grupo etario, causa, país, sexo y año.

El objeto actuarial de interés es la probabilidad anual de decremento por causa,

$$q_{x,t}^{(c)} = P(T_{x,t} \leq 1, J = c),$$

donde $T_{x,t}$ representa el tiempo futuro de vida de una persona perteneciente al grupo etario x durante el año t , y J indica la causa del decremento. Aquí x no se interpreta como una edad exacta individual, sino como el grupo etario completo, por ejemplo de 5-9 años o de 10-14.

Además, como se trabaja en un marco de decrementos múltiples, la causa c se interpreta en presencia de las demás causas competidoras.

Se asumió que la fuerza de mortalidad por causa permanece constante dentro de cada celda de observación. Así, si I_x representa el intervalo asociado al grupo etario x , entonces para edades exactas $y \in I_x$ y momentos calendario $z \in [t, t+1)$ se toma $\mu_{y,z}^{(c)} = \mu_{x,t}^{(c)}$, donde $\mu_{x,t}^{(c)}$ representa la fuerza de mortalidad por la causa c para la celda definida por grupo etario x y año calendario t .

Este supuesto facilita pasar de conteos y exposición a intensidades de mortalidad por causa, y luego transformar esas intensidades en probabilidades anuales de decremento. Esto se hará de manera distinta según el enfoque tomado; clásico o bayesiano.

En el enfoque clásico, las defunciones por causa se modelan como

$$D_{x,t}^{(c)} \mid \mu_{x,t}^{(c)} \sim \text{Poisson}(E_{x,t}\mu_{x,t}^{(c)}).$$

Bajo este modelo, la intensidad específica se estima mediante $\hat{\mu}_{x,t}^{(c)} = \frac{D_{x,t}^{(c)}}{E_{x,t}}$, el cual corresponde al estimador MLE. Luego se calcula la intensidad total de salida del estado vivo $\hat{\mu}_{x,t}^{(\tau)} = \sum_{j=1}^r \hat{\mu}_{x,t}^{(j)}$ y la probabilidad anual de decremento por causa se estima, mediante la conocida fórmula, como $\hat{q}_{x,t}^{(c)} = \frac{\hat{\mu}_{x,t}^{(c)}}{\hat{\mu}_{x,t}^{(\tau)}} \left(1 - e^{-\hat{\mu}_{x,t}^{(\tau)}}\right)$.

Por otro lado, en el enfoque bayesiano se mantiene el modelo Poisson para los conteos, pero la intensidad se trata como una variable aleatoria positiva:

$$D_{x,t}^{(c)} \mid \mu_{x,t}^{(c)} \sim \text{Poisson}(E_{x,t}\mu_{x,t}^{(c)}), \quad \mu_{x,t}^{(c)} \sim \text{Gamma}(\alpha_p^{(c)}, \beta_p^{(c)}).$$

En esta parte se retoma la notación completa, ya que los hiperparámetros se estiman por país y causa. Para cada país p y causa c se obtiene un par $(\alpha_p^{(c)}, \beta_p^{(c)})$ mediante el método Empirical Bayes, usando la información colectiva de las celdas de ese país y esa causa. En términos completos,

$$\mu_{x,t,p,s}^{(c)} \sim \text{Gamma}(\alpha_p^{(c)}, \beta_p^{(c)}).$$

Los hiperparámetros no se fijan de forma arbitraria, sino que se estiman desde los conteos observados. Para ello se usa la distribución marginal inducida por el modelo Poisson-Gamma, la cual corresponde a una binomial negativa y de allí se obtienen $(\alpha_p^{(c)}, \beta_p^{(c)})$ mediante estimación MLE. Luego, por conjugación, la posterior de cada intensidad queda dada por

$$\mu_{x,t,p,s}^{(c)} \mid D_{x,t,p,s}^{(c)}, E_{x,t,p,s} \sim \text{Gamma}(\hat{\alpha}_p^{(c)} + D_{x,t,p,s}^{(c)}, \hat{\beta}_p^{(c)} + E_{x,t,p,s}).$$

En esta etapa también se distinguieron ceros observacionales y celdas fuera del dominio de una causa. Los ceros observacionales se mantuvieron, porque corresponden a causas posibles sin defunciones registradas. En cambio, las celdas fuera del dominio de la causa no se usaron para estimar hiperparámetros ni para simular intensidades. En particular, la causa XV, embarazo, parto y puerperio, se restringió a mujeres en edades reproductivas, eliminando hombres y mujeres muy jóvenes o muy mayores; y la causa XVI, afecciones originadas en el periodo perinatal, se restringió al grupo 0-4, eliminando adultos.

Como $q_{x,t}^{(c)}$ es una función no lineal de las intensidades, en el enfoque bayesiano no se sustituyeron directamente las medias posteriores en la fórmula clásica, pues eso sería incorrecto ya que la esperanza solo separa funciones lineales. En su lugar, se simularon intensidades posteriores por causa y , en cada simulación $s = 1, \dots, S$, se calculó

$$q_{x,t}^{(c,s)} = \frac{\mu_{x,t}^{(c,s)}}{\mu_{x,t}^{(\tau,s)}} \left(1 - e^{-\mu_{x,t}^{(\tau,s)}} \right), \quad \mu_{x,t}^{(\tau,s)} = \sum_{j=1}^r \mu_{x,t}^{(j,s)}.$$

La estimación bayesiana final para cada causa se obtuvo como la media de las simulaciones:

$$q_{x,t}^{(c),*} = \frac{1}{S} \sum_{s=1}^S q_{x,t}^{(c,s)}.$$

Finalmente, los resultados se analizaron con dos medidas. La primera corresponde simplemente $q_{x,t}^{(c)}$, que mide el riesgo absoluto estimado de morir por la causa c dentro de la celda (x, t) . La segunda fue la composición causal condicionada al fallecimiento $\pi_{x,t}^{(c)}$, la cual se comprueba que cumple lo siguiente:

$$\pi_{x,t}^{(c)} = P(J = c \mid T_{x,t} \leq 1) = \frac{q_{x,t}^{(c)}}{\sum_{j=1}^r q_{x,t}^{(j)}}.$$

La primera medida responde qué tan grande es el riesgo por causa, mientras que la segunda responde cómo se reparte causalmente el total de fallecimientos estimados.

Resultados

Resultados

Tal como se ha venido desarrollando a partir de la estructura metodológica, los resultados se organizan en dos niveles. Primero, se analiza la dinámica demográfica de la mortalidad por causa en los países centroamericanos delimitados, con énfasis en edad, país, sexo y año calendario. Segundo, se comparan las estimaciones obtenidas mediante el enfoque clásico y el

enfoque bayesiano, no para decidir cuál enfoque es superior sino para evaluar si los patrones de variabilidad encontrados se mantienen cuando cambia el marco de estimación.

Dinámica demográfica de la mortalidad por causa

Un primer hallazgo consistió en la concentración relativa de mortalidad por causa ICD10-1102 en población joven de El Salvador. A partir de la medida de exceso descriptivo, se identificaron los países con mayores excesos para la causa de agresiones y se observó que, dentro del conjunto de países que superaban la banda de referencia, El Salvador concentró aproximadamente el 92.6 % de las muertes asociadas a esta causa. Este resultado es significativo porque a través de un dato se permite construir una noción de la dinámica demográfica del país.

La medida de exceso también permitió diferenciar entre volumen absoluto de defunciones y desviación respecto al comportamiento típico de un estrato. En los datos observados, los estratos con mayor número de muertes se concentran principalmente en edades avanzadas y en enfermedades del sistema circulatorio, especialmente en Guatemala. Esto responde, en parte, al mayor volumen poblacional y a la acumulación natural de defunciones en edades mayores. En cambio, el mayor estrato individual por exceso corresponde a El Salvador, en 2015, hombres de 20–24 años, causa 1102: agresiones, con un exceso de 296 muertes. Por tanto, el exceso descriptivo no repite simplemente el análisis de conteos absolutos, sino que permite detectar estratos relativamente atípicos dentro de su propia trayectoria 2015–2018.

De manera simultánea, se encontró que la causa con mayor acumulación global de muertes entre los países delimitados corresponde a enfermedades del sistema circulatorio, asociadas al grupo ICD-10 IX. Los mapas de calor mostraron que la combinación edad-causa con mayor volumen se ubicó en el grupo 85–89 años, con cerca de 23,235 muertes acumuladas. Este resultado confirma que la mortalidad centroamericana observada en el periodo se estructura fuertemente por edad: las causas crónicas, especialmente las circulatorias, dominan en edades avanzadas, mientras que otras causas adquieren relevancia en tramos más específicos del ciclo de vida. Una lectura gráfica general de esta transición se presenta en Figura 1.

En términos generales, la probabilidad de decremento por causa muestra perfiles etarios relativamente consistentes entre países. En casi todos los casos, las causas externas concentran una alta participación dentro de los fallecimientos de hombres jóvenes y adultos jóvenes, mientras que las enfermedades del sistema circulatorio aumentan su peso en edades avanzadas. En términos de composición causal, esto implica que $\pi_{x,t}^{(XX)}$ tiende a ser mayor en edades jóvenes, especialmente entre $x = 15-19$ y $x = 40-44$, mientras que $\pi_{x,t}^{(IX)}$ tiende a crecer en grupos adultos mayores, particularmente desde $x = 65-69$ hasta $x = 95+$. Esta lectura no significa que las causas externas tengan mayor riesgo absoluto que las circulatorias, sino que, entre quienes fallecen en esas edades jóvenes, las causas externas ocupan una mayor proporción relativa.

Por otro lado, durante el periodo delimitado no en todos los casos se observó una mejora de la supervivencia. En Belice, por ejemplo, se evidenció que la probabilidad local de decremento

asociada a enfermedades del sistema circulatorio aumentó entre 2015 y 2018 para hombres de 65-69 años, como se muestra en Figura 2. En particular, se observó que $\hat{q}_{65-69,2018,Belice,Hombre}^{(IX)} > \hat{q}_{65-69,2015,Belice,Hombre}^{(IX)}$. Este resultado contrasta con una lectura general de mejora temporal de la supervivencia; sin embargo, este resultado es atribuible a una variación localizada de corto plazo y no como una tendencia estructural regional. El intervalo 2015-2018 es breve, por lo que un aumento puntual puede responder a fluctuaciones propias de la celda, diferencias de registro o cambios coyunturales.

También se encontró que no todos los países siguen una misma lógica proporcional en su composición causal. En particular, Nicaragua presentó una composición más distribuida entre causas residuales que Costa Rica. Este resultado se obtuvo al comparar la composición causal parcial, construida con las causas principales, contra la composición causal completa, que incorpora todas las causas disponibles. La menor participación conjunta de las causas principales en Nicaragua no se debe necesariamente al dominio de una única causa omitida, sino a una mayor dispersión entre categorías residuales. En contraste, en Costa Rica la composición tiende a concentrarse más claramente en causas principales conforme aumenta la edad, especialmente tumores, enfermedades respiratorias y enfermedades del sistema circulatorio.

Finalmente, dentro de las dinámicas demográficas también se observó un aumento de causas mal definidas o no clasificadas en edades avanzadas de Guatemala. En este caso, toma notoriedad la categoría de síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificados en otra parte. Este hallazgo muestra una forma distinta de variabilidad causal: no necesariamente una variabilidad demográfica inmanente per sé, sino una variabilidad influida por los sistemas de registro y clasificación de la causa de muerte. Por tanto, la probabilidad de decremento por causa puede verse afectada no solo por la estructura real de mortalidad, sino también por diferencias en certificación, codificación o precisión del registro.

Diferencias entre el enfoque clásico y el enfoque bayesiano

El resultado global más importante es que las estimaciones clásica y bayesiana fueron altamente concordantes. En las 13,704 celdas comparables, cerca del 89.8% presentó una diferencia absoluta menor que 0.0001 entre ambos enfoques. Además, la mediana de la diferencia absoluta fue aproximadamente 0.000002. Esto indica que, para la mayoría de combinaciones de país, año, sexo, grupo etario y causa, las estimaciones quedaron prácticamente alineadas. En términos sustantivos, los principales patrones de variabilidad por edad, causa, país y sexo no dependen fuertemente de haber usado el enfoque clásico o el bayesiano. Estos indicadores se resumen en Tabla 3.

Esta cercanía entre enfoques es metodológicamente esperable. El enfoque bayesiano usado no introduce una previa externa completamente ajena a los datos, sino que estima los hiperparámetros mediante una lógica Empirical Bayes a partir de la propia experiencia observada. Por eso, cuando una celda tiene exposición suficiente y una cantidad razonable de defunciones, la información local domina la estimación y el resultado bayesiano se aproxima al clásico. En esas

celdas, el enfoque bayesiano no modifica sustantivamente la lectura demográfica, sino que la valida desde un marco probabilístico distinto.

Las diferencias entre el enfoque clásico y el bayesiano aparecen con mayor claridad cuando se analizan mediante la diferencia relativa absoluta simétrica, denotada como $DRAS_{x,t}^{(c)}$. Esta medida compara, para una misma celda, qué tan alejadas se encuentran las estimaciones $q_{B,x,t}^{(c)}$ y $q_{F,x,t}^{(c)}$, donde los subíndices completos de país, sexo, grupo etario, año y causa se omiten únicamente para no sobrecargar la notación. En términos interpretativos, valores cercanos a 0 indican alta coincidencia entre enfoques, mientras que valores cercanos a 2 indicarían una discrepancia relativa fuerte.

A partir de Tabla 1 se observa que las mayores medianas de $DRAS_{x,t}^{(c)}$ aparecen en causas donde el enfoque bayesiano modifica relativamente más la estimación clásica. En particular, la causa III muestra una de las mayores discrepancias relativas. Sin embargo, esta diferencia debe interpretarse con cautela, porque el tamaño absoluto de las diferencias en $q_{x,t}^{(c)}$ sigue siendo muy pequeño. De hecho, aunque el cociente relativo pueda crecer cuando las probabilidades son cercanas a cero, el numerador de $DRAS_{x,t}^{(c)}$ permanece en magnitudes muy bajas, del orden de 2.62×10^{-6} . Por tanto, la discrepancia relativa no implica necesariamente una diferencia actuarial grande en términos absolutos.

Este resultado se explica por la forma en que cada enfoque trata los conteos nulos. En el enfoque clásico, si $D_{x,t}^{(c)} = 0$, entonces $\hat{\mu}_{x,t}^{(c)} = 0$ y la probabilidad estimada de decremento por esa causa puede quedar fijada en cero. En cambio, bajo el enfoque bayesiano, cuando la celda pertenece al dominio aplicable de la causa, un cero observado no se interpreta automáticamente como riesgo imposible. La distribución posterior Gamma tiene soporte positivo, de modo que la intensidad posterior puede ser muy pequeña, pero no necesariamente igual a cero. Por eso, el porcentaje de celdas con q clásico igual a cero ayuda a explicar parte de la discrepancia observada en Tabla 1.

Ahora bien, el análisis de $DRAS_{x,t}^{(c)}$ compara las probabilidades absolutas causa por causa, pero no responde directamente si la interpretación de la composición causal cambia dentro de una misma celda. Para estudiar esto se utilizó la distancia de variación total entre composiciones causales, definida como $D_{\pi,x,t} = \frac{1}{2} \sum_{c=1}^r |\pi_{B,x,t}^{(c)} - \pi_{F,x,t}^{(c)}|$. Esta medida compara el vector completo de composiciones causales bajo ambos enfoques y permite evaluar cuánta masa probabilística tendría que redistribuirse para pasar de la composición frecuentista a la bayesiana.

En Tabla 2 se observa que las mayores distancias de variación total se concentran principalmente en Belice. Este resultado es coherente con la estructura de los datos, porque Belice presenta menor exposición poblacional relativa dentro del conjunto centroamericano. En consecuencia, sus conteos por causa son más sensibles a variaciones pequeñas y a la presencia de ceros. En este contexto, el enfoque clásico puede producir composiciones más abruptas, mientras que el enfoque bayesiano redistribuye parte de la masa causal mediante el suavizamiento Empirical Bayes.

El caso con mayor distancia corresponde a mujeres de Belice, grupo 5-9, año 2017, con $D_\pi = 0.4367$. Este valor no significa que una sola causa explique por sí misma el 43.67% de la diferencia, sino que aproximadamente esa proporción de la masa de composición causal tendría que redistribuirse para convertir el vector clásico en el vector bayesiano. En esa celda, ambos enfoques mantienen como causa dominante a XX, correspondiente a causas externas de mortalidad, por lo que la discrepancia no altera la causa principal, aunque sí modifica la distribución relativa del resto de causas.

El segundo caso, correspondiente a mujeres de Belice de 10-14 años en 2016, es más relevante desde el punto de vista interpretativo, porque la causa dominante cambia de II en el enfoque clásico a XX en el enfoque bayesiano. En este caso, $D_\pi = 0.3828$ sí refleja una modificación sustantiva en la lectura causal de la celda. Esta diferencia puede explicarse por la combinación de baja exposición, conteos pequeños y suavizamiento bayesiano, factores que hacen que pequeñas diferencias absolutas en $q_{x,t}^{(c)}$ produzcan cambios visibles en la composición causal $\pi_{x,t}^{(c)}$.

En síntesis, la comparación entre enfoques no muestra una ruptura general entre el modelo clásico y el bayesiano. Por el contrario, los patrones demográficos principales se mantienen: causas externas en hombres jóvenes, enfermedades circulatorias en edades avanzadas, heterogeneidad entre países y presencia de categorías residuales en algunos contextos. No obstante, las métricas $DRAS_{x,t}^{(c)}$ y $D_{\pi,x,t}$ muestran que las discrepancias relevantes se concentran en celdas pequeñas, con baja exposición o con conteos nulos. Por tanto, el enfoque bayesiano no cambia la lectura global del fenómeno, pero sí introduce una lectura más prudente en celdas sensibles, especialmente cuando la composición causal puede alterarse por diferencias pequeñas en probabilidades absolutas.

De esta manera, la comparación clásico-bayesiana cumple una función metodológica concreta separar resultados robustos de los resultados sensibles al método de estimación. El análisis por $DRAS_{x,t}^{(c)}$ muestra que las diferencias absolutas en las probabilidades de decremento son generalmente pequeñas, mientras que la distancia $D_{\pi,x,t}$ evidencia que algunas celdas pueden cambiar su reparto causal interno aun cuando las diferencias absolutas sean reducidas. Esto remarca el énfasis principal del trabajo en estudiar la variabilidad de $q_{x,t,p,s}^{(c)}$ por edad, país, sexo, año y causa, manteniendo explícita la incertidumbre asociada al proceso de estimación.

Conclusiones

La investigación permitió responder la pregunta sobre los patrones de variabilidad de la probabilidad de decremento por causa, $q_{x,t}^{(c)}$, en Centroamérica entre 2015 y 2018, excluyendo Honduras por falta de información compatible con el periodo de estudio. El análisis se construyó con conteos de defunciones de la WHO Mortality Database y exposiciones poblacionales aproximadas mediante la World Population Prospects (WPP). La estructura de los datos orientó el uso de decrementos múltiples: para cada combinación de país, sexo, año y grupo etario se contaba con defunciones separadas por causa ICD-10 y una exposición común para la celda. Con esa base, los conteos por causa se transformaron en probabilidades de decremento,

manteniendo la lectura de causas competidoras propia del modelo actuarial. Esta formulación se apoyó en Deshmukh (2012), Keyfitz et al. (1972), Pitacco et al. (2009) y Manton et al. (1989). El enfoque clásico permitió estimar intensidades y probabilidades locales, mientras que el enfoque bayesiano incorporó información colectiva mediante una estructura Poisson-Gamma y una lógica Empirical Bayes, cercana a Zhang et al. (2019), Schmitt et al. (2019) y Nelder y Verrall (1997). En general, ambos enfoques produjeron resultados cercanos en celdas con suficiente información, con diferencias más visibles en causas poco frecuentes, conteos bajos o combinaciones inestables.

Los hallazgos muestran que la variabilidad de la mortalidad por causa en Centroamérica cambia según edad, sexo, país, año y causa. La probabilidad absoluta de decremento, $q_{x,t}^{(c)}$, permitió analizar la magnitud local del riesgo por causa, mientras que la composición causal condicionada al fallecimiento, $\pi_{x,t}^{(c)}$, permitió estudiar el peso relativo de cada causa entre quienes fallecen. En términos etarios, las causas externas tuvieron mayor participación en hombres jóvenes y adultos jóvenes, especialmente entre los 15 y 44 años, mientras que las enfermedades del sistema circulatorio adquirieron mayor peso a partir de los 65 años. El análisis de excesos reforzó este patrón: El Salvador concentró el 92.6 % de las muertes por agresiones dentro del conjunto de países que superan la mediana, con un caso marcado en hombres de 20–24 años en 2015. En contraste, los mayores conteos absolutos se ubican en edades avanzadas y en enfermedades del sistema circulatorio, especialmente en Guatemala. Además, Belice mostró un aumento local del decremento circulatorio en hombres de 65–69 años, Nicaragua presentó una composición causal más dispersa que Costa Rica y Guatemala evidenció mayor presencia de síntomas y hallazgos no clasificados en edades avanzadas.

Finalmente, las discrepancias observadas delimitan el alcance de la interpretación. En los resultados clásicos, Belice presentó un aumento local de la probabilidad de decremento por enfermedades del sistema circulatorio en hombres de 65–69 años entre 2015 y 2018, mientras que los tumores mostraron variaciones relevantes en edades adultas y mayores, como en mujeres de 70–74 años. En El Salvador, las causas externas en hombres jóvenes alcanzaron niveles elevados en 2015, especialmente en los grupos 20–24 y 30–34, con una reducción visible hacia 2018. La comparación entre enfoque clásico y bayesiano mostró diferencias más marcadas en causas con mayor fragilidad estadística o con alta presencia de celdas donde la estimación clásica fue igual a cero, como enfermedades de la sangre, enfermedades de la piel y tejido subcutáneo, enfermedades osteomusculares, enfermedades genitourinarias y embarazo, parto y puerperio. También aparecieron diferencias de composición causal en celdas específicas de Belice, sobre todo en edades tempranas y en el grupo 95+, aunque en varios casos la causa dominante se mantuvo estable entre enfoques. Las principales limitaciones provienen de la naturaleza agregada de los datos, la ausencia de trayectorias individuales, la posible distribución variada en la calidad de los registros de mortalidad entre países y el horizonte temporal reducido. Futuros trabajos podrían ampliar la serie de años, incorporar intervalos de incertidumbre y revisar con mayor detalle la calidad demográfica de las exposiciones.

Agradecimientos

Anexos

Anexos

Tabla resumen de diferencias entre enfoques

Tabla 3: Resumen de diferencias entre el enfoque clásico y el enfoque bayesiano

Indicador	Resultado	Interpretación
Celdas comparables entre enfoques	13,704	Número total de combinaciones país, año, sexo, grupo etario y causa comparadas.
Celdas con diferencia absoluta menor que 0.0001	89.8 %	Proporción de celdas donde el enfoque clásico y el bayesiano producen estimaciones prácticamente alineadas.
Mediana de la diferencia absoluta	0.000002	Diferencia típica entre ambas estimaciones de probabilidad de decremento.

Composición de muertes a través de la edad

Radar de sistema circulatorio en Belice

Referencias




Figura 1: Composición de las muertes a través de la edad.

Probabilidad local de decremento por sistema circulatorio por país
 $100 \times q_c$. Grupo etario 65-69 , sexo: Hombre . Comparación 2015 y 2018 .




Figura 2: Probabilidad local de decremento por enfermedades del sistema circulatorio en hombres de 65–69 años.