

1. Grundlagen

TODO: Modulo und \mathbb{Z}_K

1.1. Mengenlehre

1.1.1 Für alle Mengen A,B,C gilt:

- $\emptyset \subset B$
- $A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$
- $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$
- $A \Delta B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$
symmetr. Differenz zweier Mengen: Alle Elemente, die entweder in A oder B enthalten sind.
- $A \times B = \{(a_1, b_1), \dots, (a_1, b_n), (a_2, b_1), \dots\}$
direktes Produkt zweier Mengen, ordnet jedem Element aus A jedes Element aus B zu (Tupel)

1.2. Abbildungen

$f: A \rightarrow B$

Surjektivität

$\forall y \in B \exists x \in A : f(x) = y$. Es wird auf alle Werte der Wertemenge abgebildet

Beweisstruktur:

- Sei $y \in B$, finde $x \in A$ mit $f(x) = y$
- Durch Einsetzen ergibt sich $y = f(x)$, kann man dies nach x auflösen, so ist f surjektiv.
Ist $B = K^n$, z.B. $n = 2$, so wählt man $(a, b) \in K^2$, $f(x, y) = (a, b)$ und löst das lin. Gleichungssystem nach x und y auf

f surjektiv \iff Bild $f = B$

Injektivität

$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$. Zwei verschiedene Elemente der Definitionsmenge bilden nicht auf gleiche Elemente der Wertemenge ab.

Beweisstruktur:

- $x_1, x_2 \in A$ mit $x_1 \neq x_2$
- Gibt es eine Kombination von x_1, x_2 , sodass $f(x_1) = f(x_2)$, so ist f nicht injektiv
Ist $A = K^n$, z.B. $n = 2$, so wählt man $(x_1, y_1), (x_2, y_2) \in K^2$ und vergleicht $f(x_1, y_1) = f(x_2, y_2)$. Hier erhält man zwei Gleichungen, setzt man die eine in die andere ein, so muss $x_1 = x_2$ bzw. $y_1 = y_2$ rauskommen.

f injektiv \iff Kern $f = \{0\}$

f injektiv $\iff f$ streng monoton steigend

1.2.1 Schnitt-/Vereinigungsbeweis von (Ur-)Bildern

- $f^{-1}(N_1 \cup N_2) = f^{-1}(N_1) \cup f^{-1}(N_2)$
 - Sei $x \in f^{-1}(N_1 \cup N_2) \iff f(x) \in N_1 \cup N_2$
 - Beweis weiterführen, bis man auf $x \in f^{-1}(N_1) \cup f^{-1}(N_2)$ kommt
- $f(M_1 \cup M_2) = f(M_1) \cup f(M_2)$
 - Sei $y \in f(M_1 \cup M_2) \iff x \in M_1 \cup M_2$
 - Beweis weiterführen, bis man auf $y \in f(M_1) \cup f(M_2)$ kommt

2. Algebraische Strukturen

2.1. Gruppen

Menge mit einer Verknüpfung \circ (z.B. $+$, \cdot) $\Rightarrow (M, \circ)$

2.1.1 Halbgruppe

Falls für alle $a, b, c \in M$ das Assoziativgesetz gilt:

$(ab)c \stackrel{!}{=} a(bc)$, hierbei beschreibt ab die Verknüpfung von a und b (\circ)

2.1.2 Monoid

Halbgruppe mit neutralem Element e : $ae = ea = a$

2.1.3 abelsche/kommutative (Halb-)Gruppe

(Halb-)Gruppe, wobei das Kommutativgesetz gilt: $ab = ba$

2.1.4 Gruppe

Eine Halbgruppe (G, \circ) heißt Gruppe mit neutralem Element e , falls:

- Die Gruppe abgeschlossen ist: $\forall a, b \in G : a \circ b \in G$
- es zu jedem $a \in G$ ein $b \in G$ gibt mit $ab = ba = e$. b ist das Inverse von a und ist eindeutig. Man schreibt $b = a^{-1}$

symmetrische Gruppe S_n : Gruppe der Permutationen:
 $\overset{1}{1}, \overset{2}{2}, \overset{3}{3} \quad \overset{1}{2}, \overset{2}{1}, \overset{3}{3} \quad \overset{1}{3}, \overset{2}{2}, \overset{3}{1}$
 $(1, 3, 2)(2, 3, 1) = (3, 2, 1)$. Von rechts nach links gelesen:

- Die Stelle **1** wird auf die 2 abgebildet, die Stelle **2** wird auf die 3 abgebildet. 1. Element des Ergebnisses, usw...

2.1.5 Untergruppe

Gruppe (U, \circ) , wobei $U \subset G$. Dann ist U Untergruppe von G

Axiome zum Beweis von Untergruppe:

- $e \in U$
- $v, w \in U \Rightarrow v \circ w \in U$
- $v \in U \Rightarrow v^{-1} \in U$

2.2. Ring

Menge R mit zwei Verknüpfungen $(R, +, \cdot)$, falls gilt:

- $(R, +)$ kommutative Gruppe mit neutralem Element **e**
- (R, \cdot) Halbgruppe
- $\forall a, b, c \in R$ gilt $a(b+c) = ab+ac$ und $(b+c)a = ba+ca$ (Distributivgesetz)

2.3. Körper

- $(R, +, \cdot)$ ist ein Ring
- $(R \setminus \{\mathbf{e}\}, \cdot)$ der kommutativen Gruppe des Rings, \cdot ist kommutative Gruppe

Wichtige Beispiele

- \mathbb{Q} und \mathbb{R} sind Körper
- $(\mathbb{Z}_p, \oplus_p, \odot_p)$ ist für jede Primzahl p ein Körper

2.4. Vektorraum

Eine Menge V ist K -Vektorraum (VR über Körper K) mit

- Vektoraddition: $V \times V \rightarrow V, (v, w) \mapsto v + w$
- Skalarmultiplikation: $K \times V \rightarrow V, (\lambda, v) \mapsto \lambda v$

wobei $\forall \lambda, \mu \in K$ und $\forall v, w \in V$ gilt:

- $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$
- $\lambda(v+w) = \lambda v + \lambda w$ und $(\lambda+\mu)v = \lambda v + \mu v$
- $1v = v$

2.4.1 Untervektorraum

U ist Untervektorraum von V , wenn $U \subset V$, bzw. $\forall v, w \in U, \lambda \in K$

- $v + w \in U$
- $\lambda v \in U$
- $U \neq \emptyset$ bzw. $e \in U$ (**e** der kommut. Gruppe des Ringes)

2.4.2 direkte Summe zweier UVRs

Zwei UVRs U_1, U_2 heißen direkte Summe $U_1 \oplus U_2$, wenn $U_1 \cap U_2 = \{0\}$. D.h. zwei UVRs treffen sich nur im Ursprung (zwei Geraden (UVR vom \mathbb{R}^3) schneiden sich nur im Ursprung)

In der Summe $U_1 + U_2 = \{u_1 + u_2 | u_1 \in U_1, u_2 \in U_2\}$ ist die Darstellung $u = u_1 + u_2$ eindeutig. Es gibt nur eine mögliche Linearkombination! (Aus) Z.B. $\{(x, 0) | x \in \mathbb{R}\} \oplus \{(0, y) | y \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}^2$, da $(x, y) = (x, 0) + (0, y)$

2.4.3 Neue UVRs aus Alten

- $U_1 \cap U_2$ ist UVR
- $U_1 + U_2$ ist UVR
- $\Phi: V \rightarrow W$ linear mit $U \subset V, T \subset W$:
 $\Phi(U) = \{\Phi(u) | u \in U\}$ UVR von W
 $\Phi(T) = \{v \in V | \Phi(v) \in T\}$ UVR von V

2.5. Spann

Menge aller Vektoren, die aus Linearkombination der Argumente (hier v_1, v_2) hervorgehen,

z.B.: $\text{spann}(v_1, v_2) = \{av_1 + bv_2 | a, b \in \mathbb{R}\}$

- $\text{spann } M$ ist UVR von V , wenn $M \subset V$
- Sind U_1 und U_2 UVR von V : $\text{spann}(U_1 \cup U_2) = U_1 + U_2$
- $\text{spann } \emptyset = \{0\}$
- $\Phi: V \rightarrow W$ linear: $\text{spann}(\Phi(V)) = \Phi(\text{spann } V)$

3. Lineare Abbildungen

Seien V, W K -Vektorräume. Eine Abbildung $\Phi: V \rightarrow W$ heißt **Vektorraumhomomorphismus** oder **linear**, falls $\forall v, w \in V$ und $\forall \lambda \in K$ gilt:

- $\Phi(0) = 0$
- $\Phi(\lambda v + w) = \lambda \Phi(v) + \Phi(w)$

$L(V, W) := \{\Phi: V \rightarrow W | \Phi \text{ linear}\}$

Endomorphismen: VR-Homomorphismen von V auf sich selbst ($\Phi: V \rightarrow V$)

Isomorphismen: Bijektive VR-Homomorphismen

Automorphismen: Bijektive Endomorphismen

3.1. Kern

Sei $\Phi: V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung, der Kern Φ ist die Menge aller Elemente aus V , die auf die 0 abgebildet werden.

Kern $\Phi := \{v \in V | \Phi(v) = 0\} = \Phi^{-1}(\{0\})$

3.2. Bild

Sei $\Phi: V \rightarrow W$ eine lineare Abbildung, das Bild Φ ist die Menge aller Elemente aus W , auf die abgebildet wird.

Bild $\Phi := \{\Phi(v) | v \in V\}$

3.3. Dimension

Menge an lin. unabh. Vektoren eines VRs ($f: V \rightarrow W$ lin.)

Rang: $\text{Rang } f := \dim(\text{Bild } f)$

Dimensionssatz: $\dim V = \dim(\text{Kern } f) + \dim(\text{Bild } f)$

- $\dim V = 0 \iff V = \{0\}$

3.4. Vektorraumisomorphismus

Zwei VRs sind isomorph $V \cong W$ genau dann, wenn

- Man eine bijektive lin. Abb. finden kann, die eine Basis von V auf eine Basis von W abbildet
- $\dim V = \dim W$

Koordinatensystem: Isomorphismus $\Phi: K^n \rightarrow V$

CONTINUE: Section: Lin. Abbildungen und Matrizen