

段階2: 装置をつけている時

歯ぐきの骨のすき間をうめる手術：3つの段階


この模型は、骨移植から約2～3年後の同じ上あごです。子どもは12～13才ごろです。犬歯が新しい骨を通っておりてきました。歯につける装置で、歯をならべています。



上あご全体：装置とつくり物の歯



装置を外した所：はえてこなかった歯のすき間



歯ぐきを外した所：新しい骨と犬歯



下から見た所：上あごと装置

変わったところ

すき間があった所は、骨で上あごの2つの部分がつながっています。[1,2]

犬歯は移植した骨を通って、歯のならびまでおりてきました。[3,4]

ピンクの歯ぐきを外すと、新しい骨が見えます。前歯のとなりの、少し黄色くてざらざらした部分です。

歯につける装置

歯につける装置で、歯をならべます。この骨移植を受けた人のほぼ全員に必要です。[1,2]

はえてこなかった小さい歯のすき間には、装置のワイヤーにつけた白いつくり物の歯が入っています。装置を外すまで、すき間をたもちます。

図は、装置がある時と外した時の上あごです。

出典 **1.** Bergland O, Semb G, Abyholm FE. Elimination of the residual alveolar cleft by secondary bone grafting and subsequent orthodontic treatment. Cleft Palate J. 1986;23:175-205. PMID 3524905. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3524905 **2.** Semb G. Alveolar bone grafting. Front Oral Biol. 2012;16:124-136. doi.org/10.1159/000337666 **3.** Rivers J, et al. A clinical index scale for secondary alveolar bone graft success based on canine eruption. Eur J Orthod. 2025;47:cjae065. doi.org/10.1093/ejo/cjae065 **4.** Vellone V, et al. Canine eruption after secondary alveolar bone graft in unilateral cleft lip and palate patients. J Craniofac Surg. 2017;28:1206-1210. doi.org/10.1097/SCS.0000000000003659

このシートは、愛知学院大学と名古屋大学の研究のためのものです。バージョン0.2、2026年11月4日。