段階3: 装置を外した後

歯ぐきの骨のすき間をうめる手術：3つの段階

この模型は、十代の後半、装置を外した後の同じ上あごです。はえてこなかった小さい歯のすき間を、これからずっとうめることができます。

仮の図：装置を外した後の模型の図

インプラントとクラウン

模型ができたら tools/sheet/render.js で作ります。

インプラントとクラウン

仮の図：装置を外した後の模型の図

一まいの羽のブリッジ

模型ができたら tools/sheet/render.js で作ります。

一まいの羽のブリッジ

仮の図：装置を外した後の模型の図

取り外しできる入れ歯

模型ができたら tools/sheet/render.js で作ります。

取り外しできる入れ歯

仮の図：装置を外した後の模型の図

左側：歯のならびに出た犬歯

模型ができたら tools/sheet/render.js で作ります。

左側：歯のならびに出た犬歯

変わったところ

装置は外れています。すき間があった所では、骨が歯をささえています。[1,2]

体が育ち終わったので、歯医者さんは、すき間をずっとうめることができます。[3,4]

すき間をうめる方法

主に3つの方法があります。[3]

- **インプラント**：骨にうめる小さなねじの上に、歯の形のかぶせ物（**クラウン**）をつけたもの[4]
- **ブリッジ**：つくり物の歯で、一まいの羽を、すき間のとなりの歯のうらに、はりつけたもの
- **取り外しできる入れ歯**：つくり物の歯をささえるうすい板

図は、それぞれの方法を見せています。

すき間をとじるチームもあります。装置で犬歯を、ない歯の場所に動かします。その後、歯医者さんが犬歯の形を整えて、ない歯のように見せます。口の割れ目がある子どもでは、いちばん多い方法です。模型は、この方法を見せていません。[5,1,6,7]

どの方法が合うかは、口の割れ目のチームと話し合います。[3]

出典 **1.** Bergland O, Semb G, Abyholm FE. Elimination of the residual alveolar cleft by secondary bone grafting and subsequent orthodontic treatment. Cleft Palate J. 1986;23:175-205. PMID 3524905. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3524905 **2.** Jahanbin A, et al. Long-term stability of alveolar bone graft in cleft lip and palate: a systematic review and meta-analysis. J Craniofac Surg. 2022;33:e194-e200. doi.org/10.1097/SCS.0000000000008254 **3.** Clerc MM, et al. Replacement of missing lateral incisors for patients with cleft lip and palate: a decision-making tree based on a systematic review. J Prosthet Dent. 2025;134:50-60. doi.org/10.1016/j.prosdent.2023.07.023 **4.** Knobloch LA, et al. Narrow diameter implants for a missing lateral incisor in cleft palate patients: five-year results. J Prosthet Dent. 2025;134:1738-1747. doi.org/10.1016/j.prosdent.2024.07.048 **5.** Lee A, et al. Dental rehabilitation of the unilateral cleft dental gap: long-term follow-up. J Craniofac Surg. 2024;35:199-202. doi.org/10.1097/SCS.0000000000009802 **6.** Kokich VO Jr, Kinzer GA. Managing congenitally missing lateral incisors. Part I: canine substitution. J Esthet Restor Dent. 2005;17:5-10. doi.org/10.1111/j.1708-8240.2005.tb00076.x **7.** Zachrisson BU, Rosa M, Toreskog S. Congenitally missing maxillary lateral incisors: canine substitution. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2011;139:434-438. doi.org/10.1016/j.ajodo.2011.02.003

このシートは、愛知学院大学と名古屋大学の研究のためのものです。バージョン0.1、2026年10月22日。