段階2: 3か月後

歯ぐきの骨のすき間をうめる手術：3つの段階

この模型は、骨移植から約3か月後の同じ上あごです。新しい骨がすき間をうめ、その上の歯ぐきは治っています。

仮の図：3か月後の模型の図

上あご全体：新しい骨がすき間をうめる

模型ができたら tools/sheet/render.js で作ります。

上あご全体：新しい骨がすき間をうめる

仮の図：3か月後の模型の図

歯ぐきを外した所：すき間の新しい骨

模型ができたら tools/sheet/render.js で作ります。

歯ぐきを外した所：すき間の新しい骨

仮の図：3か月後の模型の図

下から見た所：治った歯ぐき

模型ができたら tools/sheet/render.js で作ります。

下から見た所：治った歯ぐき

仮の図：3か月後の模型の図

左側：新しい骨の上の犬歯

模型ができたら tools/sheet/render.js で作ります。

左側：新しい骨の上の犬歯

変わったところ

移植した骨が、鼻のそこから歯ぐきまで、すき間をうめています。上あごの2つの部分をつないでいます。[1,2]

歯ぐきは、移植した骨の上でぬってとじました。きずが開くと、骨の一部がなくなることがあります。これがいちばん多い問題なので、歯ぐきはていねいにとじます。[3,4]

犬歯はまだ骨の中にあります。前より少し下にあります。これから数か月かけて、移植した骨の方へおりてきます。[5,6]

手術の後の検査

約3～6か月後にレントゲンをとって、新しい骨がどのくらいついたかを見ます。[7,8] 移植した骨は、時間とともに少しへります。歯が移植した骨の中に動いてくると、骨がのこりやすくなります。[,9,10]

こし

骨をとったこしは、しばらくいたむことがあります。ある研究では、子どもは手術から約2週間で学校にもどりました。[11]

出典 **1.** Boyne PJ, Sands NR. Secondary bone grafting of residual alveolar and palatal clefts. J Oral Surg. 1972;30:87-92. PMID 4550446. pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/4550446 **2.** Semb G. Alveolar bone grafting. Front Oral Biol. 2012;16:124-136. doi.org/10.1159/000337666 **3.** Siddiqui S, et al. Autologous platelet concentrate during secondary alveolar bone grafting and wound dehiscence: a systematic review. J Craniomaxillofac Surg. 2024;52:895-905. doi.org/10.1016/j.jcms.2024.04.016 **4.** Kaura AS, et al. Optimal timing of alveolar cleft bone grafting. J Craniofac Surg. 2018;29:1551-1557. doi.org/10.1097/SCS.0000000000004680 **5.** Desai SK, et al. Observing the eruption of canine after secondary alveolar bone grafting. J Oral Maxillofac Surg. 2021;79:2562-2573. doi.org/10.1016/j.joms.2021.06.021 **6.** Kadi H, et al. CBCT assessment of canine eruption and development following alveolar bone grafting in unilateral cleft lip and palate. Cleft Palate Craniofac J. 2023;60:386-394. doi.org/10.1177/10556656211064477 **7.** Kindelan JD, et al. Radiographic assessment of secondary autogenous alveolar bone grafting. Cleft Palate Craniofac J. 1997;34:195-198. doi.org/10.1597/1545-1569(1997)034<0195:RAOSAA>2.3.CO;2 **8.** Witherow H, et al. A new scale to assess radiographic success of secondary alveolar bone grafts. Cleft Palate Craniofac J. 2002;39:255-260. doi.org/10.1597/1545-1569(2002)039<0255:ANSTAR>2.0.CO;2 **9.** Jahanbin A, et al. Long-term stability of alveolar bone graft in cleft lip and palate: a systematic review and meta-analysis. J Craniofac Surg. 2022;33:e194-e200. doi.org/10.1097/SCS.0000000000008254 **10.** Schultze-Mosgau S, et al. Bone resorption after secondary alveolar cleft bone grafts before and after canine eruption. J Oral Maxillofac Surg. 2003;61:1245-1248. doi.org/10.1016/s0278-2391(03)00722-5 **11.** Tache A, et al. Pain management at iliac donor sites after grafting of alveolar clefts. Int J Oral Maxillofac Surg. 2022;51:62-69. doi.org/10.1016/j.ijom.2021.05.004

このシートは、愛知学院大学と名古屋大学の研究のためのものです。バージョン0.1、2026年10月22日。